







10D (19)

20095

John Inmrys  
1754

Redland Court,  
Glouc.

1756





LEONARDI PLUKENETII  
AMALTHEUM BOTANICUM.

( i. e. )

Stirpium Indicarum Alterum

COPIÆ CORNU

Millenas ad minimum & bis centum diversas Species novas & indictas nominatim comprehendens; Quarum Sexcenæ & insuper, Selectis Iconibus,

ÆNEISQUE TABULIS

In gratiam Phytosophorum exquisitè & summo artificio Illustrantur.

Opus **TEMPORI** Sacratum.

*In Magnis vel Voluisse Sat est.*



*M. Vander Gucht scul.*

*Plurimum ad Inveniendum contulit, qui speravit posse reperiri.  
Pigri est Ingenii contentum esse his, quæ ab aliis inventa sunt.*

*Senec. Epist. 86.*

**LONDINI** M.DCC.V.



THE WELLCOME INSTITUTION

10, BEDFORD SQUARE, LONDON, W.C.1

(11)

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION



THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION

THE WELLCOME INSTITUTION



# Præfatio.

**I**nsatiabilis est Intellectus hominis nec uno expletur ferculo, sed crescit amor cognoscendarum rerum, quantum res ipsæ crescunt; Adspernatur enim certorum finium præscriptionem, ut recte dicit Scaliger Exerc. 307. 11. Saculi sanè nostri est felicitas multis diligentia abundare exemplis, & ad ampliandam Historiam Naturalem indefesso in stirpibus indagandis studio efflorescere. Profectò Veterum Inventis incrementa, semper ingeniosa Posteritas adjunxit.

Ingratè igitur posset, & univé de Parente omnium Natura videri, credere Ipsam omnia sua in uno partu effundentem munera, reliqua Posteritati humani generis in omnem ævum sterilem, effatamque manere voluisse. Damus quidem prudentissimum rerum Naturalium Salamonem fuisse, totam tamen earum abyssum non exhaustit: Hæc est benignitatis Divinæ lex spargere dona sua in Homines & Ætates, nec uni tribuere omnia. Multa (inquit Seneca Quæst. Nat. lib. 7. cap. 31.) venientis ævi populus ignota nobis sciet, multa seculis tunc futuris, cum memoria nostra exoleverit reservantur. Nihil unquam Venerabilis Antiquitas de Novi Orbis in rerum Naturâ existentia norat, cum ecce Deus Opt. Max. post-expleta inscrutabilis Consilii sui tempora, novum Nobis Mundi theatrum, tantâ Exoticarum rerum varietate refertum, aperuit.

Herculeas posuit Naturæ nemo Columnas,  
Et si quis studeat ponere, vanus erit.  
O plures esset fas, hic numerare Columbos!  
Quot nova Venatrix Regna carina daret?

Viget adhuc vigebitque semper Ingenii humani solertia, nunquam deerit Inveniendarum copia. nunquam res novas Quærentium fatigabitur Industria; Est quod nova semper Ingeniorum lumina veluti è Cymereis tenebris primum eruant proferantque. Ita enim accidit in re Botanica, in Qua etiam cum multum actum est, omnis tamen Ætas quod agat inveniet.

Quæ non multitudine tantum, sed & Novitate sua animos nostros ad se arripit; Nemo non impensè delectatur Novis, denso enim agmine convolat populus ad quævis antea non visa Naturæ spectacula, nec quenquam vel ex infima plebe invenies, qui eo ubi publicè spectandum exhiberi solet quidpiam Exoticum, vento velocius accurrere nolit: Hinc fit ut Opus hoc nostrum (quod ad Historiam Plantarum augendam concinnavi,) tot novis accessionibus instructum, tot raris speciebus, imò insolitis & admirandis, Lectori Philobotano tam Novitatis quàm utilitatis nomine commendare non erubescam, ideòque gratiam novarum rerum cupidorum, in publicum edi curarem.

Nec infra plebis rusticitatem dejiciunt curas suas, sed cum Regum miscent Majestate, terrâ Nascentia qui ponderant; Primus Paradisum plantabat gloriosus Deus, & primum Mundi hospitem ac Monarcham, colonum ei dabat; Tanti etiam semper apud Veteres Stirpium Herbarumque cognitio æstimata, ut vel Diis Immortalibus Inventionem earum ascripserint, vel mortales qui adinvenérunt ac monstrârunt, Divinis honoribus dignos judicaverint.



# P R Æ F A T I O.

dicaverint. Et tanquàm olim hujusce divinae Facultatis excellentiam a Nemine excogitari posse Prisci autumabant praterquam a Diis Immortalibus, sic & nunc dierum obtinet, quod doctiores & sapientiores inter Magnates nostros, imo Principes ipsi, vultu Divino perciti Instinctu, ad Eam promovendam unanimiter conspirare videntur; Hi sanè ad hoc Opus consummandum sua contribuere auxilia, His equidem adjuvor. Lator plurimùm quodales Mecænates habuerim, liquet enim,

Principibus placere Viris, haud infima laus est.

Horum omnium liberalitatem non solum Mihi sed Omnibus celebrandam ac divulgandam censeo. Horum erat benignitas quæ non contemnendâ adjunctione hâc vice provexit Iconas nostras, Quarum inspectionem multùm ad Plantarum cognitionem parandam facere, negari non potest, Neque ullius ponderis sunt, aut consideratu digna, quæ adversus Imagines has, & olim Plinius, & Patrum memoriâ Janus, Cornarius, Langiusque disputaverunt, cum usu quotidiano sit compertissimum, Imaginem bene depictam longè exquisitius & certius docere figuram, similiaque quæ in oculos incurrant, non stirpium modò, sed aliarum quoque rerum, quam ampla quævis descriptio præstare possit, ut optime docet Excellentiss. Turnefortius. Inst. Rei Herbar. 14.

Permissum igitur eò libentius hoc opus in lucem prodire, quod omnibus usui aliquo esse ita possit, ut Inspiciendo, legendo vè Naturæ admiranda, ad Deum omnium Opificem animum erigentes, & odisse meminerint vitia, Virtutesque sequendas constituent, tracti istâ tantâ admirandarum rerum Jucunditate: Dedit enim nobis sensum, dedit Intellectum Creator Maximus hanc frustrâ, & ut turpi torpescerent ocio, sed ut excolerentur & exercerentur perenni opere: Ille nos in hunc Mundum introduxerit tam inexplicabili rerum varietate ornatum, quod oculis quos contulit nobis ea videnda, animo contemplanda objecerit; Et ut magna alicujus artis Opifex attentos ac peritos spectatores desiderat, à segnioribus & imperitioribus obscurari potius Scientiæ gloriam, & commaculari queritur, Ità divinus Thaumaturgus penitus gaudet Opera sua Inspici, & Se in illis, quantum nostra fert Mortalitas. Nam quid in tanta Rerum existentium Varietate observari potest, quod Dei Majestatem ac Munificentiam non arguit? Quæ ex iis adeò abjecta ut animos non exsuscitet? Atque in Creatoris notitiam, cognitionemque non deducat? Quippe licet Deus inconspicuus sit, nullâque visibili specie attingi queat, ex rebus tamen tam mirificè productis, tantisque virtutibus imbutis, perspicui potest, & absque peregrinâ Instructione intelligi. Quin si Invisibilia Dei per ea quæ facta sunt intellecta conspiciuntur ex Paulo Apostolo ad Roman. 1. Jure in hisce rebus deprehenditur summa Dei non modò Omnipotentia, verum etiam Benignitas, quæ rebus omnibus suam vim admirandam infuderit, ipsius hominis causâ. Nil enim quispiam à Naturâ creatum inveniet, quod in Medicum usum venire non possit, sacrâ illâ Parente rerum omnium nusquam non remedia disponente homini. Quid demum plura? Nihil non Herbarum vi effici posset, si plumarum vires non Ignorarentur.

Sylva mihi domus est, sunt et cubilia frondes,  
Nostra nec erubuit Sylvas habitare Thalia.

Ex Ædibus nostr. ad Palatium  
antiquum apud Westmonast.  
Anno a nato Mundi Salvatore  
MDCCV.

Fol. 119. pl. 7. deleatur Hyacinthus,  
& leg. Hyacinthoides Floridana aut  
Phalangium tale.

A M A L.



LEONARDI PLUKENETII

AMALTHEUM BOTANICUM.

**A** BIES major *Sinensis* pectinatis Taxi foliis  
subtus cœsis, conis grandioribus sursum ri-  
gentibus, foliorum & squammarum apicu-  
lis spinosis.

Abies maxima *Sinensis* pectinatis Taxi foliis, apiculis non  
spinosis.

**A** Brotanum mas *Sinicum* latiori folio, cum pulchris co-  
rymbis ex Insulâ *Cheusan*.

Abrotanum *Sinense* latiori, & multifido *Artemisiæ* folio, ri-  
gidiusculis apicibus spinularum æmulis insignito, cum  
parvis corymbis.

Abrotanum tenuifolium dense fruticosum, cum exiguis  
corymbis, ex Insulâ *Cheusan*.

B

Abro-

Abrotanum *Sinenſe* tenuifolium, corymbis majoribus elegantiffimis.

Abrotanum *Sinenſe* tenuiffimis longioribus foliis, corymbis perexiguis.

Abrotanum mas *Sinenſum*, foliis & corymbis minutiffimis.

Abrotanum *Africanum* multifido folio, incanum, corymbis aureis umbellatum. An Coma aurea *Africana* fruticans, foliis Crithmi marini, *Hort. Amſt. part. alt. cap. 50*. Quæ tamen ad Jacobæam noſtram *Æthiopicam*, foliis Abrotani trifidis, ſummo caule capitulis parvis glomeratis, *Almag. Bot. fol. 194*. potiori jure referri videtur; Cujus Icon exhibetur in *Phytogr. Tab. 302. fig. 7*.

**A**bsinthium Seriphium montanum candidum, C. B. P.  
Absinthium Santonicum Nonnullis, *Camerarii*.

Absinthium *Sinenſe*, *Romano* hæud abſimile. Ex Infula una de *Crocodylis*, in ditione *Sinarum*.

Absinthium *Santonicum*, *Chamæcypariſſi* denticulatis foliis, incanis. Absinthium *Santonicum* *Ægyptiacum*, C. B. P.  
*Park.* Absinthium *Ægyptium* quibuſdam, *J. B. Tom. 3. Part. 1. 182*. Abrotani fæminæ ſpecies ſecunda *Zannoni*.

Absinthium *Syriacum* tenuiffimis foliis, Stæchadis citrinæ capitulis umbellatum.

Abſin-



*Abfinthium Indianum* foliis inordinatè laciniatis, floribus albis parvis umbellatis.

*Abfinthium maritimum Sinarum*, *Lavandulæ* folio, pulchrioribus corymbis inodorum, sapore aromatico. *Abfinthium maritimum Lavandulæ* folio argenteo vel incano, inodoro, saporis ex falso amari, floribus plerumq; singularibus lutescentibus, D. *Cunningham*. Octobri floret in *Insula Cheusan*.

*Abfinthium Maderaspatanum* *Senecionis incani* folio, corymbis solitariis in ramulorum fastigio speciosis.

**A** *Cacia Maderaspatana spinosa Aldini* foliis, filiquis longis membranaceis falcatis.

*Acaciæ Eachedde Malabarorum*, *Mantissæ* nostræ similis, spinis gemellis, longioribus, rectis. *Eachedde* vero *Spinis* brevibus, recurvis, & solitariis imbuta est.

*Acacia spinosa Ind. Or.* pinnulis parvis lunatis, spinis brevibus deorsum inflexis.

*Acacia non spinosa Ind. Or.* foliis perexiguis, virgulis lanugine ferruginea villosis. *Choona-attée Malabarorum*. An Eadem cujus Icon habetur in *Phytograph. Tab. 122, fig. 3*. Hæc autem spinosa est.

*Acacia non spinosa Sesban Ægyptiacæ* foliis, subtus glaucis; *Cherymaram Malabarorum*. Ad *Acaciam* nostram non spinosam *Coluteæ* foliis *Almag. Bot. Mantiss. fol. 2.*  
Caut-



*Cautwallee Malabarorum* in *Phytograph. Tab. 331.* exhibitam propius accedit.

*Acacia* (fortè) *Maderaspatana* Tamarindi forma, pinnulis Filiculæ consistentia, alarum costis aculeatis. *Iddumbylmaram Malabarorum.*

*Acacia Americana* Faginis foliis tetraphyllos, flosculis staminosis in spicam dispositis. Arbor filiquifera Faginis foliis *Americana* floribus comosis *Almag. Bot. fol. 44. pl. ult.* cujus Icon habetur in *Phytographia, Tab. 141. fig. 2.*

**A** Cer *Maderaspatanum* Pyrolæ orbiculatis virentibus foliis, fructu simpliciter alato.

**A** Cetosa *Moscovitica* sterilis, *Morison. Hist.*

*Acetosa* radice Lapathi instar, absq; fibris recta pedali, aut sesquepedali montana, *Moris. Hist.*

*Acetosa* tuberosa radice, *C. B. P. 114.* *Oxalis* tuberosa radice, *J. B. Tom. 2. fol. 991.*

*Acetosa* longifolia *Virginiana* fruticescens, grandiori fructu eleganter bullato.

**A** Cino nostrati similis erecta, *Herba Maderaspatensis.*

Acinos multis effigie, procumbens, ex cauliculorum geniculis radicata, *Herba capsularis* ex *Insula Cheusan.* Sequitur descriptio a Domino *Jacobo Cunningham* exarata.

Planta

Planta flore cæruleo, monopetalo, tubulato, quadrifido, ex calyce quadrifido surgit pistillum staminibus stipatum, quod deindè ab it in capsulam rotundam bicapsularem, seminibus minutis nigris fætam, in floris calyce reconditam; Folia parva, lævia, subrotunda, cœsia, ex aduerso bina, è quorum alis proveniunt flores brevissimis pediculis cauli adhærentes, in nativo solo *Octobri* mense floret.

**A** Conitum *Lycoctonon* Platani foliis in acumen luteum desinentibus. *Hort. Lugd. Bat.*

*Aconitum minus Autumnale Insulæ Cheusan, Sinicè Tsfou-ù* dicitur, *Septembri & Octobri* floret apud *Sinas*.

**A** Culeosa *Æthiopica* *Attractylidis* facie, foliis densa serie cauli strictissimè appressis, capitulis foliosis. Cui extrema foliorum spina aurea, cæteris major est, et semper recurva.

**A** Laternoides *Africana* *Ericæ* foliis, floribus albicantibus & muscosis, *H. Amst. part. alt. fol. 1.* Ab hac parùm discedit *Juniperifolia* nostra suffrutex *Africanus* glomerato flore cum pericarpio rotundo, *Mantiss. fol. 111.*

*Alaternoides Africana* *Lauri* serratæ folio, *Casp. Commelin Præ lud. Bot. pag. 61. fig. 11.* Cujus semina sub titulo *Ricini Africani* *Salicis* folio, flore viridi sibi mittebantur, atq; hoc nomine etiam depicta exhibetur in *Codice Witfiano* cum hac notâ, quod gaudet Campis irriguis,



& Rivulorum marginibus. At re verâ Nil aliud est hæc planta quàm Euonymo adfinis *Æthiopica* semper-virens, fructu globoso scabro, foliis Salicis rigidis, ferratis, in *Almagesto* nostro, cum synonymis enumerata, fol. 139. pl. 11.

**A**lcea *Thuringiaca Camerarii Hort. Eystetens.*

*Alcea Indica* Scrophulariæ angustioribus foliis, capitulis conglomeratis. Tſieru-uren, *Hort. Malab. part. 9. Tab. 73.* Planta Sideritis folio insipido, flore pentapetalo rosei coloris, fructu rotundo, in quinque partes diviso, semine triangulato, *Commelin. Not. in locum.*

*Alcea minor Maderaspatana*, *Vitis sylvestris* folio incano, florum calyce duplicato; *Collar-tuty Malabarorum.*

*Alcea Indica Sinarum*, *Abutili* foliis incanis, flore amplo luteo, fundo purpureo. D. *Cunninghamus* hoc modo descripsit.

Frutex arborescens, flore luteo Malvaceo, fundo purpureo, fructu villoso, in quinque loculamenta diviso, apice dehiscente, & plurimis feminibus fuscis reniformibus fæto: Folia fert circinata ferè rotunditatis, aliquando in acumen minus desinentia, leviter serrata, parùm rigida, & internè incana, ut *Populus alba*. *Junio* floret, & *Septembri* semen perficit. Est species *Ketmiæ*.

*Alcea Indica, Lamii Cannabini* folio tetraphyllos, capitulis ad nodos caulium glomeratis. *Niuren, H. Malab. part. 10. Tab. 55.* Alcea

*Alcea Sinica*, Manihot stellato folio, capsula longa, pilosa, pyramidata, quinquefariam divisâ. Descriptio sequitur.

Planta fructu pyramidato, longiore, hirsuto, quinquecapsulari, feminibus fæto reniformibus, foliis digitatis, (digitis longioribus) lævibus, & obscurè viridibus, *Sinicè Tchuwè* dicitur. D. *Cunningham*.

*Alcea Floridana* quinquecapsularis, Laurinis foliis, leviter crenatis, feminibus Coniferarum instar alatis; *Rosebay* *Noftratibus* dicta.

*Alcea Cistoidea Africana* quinque capsularis, Teucree durioribus hirsutis foliis, flore aureo gemello, ex quinquepetalis spiritaliter in orbem volutis conflato. Cistoides (fortè) *Africana*, frutescens, Ulmi folio, flore luteo *Cat. Plant. ad. calcem. Paradis. Bat.* *Althæa* flore aureo, cochleato *Volkamer. Flor. Noriberg.*

*Alcea Cistoidea Africana*, tricapsularis, Anonidis vernæ folio singulari, flosculis parvis, pentapetalis, luteis, calyce magno, inflato, villis obsito exceptis, summo ramulo confertim nascentibus. Vid. *Mantiss. fol. 24. pl. 1.* *Hermannia Turnefortii*, qui quinquecapsularem facit.

*Alcea olitoria*, s. *Corchorus* longiori folio, *Sinarum*.

*Alcea cibaria* s. *Corchorus Maderaspatensis*, flore flavo oblongis, glabris, *Melissophylli* foliis, capsula *Caryophylloide* brevi.

*Alcea*



*Alcea Indica* s. Naga-pu, *H. Malab.* species altera, stachadis ferratæ foliis angustissimis è *Maderaspatan*.

*Alceæ Indicæ* affinis Herba *Malabarica*, capreolis ascendens, Bryoniæ albæ folio minore. Kudici-Valli, *Hort. Malab.* part. 8. Tab. 27.

**A** Lifanus Vegetabilis *Carolinianus*. The Sucking-Bottle. Fortè *Lychnidis* species.

**A** Llium latifolium montanum maculatum, *Moris. Hist.* C. B. P. *Allium alpinum* f. B. *Allium anguinum*, *Park. Theatr.* *Victorialis longa* *Clus*.

**A** Lnus (fortè) *Americana* Betulæ facie *Bobartii* D. du Bois. An potius *Populus alba minor Americana*, ut nobis videtur.

*Alni folia* arbor ex *Sinarum* Insula *Cheusan*.

*Alnus montana* Sorbi *Torminalis* foliis aliquatenus accedens à D. *Bremen* accepta; apud D. *Sherard*. Hujus Cortex & Coni, Coriariis maxime inserviunt. *Bellonius* refert *Illyricos* Myrti foliis Coria perficere, quemadmodum *Macedones* Rhoe, *Ægyptios* Acaciæ filiquis, *Asiæ minoris* Incolas glandium *Æsculi* calycibus; *Gallos* Quercûs libro, *Phryges* sylvestris *Pini* corticibus, *Clus Hist. lib. 1. cap. 43*.

**A** Loe *Africana* caulescens, foliis glaucis caulem amplectentibus, *H. Amst. part. alt. fol. 27. fig. 14*.

Aloe

*Aloe Minor Margaritifera* flore viridi, *H. Amst. part. alt. fol. 21. fig. 11.*

*Aloe Americana* polygona *Casp. Commelin. Prælud. Bot. 65. fig. 15.* De Soboliferarum censu videtur.

*Aloe Africana* foliis glaucis margine, & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro. *Prælud. Bot. 75. fig. 24.*

*Aloe Africana* caulescens; foliis glaucis brevissimis, foliorum summitate internâ, & externâ nonnihil spinosa. *Prælud. 73. fig. 22.*

*Aloe Africana* glabro folio, minutissimis cavitatibus donato. *Prælud. 76. fig. 25.*

*Aloe Africana* humilis arachnoidea. *Prælud. 78. fig. 27.*

*Aloe Africana* humilis, folio in summitate triangulari rigidissimo, marginibus albicantibus. *Prælud. Bot. 81. fig. 30.*

*Aloe Africana* humilis, foliis ex albo & viridi variegatis, *Prælud. 79. fig. 28.*

*Aloe Guinensis*, radice geniculatâ, foliis è viridi & atro undulatim variegatis, *Prælud. Bot. 84. fig. 33.* Quam etiam videsis, in *H. Amst. part. alt. fol. 39. fig. 20.*

*Aloe Africana* caulescens foliis spinosis, maculis ab utraq; parte albicantibus notatis, *H. Amst. part. alt. fol. 9.*



*Aloe Africana*, Lili albi folio carinato, brevi.

*Aloe Yuccæ* foliis caulescens *Floridana*, ad oras minutissimis ferris asperata, fructu eduli dulci.

*Aloes Floridana* procerior lenis, fructu *Bananæ* carnosio pingui, seminib. orbiculatis, osseis, atronitentibus, planis, pulpamento suavissimi saporis, *Cassia* æmulo immerfis.

*Aloe Floridana* aculeata, gladiatis foliis cavis, è gremio foliorum propè terram, fructum edens edulem. An *Cara-guata Brasiliانا* prima, *Pison*. Edit. 1658. fol. 191.

**A**lfine holostea polygonoides spicata; s. Scorpioides *Maderaspatana* nodosa, folio secundum caulem foliario.

Alfine Scorpioides *Polygoni* folio procumbens minima, *Prom. Bon. Spei*.

Alfine Anthylloides *Ind. Or.* floribus ad canlium nodos verticillatis. *Chorellee Malabarorum*.

Alfine Lotoides *Dictamni Cretici* facie *Maderaspatana*.

Alfine *Spergula Maderaspatana*, latiore folio, flosculis plurimis ad nodos inter folia pediculis longioribus innixis, calyculis non punctatis. *Toraii Malabarorum*.

Alfine *Spergula Ind. Or.* cauliculis pilosis, calyce spinulis aureis pro staminulis referto, ad ortum foliorum singulatim sessili. Althea

**A** Lthæa *Indica*, *Olbiæ* quadammodo accedens, flore magno sulphureo. Peatietty *Malabarorum*.

*Althæa Maderaspatana* Abutili parvo folio, flore minore. Corytuty *Malabarorum*.

*Althæa Indica* *Hederæ* terrestris ferè foliis flore purpureo magno.

*Althæa fruticosa Sinensis*, *Betonicæ* folio majore.

*Althæa fruticosa Sinensis*, foliis parvis angulosis, feminib. incanis.

*Althæa Indica* minor frutescens, flore parvo purpureo. Peramutty *Malabarorum*. Huic propius accedit *Alcea* parva fruticosa *Trissaginis* folio erecta, ex *Oris Caromandel. Mantiss. fol. 6. pl. 1.* Cujus *Icon* habetur in *Phytographia, Tab. 334.*

*Althæa fruticosa* pusillis cordiformibus foliis, subtus cœsiis, é *Maderaspatán*. Miremanicum. *Malabarorum*. Hujus autem *Icon* sub *Rhamni* falso titulo per errorem habetur *Phytograph. Tab. 1120. fig. 4.*

*Althæa* minor subrotundo ulmi folio *Maderaspatana*. Warra-congee *Malabarorum*.

*Althæa Orientalis* *bidens* subrotundis foliis, floribus parvis luteis. Chittee-mootee *Malabarorum*.



*Althææ minoris subrotundo folio, Planta Indica capsularis, fructu summo caule, spica brevi, glomerato. Neer-Pilandy Malabarorum.*

**A**maranthus *Sinicus* latifolius, spica habitiore candidissima.

Amaranthus albus *Salviæ* latioribus foliis è *Maderaspatan*. Collar-pooe *Malabarorum*.

Amaranthus spicatus albus, *Perficariæ* foliis *Maderaspatanus*. Belutta-adeca-manjen, *H. Malab. part. 10. Tab. 38.*

Amaranthus spicatus angustis & longioribus foliis, capitulis dilutè purpurascentibus è *Maderaspatan*. Tsjera-belluttæ-addeca-manjen, *H. Malab. part. 10. Tab. 39.*

Amaranthus *Indicus* spicatus, angustissimo *Lychnidis* folio, floribusq; carneis, Eryma-tundoo *Malabarorum*.

Amaranthus *Parietariæ* foliis *Ind. Or.* Neer-valle *Malabarorum*.

Amaranthus parvus longifolius spica laxâ *Ind. Or.* Toiyan *Malabarorum*.

Amaranthus parvus *Sinensis*, *Bliti minoris* folio, spicâ laxâ virescente tenui. Addecomogule *Malabarorum*.

Amaranthi genus pusillum, subrotundis foliis *Indianum*. Coambatty-Leckary *Malabarorum*.

Amaran-

Amaranthioides major *Ind. Or.* pilosis foliis in pungentem spinulam desinentibus, flore albo globoso. Vella-waramelle *Malabarorum*.

Amaranthioides fruticosum, Eryngii capitulis purpureis, ex ejusdem coloris alaticaulis geniculis, prodeuntibus; è *Maderaspatan*.

Amaranthioides spicatum *Indicum* ramosissimum; Spergulæ foliis, spicâ Alopecuroide incarnatâ.

Ambrosiæ (forsan) è *Chinâ* Anguriæ foliis accedenti *Almagesto* 27. similis, ex *Insula Crocodilorum*. An potius *Matricariæ Japonicæ* species *Sinica*, Keuk-hoa *Sinis* dicta.

Mygalus *Maderaspatana* Pyrifolia, fructu sericeo, ex alis foliorum sessili.

Amygdalo similis, fructus *Peruvianus* fuscus, vel spadiceus, lineâ candidâ, *C. B. P.* 442. Fructus peregrinus 9<sup>us</sup>. s. *Pepitas del. Peru* (i. e.) *Acini Peruviani*; *Clus. exot. lib. 2. cap. 30.*

Ananas sylvestris, folio Aloes, fructu Cupressino, *J. B. Almag. Bot.* 13. De hac autem videtis. Sub *Palmæ* affinis titulo, minùs propriè, in *Almagesto nostro*, fol. 277. Fortè tamèn *Palmites* ramis, & frondibus carentes, fructu ex stipite, *Ananas* non dissimili, grana plurima instar *Punicæ* alicujus continente, *Part 6. Ind. Or. cap. 10.* Arbor fructu *Ananes*, ex caudice emergente,



gente, nucleis turgente, C. B. P. 511. Arbor sine foliis, s. ramis, in Insula minore *Sanctæ Mariæ*, part. 4. *Indiæ Orient.* cap. 6. Huc fortè spectat *Dounekai-gauhah Cingalensium*, *Knocci Hist. Insulæ Ceylon*, fol. 17. Palmitas Ananæ foliis, & fructu Nucis pineæ specie, ex quamplurimis lignosis tuberculis magis interstinctis, coagmentato.

**A**Nchusa foliis longis & angustis, limbo foliorum minutissimis ferris asperato, caule rubello, ex Provincia *Floridanâ*. Anchusa (fortè) lutea minor *Virgiana Banist. Cat. Stirp. Virgin.* Puccoon *Indi* nuncupant, & ejus radice sese pingunt.

Anchusæ folio argenteâ hirsutie asperato. An fortè *Onofma Veteribus*, *J. B. tom. 2. fol. 586.* è *Mauritaniæ* montibus *Forjoon*.

**A**Nethum nostrati conveniens, *Maderaspatanum*. Chadde-coupee-very *Malabarorum*.

Anethifolia Umbellifera *Ind. Or.* seminibus Carui odore aromaticis. Ex *Horto Uvedalensi* collectam habuimus.

**A**Nguria Cucumerina ex *Ind. Or.* vel Cucumis *Indorum* Anguriæ foliis, *Hort, Uvedal*.

Anguriæ foliis exiguis scandens elegantissimè divisis. *Aronavel Malabarorum*.

Anil trifoliatum *Indicum* majus, filiquis propendentibus. *Cullara-Marungy Malabarorum*.

Anil

Anil trifoliatum *Indicum* minus, cordatis foliis. Cory-pa-rappœ *Malabarorum*.

**A** Nomala *Indiana*, Nepetæ foliis, stæchadis *Arabicæ* capitulis, ex sinu foliorum prodeuntibus. An Kaku-kurka, *H. Malab. part. 10. Tab. 90.* Huc fortè spectat Min-angani, *H. Malab. part. 9. Tab. 72.* Sideriti folio, caule piloso, capitulo globoso, flore monopetalo, quinque partito, candido, *Cammel; Not. in loc.*

Anomala quædam *Ind. Or. ἀκωνλον*, gemino ex radice latiore folio, floribus inter folia. An Katsjula-Kelengu, *H. Malab. part. 11. Tab. 41.* Planta bifoliata, radice tuberosa, flore tripetalo difformi *Malabariens. Commel. Not. in loc.* Huic plantæ consimilis, sub nomine Contrayervæ ex *Insulis Philippinis* jam olim allata est.

Anomala *Æthiopica*, capsulâ magnâ bivalvi, feminibus alis membranaceis insignitis refertâ. Anonymos *Æthiopica*, Hyssopi subrotundis foliis ex nodulo confertis, summo ramulo lignosâ, capsulâ, magnâ, & bivalvi donatâ. *Mantiss. 15.* cujus Icon habetur in *Phytograph. Tab. 333.*

Anonis viscosa lutea, non spinosa, minor. Ex *Insula Pico*. Fortè Anonis viscosa lutea, non spinosa, minor *Lusitanica*, *Cat. Pl. ad Parad. Bat. append.*

**A** Nonymos fruticosa *Lybica*, caule anguloso, alatis *Colutæ* foliis, Psyllii capitulis ad foliorum alas.

Anonymos



Anonymos *Cheusanensis* Sideritidis folio, fructu Ulmi Samar-  
ris haud absimili, sed minore. Sequitur Descriptio.

Planta est flore albo, minimo, monopetalo, campaniformi, quintifido, (summitatibus reflexis) calycis ex parte; Pistillum vero surgit è floris fundo, staminibus stipatum, quod deinde abit in capsulam subrotundam, semen unicum planum & ovatum, instar seminis Sese-  
mi continentem. Aperto flore, protruditur, & adnascitur membrana rotunda, instar squamæ, per longitudinem pediculi floris transcurrentis, capsulæ autem non adnascit, sed latet quasi ad membranæ centrum excavatum, flores è foliorum alis, & caulium summitatibus nascuntur, in muscariis dispositi. Folia ex adverso bina, oblonga & levitè crenata. *Octobri* floret. D. *Cunningham*.

Anonymos *Cheusanensis*, Betonicæ folio incano, Chamæcisti flore luteo, prælongo, fructu Balsaminæ fæminæ, trifariam ab imâ parte dehiscente.

Planta est flore luteo, rosaceo, pentapetalo, ex cujus calyce profundè quinque partito, & reflexo, prodit pistillum, staminibus luteis stipatum, quod deinde abit in siliquam teretem, & quasi nodosam, trivalvem, cum ternâ serie feminum, lineæ medianæ, s. placentæ adhærentium, & singulorum in suis alveolis latitantium: Folia fert *Althææ* mollia, & incana, inæqualitèr dentata, à basi rotundiore (pediculo brevi insistente) in acumen definentia, semine fert triquetra. *Septembri* floret, & in bipedalem ferè assurgit altitudinem. D. *Cunningham*.

Anonymos

Anonymos Linariæ folio *Orientalis*, Gallii lutei flore, Herba capsularis, verticillata major. Hujus minoris speciei pictura habetur in *Phytogr. Tab. 136. fig. 2.*

Anthyllis *Indica*, Tithymali fructu botryoide tricarpos, ad caulem in Verticillas posito, ternis inæqualibus foliis: An re vera de Tithymalorum censu reputari potest.

**A** Ntirrhinum angustifolium triphyllum *Cupani, Hort. Uvedalens.*

Antirrhinum minus *Cheusanensis*, Anchusæ folio scabro, flore luteo, ad fundum superius extra & intus purpurascete.

Antirrhino adfinis *Maderaspatana*, capillaceo folio triphyllus, flore purpureo.

**A** Pioscorodi facie trifoliata, punctatis foliis, Arbuscula corymbosa, tetrapetala, semine transparenti polliculâ cincto. In *Horto Episcopali* apud *Fulhamiam* præterito anno floruit & semina complevit.

Apium *Macedonicum Lusitanum*; *Lusitanorum Saxifragia, Grislei. Viridar.*

**A** Pocynum arboreum *Maderaspatanum*, Juglandis folio, floribus Dulcamaræ cæruleis, filiqua longâ tereti, Nerii æmulâ. An *Nelam-palâ, H. Malab. part. 9. Tab.*

3.



Apocynum rectum *Floridanum*, Laurifolio, subtus villoso, floribus ex luteo-virescente, umbellatis.

Apocynum erectum *Maderaspatanum*, subrotundis amplioribus foliis, Neittoraii *Malabarorum*.

Apocynum rectum *μονόκλωνον*, *Africanum*, latioribus & venosis foliis, hirsuto caule, floribus albis umbellatis.

Apocynum rectum *Americanum*, Asclepiadis folio majus umbellatum.

Apocynum erectum *Virginianum*, minus. Umbella florum candida, *Banist. Cat. Stirp. Virgin.*

Apocynum rectum *Floridanum*, Ranunculi flammei majoris folio, florib. umbellatis aureis.

Apocynum scandens *Maderaspatanum*, Scammoneæ *Monspeliacæ* foliis rotundioribus, floribus albis umbellatis.

Apocynum scandens *Americanum*, foliis subrotundis, incanis, mucrone elongato, floribus singularibus obsolete luteis, ex *Hort.D. Reynardsoni*.

Apocynum scandens *Floridanum*, Periplocæ foliis, longius ab invicem distantibus, floribus ochroleucis, in Umbella positis.

Apocynum aureum scandens cum claviculis, foliis oblongis, subrotundis, hirsutis, caule nodoso, tortuoso, non recto, sed huc & illuc undulatim inflexo, *Floridanum*.

Apocynum

Apocynum *Maderaspatanum*, angustifolium, scandens, flore amplo gemello, Versicolore.

Apocynum scandens, angustis Rosmarinæ foliis, è *Maderaspatan*. Nannary-chedde *Malabarorum*. Huic multum convenit Illud, quod ex Insulis *Canarinis*, olim nobis trans mittebatur, & in *Almagesto* nostro memoratur.

**A** Quifolium læve non spinosum, angustiore folio Lauri; ex *Insula Palma*.

Aquilegiæ corniculis, Moschatellinæ foliis, Planta pusilla; ex *Insula Cheusân*.

**A** Rbor *Floridana*, Solani magni *Virginiani* folio rigidiori, subtus candicante.

Arbor *Floridana*, Arboris *Judæ* subrotundo folio, inferius dilutè virenti. An fortè *Coapoiba Brasiliensibus* *Marcgrav. fol. 131*.

Arbor *Maderaspatana*, Arboris *Judæ* foliorum æmula. *Perringotan Malabarorum*.

Arbor *Africana*, subrotundo folio, margine denticulis acutis asperato, floribus pentapetalis atropurpureis. *Almag. Bot. 41*. Cui tamen flores non sunt atro purpurei, sed lutei, quæ enim petala membranacea semel putavimus, re verà non sunt petala floris, sed flosculorum plurimorum lutei coloris, ad umbonis marginem insertorum, perianthium quinquifidum, atropurpureo coloratum;



ratum; His flosculis decidentibus, succedunt baccae, ovali forma, quæ Umbonem eleganter circumcingunt, sub Cautomoollee *Malabarorum* titulo, aliquandò ab *India* transmittitur. Hujus Icon habetur in *Phytograph* nostra, *Tab. 263. fig. 1, & 2.*

Arbor *Africana*, *Laurocerasi* brevioribus foliis, superne glabritie lucidis, subtus vero valde tomentosis.

Arbor baccifera *Cheusanensis*, Fagi folio subtus glauco, fructu singulari quadrifido, ad foliorum ortum sessili.

Arbor *Indica* Faginis foliis, floribus *Quercuum* capitulorum adinstar, denso squammularum aggestu glomeratis. *Collar-nuchee Malabarorum.*

Arbor *Maderaspatana*, Mali *Limonie* folio, fructu calyculato, villis aureis obfuso, & calyce eleganter dentato. *Embymaum Malabarorum.*

Arbor baccifera *Ind. Or. Mori* folio indiviso, fructu Corni oblongo. *Pera-woolera Malabarorum.*

Arbor *Maderaspatana*, Mali *Cotonee* foliis, ad alas florida, *Condan-guttry Malabarorum.*

Arbor *Indica* *Laurinis* foliis, subtus argentea lanugine tomentosis, florum petalis reflexis ferrugineis, pilosis, staminulis purpureis, fructu *Amygdalinæ* mulo, putamine similiter villosa. *Venangomaram Malabarorum.*

Arbor

Arbor *Indica Cheusanensis*, Salicis latiori folio, levitè serrato, flosculis ad foliorum exortum, confertim sessilibus.

Abor *Cheusanensis*, Arbuti minoribus foliis, flosculis ad foliorum alas, curtis pediculis deorsum tendentibus affixis.

Arbor prunifolia *Cheusanensis*, baccifera, fructu, parvo, rotundo, summis ramulis in spicam disposito.

Arbor *Indica Pruni*. sylvestris folio, Corni maris fructu longiore, cujus lignum Santalum nigrum ab *Indigenis* habetur, *Mantiss.* 26. & 167. An Anonymos 4<sup>a</sup>. *Theophrasti* s. Arbor *Indiæ Orientalis* cui fructus similis Corni *Theophr.* lib. 4. cap. 5. Orula fortè *Cingalensium Knocci*, *Hist. Ceylon.* 17. An potius Ambelos *Eorund.* ejusd. fol. 14.

Arbor *Indica Cheusanensis*, Salicis odoratæ foliis, fructu ex alis squammato calyce donato. Swa-tea *Sinensium* flore pleno, albo, rubro & variegato. Sunt variæ species *Theæ Indorum*.

Arbor baccifera *Cheusanensis*, Euonymi foliis undulatis, & punctatis, fructu rotundo, parvo, calyculato, rubro, *Oxyacanthi* æmulo.

Arbor *Sinensis* Canellæ folio minore, trinervi, prona parte villoso, fructu *Caryophylli* aromatici majoris, villis, similiter obducto, ex *Ins. Crocodilor.*



Arbor *Maderaspatana*, foliis Symphonix *Plinii* ad instar variegatis, fructu calyce amplo, hexapetalo, squalidè purpureo, incumbente. Coletty-maano *Malabarorum*.

Arbor *Indica*, Betulæ folio, summis ramulis corymbosa, Namurramaram *Malabarorum*.

Arbor *Maderaspatana*, Liliflora, Lauri densioribus, cupidatis foliis, pentaphyllos. Elowaymaram *Malabarorum*.

Arbor *Cheusanensis*, Fraxini foliis supernè diluté virentibus, subtùs lividis, summa singulari pinná alas claudente, cæteris multò majore.

Arbor *Indica* Glycyrrhizæ foliis subrotundis, floribus in prælongam spicam adactis. Vandymaram *Malabarorum*.

Arbor *Indica*, lato Ulmi folio lævi, pediculis longioribus infidente, fructu corymboso. Cautoomolamaram *Malabarorum*.

Arbor *Japonica*, Taxi folia, apicibus spinosis; *Singloo Japonensis* dicta.

Arbor *Sinensis* Taxi folio, apicibus obtusis.

Arbor *Indica*, spinosa, Arbori Coral haud abfimilis triphylla, foliis, tamen magis venosis, & rachi medio spinifera. Mullmorucomaram *Malabarorum*.

Arbor

Arbor *Maderaspatana*, alternis Lauri foliis, fructu ferè  
Fragiformi, Alycurry *Malabarorum*.

Arbor *Maderaspatana*, Pyrifolia, fructu bacciformi, peri-  
anthiis membranaceis incluso. Prayamaram *Malabaro-  
rum*.

Arbor *Maderaspatana*, non aculeata, rigidioribus Fraxi-  
nellæ foliis, in spinulam abeuntibus, baccas ferens ver-  
ticillatas. Cutchal-curry *Malabarorum*. Hujus species  
aculeata, habetur in *Phytograph. Tab. 148. fig. 1.*

Arbor baccifera *Ind. Or.* Sebestenæ sylvestris folio, fructu  
calyculato corymbofo. Eramamine *Malabarorum*.

Arbor *Maderaspatana*, Juglandis nigræ folio, fructu capsu-  
lari, glandiformi, calyce dentato infidente. Embymaum  
*Malabarorum* in fructu, haud multum abfimile.

Arbor *Ind. Or.* Populi nigræ folio incano, molli, fructu par-  
vo, capsulari, candido, racematim in spica congesto.  
Corycotan *Malabarorum*.

Arbor *Ind. Or.* Limoniæ foliis, odore Ligni Guaiaci, fru-  
ctu parvo, ad foliorum alas racemoso.

Arbor *Ind. Or.* Cynophallophori folio, fructu parvo, glan-  
diformi, calyce, membranaceo, integro, prorsus immerfo.  
Vandel *Malabarorum*. Ad Pereewoondel *Mantiss.* proxi-  
mè accedit. Vid. *Mantiss. fol. 26. pl. 3. & Phytograph.  
Tab. 335.*

Arbor



Arbor *Maderaspatana*, Guaiavæ foliis, magis acuminatis, in parte recta glabris, in adversæ villosis, ac in margine ferrugineâ lanugine fimbriatis. Nerry-Coraccoi *Malabarorum*. Et à quibusdam quærebatur, An sit Santalum rubrum?

Arbor *Maderaspatana*, Ponnæ *Malabaricæ* foliorum æmula. Pelledymaram *Malabarorum*.

Arbor *Maderaspatana*, venosis foliis subrotundis, sericeis, fâtinum ipsum æmlantib. Vella-tillapa *Malabarorum*.

Arbor *Africana*, Nerii splendentibus foliis, floribus Eupatoriæ comosis.

Arbor *Maderaspatana* Periclymeni (fortè) genus ex foliorum alis trianthophoros.

Arbor *Indica*, baccifera, prælongis, angustis, pallidè virentibus foliis, mucronatis, margine eleganter undulatis. Adjoumaram *Malabarorum*.

Arbor baccifera, *Maderaspatana*, Mali Citriæ foliis, nonnihil scabris, fructu coronato, gemello, ad finum foliorum, pediculis, curtis infidente.

Arbor *Maderaspatana*, Castaneæ folio, a summo ad medium usq; circa margines, profundius inciso, averfa parte, molli lanugine argentato.

Arbor Laurustini *Lusitanicæ* foliis, splendentibus, *Maderaspatana*. Arbor

Arbor baccifera *Maderaspatana*, Lauri venoso folio, fructu rotundo, atronitente, singulari, in foliorum alis sessili.

Arbor *Maderaspatana*, Tiliæ folio non ferrato, longiori pediculo infidente, spica florum Juliformi.

Arbor *Indica*, Salicis folliculiferæ obtusis foliis, candidantibus, pronâ parte splendentibus, glabris, supinâ verò, lanugine villosis. Ponanga-chedde *Malabarorum*.

Arbor *Cheusanensis* baccifera, Coryli folio, summis ramulis racemoso.

Arbor *Sinensium*, Laurocerasi foliis angustioribus, alterno ordine fitis.

Arbor *Sinensium* Lauri folia, *Lei-chi* (i. e.) Oculum draconis fructum ferens; & aliquando *Lun-gyen Indigenis* audit. *Michael. Boëm. Flor. Sinens.* *vid. Ogilv. Chin. Tom. 2. fol. 681.*

Arbor *Cheusanensis*, Arbuti foliis ferratis.

Arbor *Cheusanensis* baccifera, *Frangulæ* foliis venosa, fructu parvo pyramidali, calyculato; officulo oblongo binucleo.

Arbor *Sinensis* sebifera, Kieu-yeu *P. Martini*, s. Arbor Sebacea, *P. le Compte.* Arbor est flore luteo, apetalò, ex tribus plerumq; staminulis composito, in summitate, cratere (cui duæ infident apiculæ rotundæ) quasi dona-



tis; Cujus calyx vix conspicuus, abit in fructum, plerumq; trigonum, cum umbone tricapsularem, duobus corticibus, (exteriori graveolente, molliori, & interiori testaceo,) constantem: Capsulæ membranâ tenui seperantur, unaquæq; semen continet unicum, nigrum, lentis instar convexum, ex testa, & nucleo, compositum, substantiâ albâ, & sebaceâ, quasi obductum, (ad candelas componendas inserviens.) Folia fert instar Populi nigræ lata, & ventricosa, ab basin, & summitatem acuminata, pediculis longioribus; insistentia, viridia, & sæpè cupri instar rubicunda, præcipuè quando decidunt; Floret *Mai*o, & *Junio*, & etiam *Novembri* mense. Arbor *Kiū-tzé*. Oleum ejus, *Kiū-yēu* vocatur, *Sinarum* linguâ. D. *Cunningham*. vid. *Euonymo* adfinis.

Arbor *Sinicæ Pi-pá* dicta, folio *Castaneæ* haud absimili.

Arbor est flore albo, rosaceo, plerumq; pentapetalo (*Ulmariæ* odore) staminibus apicibus farinaceis, & nigricantibus, donatis; ex calyce quintifido, lanuginoso, & fusco, surgit pistillum, quod deinde abit in fructum subrotundum, flavum, coronatum, fraga redolentem, pruni minoris magnitudine, nucleos continentem tres, aliquando duos, raro unicum, membrana communi, tenui, ejusdem cum pulpâ flavi coloris, & membranâ propriâ, fuscâ involutos; Interior nuclei substantia albâ, subamara: Flores in fasciculis nascuntur, folia ferè *Castaneæ* similia, infernè lanuginosa, ex acutâ basi oblonga, latiora, & serrata, versùs summitatem, & in acumen desinentia. *Novembri* floret, & fructus *Mai*o maturescit. D. *Cunningham*.

Arboris

Arboris *Pi-pæ* altera species, non ferrata, foliis viridibus, scabris.

Arboris *Pi-pæ* species altera, Quercinis foliis, *Cheusanica*.

Arbor Lauri folia, floribus minimis, ex albo flavescentibus, *Insulæ Cheusan*. Hujus flores sunt odoriferi, Iridis *Florentinæ* odorem spirantes, monopetali, quadrifidi, ad foliorum alas ex theculâ cauli appressâ, fasciculatim nascentes, pediculis longioribus (undè penduli apparent) stylo brevissimo, duobus staminibus brevissimis stipato, è calyce prodeunte, qui abit in fructum. *Septembri* floret à *Sinis Quei-hóa* nuncupatur, *Martin. Atl. Sinic. pag. 128. D. Cunningham.*

Eadem, Arbuti foliis ferratis.

Arbor conifera Macandou *Javanensium Bontii* fol. 97. Cada-pilava, *H. Malab. part. 1. Tab. 52.* Arbor *Indica* fructu aggregato conoide, Cada-pilava dicta, *Raii Hist. 1442.*

**A**Rbuscula baccifera, *Sinensis*, Lauri folio, ad ortum foliorum baccâ singulari, nigrâ longo pediculo innixâ.

Arbuscula baccifera, Lauri subrotundo folio, fructu rotundo calyculato, rubro, ex *Promontorio Bonæ Spei*.

Arbuscula *Sinensis*, Viburni foliis, ex *Insulâ Cheusan*.

Arbuscula *Cheusanensis*, Phillyreæ alternis foliis, baccis Myrti coronatis. Myrtillus grandis *Cheusanensis*.

Arbus-



Arbuscula *Cheusanensis*, Nerii splendentibus foliis, averſa parte, medio nervo plurimum extante, virgulis purpureis. An Arbor rigidiusculis, & splendentibus Salicis foliis, *Prom. Bon. Spei Mantiff.* 23. pl. ult.

Arbuscula *Maderaspatana*, Ligustri foliis ex adverſo binis, fructu glandiformi, calyce magno elegantér ferrato.

Arbuscula *Cheusanensis*, Salicis pumilæ angustioribus foliis, hirsutie aureâ pubescentibus, fructu parvo, in foliaceo conceptaculo pyramidalis obvoluto. An Cisti genus?

Arbuscula *Ceraſo Hottentottorum*, fructu ſimilis, ſed foliis longé majoribus *Prom. Bon. Spei.*

Arbuscula *Sinenſis*, Ulmi minoris folio, fructu nigro, teſticulato, dicocco, racematim congeſto, ex *Inſ. Crocodylor.* An Kilcola-Tſjetti, *H. Malab. part.* 10. *Tab.* 57.

Arbuscula *Malabarica*, Jaſmini *Arabici* folio, floſculis ad alas foliorum racemoſis. Velle-congee *Malabarorum.*

Arbuscula baccifera *Sinenſis*, Lauri folio minore, fructu corymboſo, ſummo capite coronato. Tau-cudda-murram *Indigenis* dicta.

Arbuscula *Cheusanensis*, *Pyracanthæ* majoribus foliis, margine aſperatis, ſpicas foliolorum, & ſeminum, *Paſſerinae* minoris hæud abludentium, ex alis emittens.

Arbuſ-

Arbuscula Myrtifolia, *Sinenfis*, foliis leviter crenatis, fructu calyculato, pyramidali, ex *Insula Cheusán*.

Arbuscula *Sinenfis*, Myrti majoris folio, vasculo feminali hexagono, ad singulos angulos, alis foliaceis munito, quæ porrectæ, Vasculi coronam efformant; *Um-kí Sinenfis* dicta. Hujus semina *Tinctoribus* inserviunt, iis enim ab *Indigenis* optimè tingitur, nobilis ille color, quem *Escarlatinum* *Nostrates* vocant, ut nos monuit vir multiplicis *Industriæ*, atque indefessi laboris hæc in parte, D. *Jacôbus Cunninghamus*.

Arbuscula baccifera Myrtifolia, in ramulorum cymis fructu racemoso, cæruleo; *Cariwaopulle Malabarorum*. *Almag. Bot. Mantiss. fol. 25.* An fortè Myrtus, cujus bæccæ apud *Antiquos*, antequam *Piper* reperiretur, ejus vicem obtinebant. *Plin. lib. 15. cap. 29.* & *Piperella* dici mereatur, &c. *Vid. in Mantiss. ibid.*

Arbuscula *Indica*, *Acaciæ Robini* foliis, *Cortusæ Americanæ* spicatæ floribus, squalidè purpureis. *Thory-dum-booty Malabarorum*.

Arbuscula *Tiliæ* folio trifoliata, *Aurantiaæ* fructu, *Maderaspatana*. *Movenaim-comboo Malabarorum*. An hæc sit *Nirvala H. Malab. part. 3.*

Arbuscula *Ind. Or.* fructu nuclei *Cerafini* forma, & magnitudine, pulvinato putamine tecto. Hujus fructus haud majores *Cerasi* officulis, oblongo-rotundi, compressiusculi, putamine carnosio, molli ac pulvinato, contexti,



Amygdalæ in modum, quod, fructibus, in maturitatem tendentibus, in utroq; latere dehiscit seq; aperit, ac nucleum relinquit candidum, osseum, & compactum.

Arbusecula *Sinarum*, folliculifera, Hyperici frutescentis foliis, folliculis longis, plurimis isthmis donata.

Arbusecula *Maderaspatana*, Ulmi folia, Palam-chedde *Malabarorum*.

Arbusecula *Maderaspatana*, Pyri folia, floribus comosis.

Arbusecula *Maderaspatana*, oblongis, & mucronatis foliis, singularibus, floribus tetrapetalis, ex purpureo-flavican-  
tibus, ad ortum foliorum prodeuntibus. Coory-tugree  
*Malabarorum*.

Arbusecula *Floridana*, floribus Coral Arboris æmula, hirsutis, ex squammis foliaceis, summo ramulo irrumpentibus. An fortè Cisti *Virginiani* flore & odore Periclymeni, species altera inodora.

Arbusecula baccifera, Guiavæ foliis, *Maderaspatana*. Nan-  
ja roopa *Malabarorum*.

Arbusecula baccifera, *Maderaspatana*, mali Cydoniæ folio, fructu ad alas foliorum, calyce ampliori prædito. Con-  
dan-Guttree *Malabarorum*.

Arbusecula baccifera *Ind. Or. Jasmini Arabici* foliis, fructu in spicam adacto; *Malcotymaram Malabarorum*.

Arbusecula

Arbuscula baccifera *Maderaspatana*, Rhoidis folio triphylla & tetraphylla, floribus parvis racemosis, Woodgamaram *Malabarorum*.

Arbuscula baccifera *Maderaspatana*, Pistachiæ *Virginianæ* sylvestris, latioribus foliis, ternis, quinisvè in cuspidem subito contractis.

Arbuscula baccifera *Maderaspatana*, Ilicis suberiferæ splendente folio, fructu cum calyce parvo, ex alis foliorum proveniente, Veramarram *Malabarorum*.

Arbuscula baccifera *Maderaspatana*, inferioribus subrotundis, majoribus foliis, superioribus, Myrti Laureæ acuminatis, punctis ferè inconspicuis, floribus ex alis foliorum racemosis. Velle-congee *Malabarorum* Fortè Coru genus non spinosum, fructu parvo aggregato.

Arbuscula spinosa Citri coriaceo folio ; texturâ crassâ, densâ, solidâ fructu parvo, odore aromatico. Peringorunde-cheddy *Malabarorum*. Et aliquando Corindamaram. An Coru genus spinosum.

Arbuscula Pyri folia *Ind. Or.* Elæagni fructu juliformi, plurimis simul ex alis foliorum ad caulem surrectis & spiritaliter convolutis. Killepymaram *Malabarorum*.

Arbuscula trifolia, & quinque folia *Ind. Or.* filiquâ Epiglotidi simili, unicum semen continente. An Curigi-Taly. *H. Malab. part. 7. Tab. 26.*

Arbuscula



Arbuscula *Maderaspatana*, Coluteæ foliis, Saururi fructu, spicata; An forte Entada, *H. Malab. part. 9. Tab. 77.*

Arbuscula *Maderaspatana*, Salicis angustiori folio, non serrato, puncticulis vix conspicuis notato.

Eadem folio latiore, & brevior.

Arbuscula *Maderaspatana*, Salicis palustris longissimo folio, subtus candicante, floribus longius spicatis, ex foliorum alis enascentibus.

Arbuscula *Maderaspatana*, Populi nigræ foliis pallidioribus, floribus comosis.

Arbuscula corymbosa, Populi nigræ folio, spinis brevibus recurvis, ad stipites imbuta. è *Maderaspatana*.

Arbuscula *Cheusanensis*, Aceris *Monspessulani* folio, subtus rore cæruleo tincto, longo pediculo infidente.

Arbuscula *Sinensis*, Cisti minoris folio rigidiorè, flores candicantes in quinque vel sex lacinias, longas, angustas, ad umbilicum usq; divisos binatim plerumq; ferens, fructu ovato, parvo, bivalvi, villoso, glandis ad instar calyculato.

Frutex est flore albente, ex quinque plerumq; vel sex petalis, seu laciniis angustis longioribus, cum marginibus paralelis composito, & calyce quadrifido, abeunte in fructum ficcum, ovatum, hirsutum, fuscum, unicap-

unicapsularem, qui bifariam dehiscens, in apice ostendit semen nigrum, splendens ovatum, hilo albo notatum: Calycis summitates divisæ, post flores etiam decidunt, undè fructus apparet instar glandis seminu-  
dæ. Folia fert parva, subrotunda, in brevius acu-  
men desinentia, duriora, & alternatim posita. *Octobri*,  
*Novembri*, & *Decembri* floret. Flores in summitate  
ramulorum, plerùmque bini, vel terni; Ad quatuor,  
aut quinque pedum altitudinem, assurgit, D. *Cun-*  
*ningham*. Aliquando tamèn fructum quidèm fert  
unicapsularem, qui bifariam dehiscens, in apice  
ostendit (non semen unicum, nigrum, splendens,  
ovatum, hilo albo notatum, sed bina semina ovata,  
albente materia obvoluta, in totidem alveolis inclusa.  
Hujus ramulum fructu ornatum, cum multis aliis ra-  
rioribus, ex *Sinarum* Insula *Cheusanensi*, transmisit no-  
bis, D. *Jacobus Cunninghamus*, in *Amalttheo* nostro sæ-  
pè nominandus; Vir eruditione in re *Medicâ*, Chi-  
rurgorum nulli secundus, & in hujusmodi raris, viz.  
Plantis exoticis Indagandis, sagacissimus.

Arbuscula baccifera, spinosa, *Perficariæ* foliis, densis, tri-  
phylla, *Lentisci* modo rachi medio alata, fructu parvo,  
monopyrene, aromatico, *Wha-tchaw Sinenfibus* dicta.

Arbuscula *Pyrifolia*, ferrata, cortice querno, ex Insula  
*Cheusan*

Arbuscula *Sinensis*, *Alaterni* foliis & facie, ex Insula *Cheu-*  
*san*.



Arbuscula *Sinica*, baccifera, folio parvo, subrotundo, foli-  
diori, Garyophylli aromatici fructu, rotundo, monopy-  
rene, & insipido.

Arbuscula *Sinica*, foliis argutè denticulatis, & incanis, Ver-  
basci nigri Salvifolii æmulis, flosculis numerosis, ex fo-  
liorum alis.

Arbuscula *Cheusanensis*, Laurinis pallidioribus foliis, ad  
summum ramulorum, in spicis plurimis erectis, Julo-  
rum ad instar, flosculos ferens.

Arbuscula *Sinensis*, Convolvulaceus, Staphylodendri *Æthi-*  
*opici* folio, lucido, bijugo, margine piloso.

Arbuscula *Sinica*, Cynoglossi foliis, incanis, quiddam in ra-  
morum fastigio, foliolis sericeis, confertim stipatis, com-  
pactile, Rosæ, æmulum, pro floribus ferens. Planta fo-  
liis Cynoglossi, floribus sericeis, in capitula congestis.  
D. *Cunninghami*. In Hortis *Bonziorum* colitur, & *Sinice*  
*Ki-héang* nuncupatur.

Arbuscula *Cheusanensis*, folio Lauri pallidioris, subtus ma-  
gis venoso.

Arbuscula *Sinarum*, alternis minorib. foliis, non puncta-  
tis, floribus Aurantiæ.

Arbuscula *Sinarum*, baccifera, Salicis odoratæ foliis, gla-  
bris, levitè crenatis, & latè virentibus, fructu rotundo,  
monopyreno.

Arbuscula

*Arbuscula Sinarum*, alternis foliis, Arbuti, saturatè virentibus, & argutè denticulatis.

*Arbuscula Sinica*, Rhamni cathartici ferè foliis non ferratis, fructu albo parvo, bivalvi, in calyce villoso penè immerso, ad foliorum ortus, cum pediculis egrediente.

*Arbuscula Prunifolia Sinensis*, floribus parvis, pentapetalis, albis, summis ramulis racemosis.

*Arbuscula baccifera, Sinensis*, foliis Lauri alternatim fitis, fructu nigro, molli, polypyreno, ex alis binatim cum pediculis exeunte.

*Arbuscula Sinensis*, Alaterni alternis, brevioribus foliis, magis mucronatis, floribus pentapetalis albis, *Oxyacanthi æmulis*, in ramulorum fastigiis.

*Arbuscula Sinensis*, Alaterni alternis, longioribus foliis, fructu Myrti solitario inter ramulos sparso.

*Arbuscula Sinica*, Anonæ dulcis folio, minore, non splendente, fructu ex foliorum alis compresso, parvo, orbiculari, striato, duro.

Frutex est flore stamineo, minimo, calyce multifido, vasculo feminali multicapsulari, compresso, (instar feminis Malvæ) plurima semina rubra, in bina serie, per circumferentiam includente; Folia alternatim, brevissimis pediculis cauli adhærent, & singuli flores  
è foli-



è foliorum alis cum brevibus pediculis egrediuntur ;  
Natali cœlo. *Septembri* floret. D. *Cunningham*.

Arbuscula *Cheusanensis*, Salicis caprariæ folio rigidiorè.

Suffrutex flore cæruleo, infundibuli-formi, quadrifido,  
foliis ad basin, & summitatem acuminatis, supernâ  
parte viridi, infernâ, albo virescente, brevibus pedi-  
culis infidentibus, inordinatè positis, cortice est tena-  
ci, *Augusto* floret. D. *Cunningham*.

Arbuscula *Sinarum*, Carpini foliis, fructu rubro, baccam  
mentiente.

Frutex cujus flos, componitur ex quinque petalis, ex-  
terioribus, subviridibus, veluti adhærentibus, & quin-  
que interioribus, ex luteo obscuris, ex cujus calyce,  
parùm quintifido, surgit pistillum, quod deindè abit  
in fructum rubrum, baccæ instar rotundum ; Folia  
fert lanceolata, nervis bijugis, rectis, conspicuis, absq;  
divisionibus, à medio nervo, in folii latera protensis.  
Flores nascuntur in Muscariis, *Octobri* floret, D. *Cun-  
ningham*.

**A** Ristolochia Clematitis, Afari ferè foliis, *Tituanica*.

Aristolochia *Maderaspatana* Sonchi foliis integris, Ari in mo-  
dum auriculatis, Néer-Covy *Malabareis*. An Karivi-  
valli, *H. Malab. part. 8. Tab. 26.*

Aristolochia

*Aristolochia clematitis Indica*, flore albicante, fructu majori, *Commelin.* Notis in *H. Malab.* Careloe-vegon, *H. Malab. part. 8. tab. 25.*

*Aristolochia clematitis*, longo & angusto folio, flore candicante, Cheraver-cuddee à *Sinensibus* dicta.

*Aristolochia Clematitis Sinica*, floribus ex finu foliorum, ad medium petiolum foliolo subrotundo auriculatis, *Arenau-polla Indigenis* audit.

*Aristolochia Clematitis minor*, foliis minutissimè crenatis, ad imum petioli auriculatis, *Ardana-polla Malabarorum.* Idem ferè nomen substituitur *Aristolochiæ* ex eodem loco in *Mantissa* nostra memoratæ. fol. 27. pl. 5. sed ab hac plurimùm diversa.

*Artemisia leptophyllos Sinarum*, ex *Insula Crocodilorum.*

**A** Rum *Æthiopicum* flore albo odorato, *H. Amst.* cum figurâ ; *Arum Æthiopicum*, flore albo odorato, *Moschum olente.* *Hort. Leyd.*

*Arum caulescens Rumicis* agrestis foliis, sibi invicem implicitis, *Virginianum.* *Almag. Bot. 50.* *Dracunculus major Matthioli.* *Matthiolus* vero cum *Dioscoridis* vulgatam lectionem sequeretur, quâ, duo diversa capita, de *Dracontio* majori, & minori, inscripta erant, figuram quoque urtiusque edidit. *Jo. Ant. Saracenus* in eundem *Dioscoridem* Commentator, caput hoc posterius, è contextu sustulit, & inter spuria rejecit, ita ut *Dracunculus* vul-



go notus, major eidem existimetur, minor autem, si quis sit, ipsum Arum censeatur. Certè *Matthiolus* (inquit) *Geo. Hieronym. Velschius de Vena Medinens.* 28. Herbariorum omnium reprehensionem incurrit, quod Dracunculum suum majorem, ex Ingenio tantum adposuisset, nunquam in rerum natura deprehensum; Quod eruditione non minus quam stemmate & virtutibus Celsissimus, Princeps *Federicus Cæsius*, *Tab. Phytosoph.* 15. oppertunè advertit, Illius autem verba sunt, Cum autem probè recognita fuit planta, suo non absque laude restituenda erit loco, indeq; legenda; ut *Faba Ægyptia*, si cui fortè contigerit eam vidisse: vel Dracunculus major, cujus gratiâ malè audire solet *Matthiolus*. Et *Guilandinus* in *Synonymis Mss.* acrius infectatus, Delirasse aiebat, quod Eruditis obtrudi posse speraverit. Item *Marcellus Vergilius* facilè sibi persuaderet duobus capitibus, unum Dracunculum; à *Dioscoride* describi: nec duplex genus, sed duplicem ejus historiam esse: Hujus (inquit) Dracunculi (nempè vulgo noti, sive polyphylli, majoris, eidem) oculati testes nos sumus; Minoris vero (modo alius à majore sit) nec nos aliis sumus, nec nobis alii testes fuerunt, relinquimusq; Minoris hujus quærendam, & inveniendam diligentioribus plantam. In quo non pigebit iterum monere omnes, non adeò veterum Historiis deferre, ut res ipsas vidisse, & observasse, utiliùs fore sibi non existiment. Vid. *Oth. Brunfels. Tom. 1. 66.* Quantum cunque igitur reprehensione dignus fuit *Matthiolus*, qui nonnullas fortè delineari jussit, ex proprio marte, ad *Dioscoridis* descriptionem, accomodatas; Hoc tamen in loco à nobis excusari mereatur, cum in Septentrionalibus *Americæ* regionibus, extat Dracunculus idem; &  
*Josselinus*

*Josselinus* noster in *Nov' Angliæ Razioribus*, 44. de hac ipfissimâ planta loqui videtur, ubi scribit, Dracontium spontè nasci, cujus folia ab omnibus speciebus *Europæis* longè diversa, & in pag. 71. hujus pictura minus quidem feliciter depicta exhibetur, ubi etiam satis imperitè describitur. Idem fortè fit cum Aro illo, quod *Plinius* recenset, *lib. 19. cap. 5.* & appellari potest. Arum foliis Lapathi, radice Scillæ amplitudine. Ait enim (de Bulbis loquens) Est inter genera quod in *Ægypto*, Aron vocant, Scillæ proximum amplitudine, foliis Lapathi, caule recto, duûm cubitorum, baculi crassitudine, radice mollioris naturæ; quæ edatur & cruda.

Arum *Mauritanicum* s. Arifarum Ari majoris folio sagittato, auriculis longis mucronatis.

Arum humile Arifarum dictum, minus *Floridanum*, Acetosæ foliis saturaté virentibus.

Arum s. Arifarum minus *Marianum*, flore, & pene, ex pallido-virescente.

Arundo *Maderaspatana*, panicula maximè sparsâ, Nain-Canne, *H. Malab. part. 12. Tab. 73.*

Arundo Vallatoria minor, *Indica*, spicâ tenui, plumâ feminum candidissimâ.

Arundo *Rottan* dicta, ex cujus viminibus, sedilia conficiunt *Indigenæ*, atq; *Nostrates*. *Perumboo Malabarorum*.

Arundo



Arundo *Japonica*, flava, internodiis brevissimis, furculis nodos stellatim cingentibus, *Raii Hist.*

Arundo nucifera spinosa, foliis plurimis, circa caulem ambientibus, fructu nigricante. *Katu-tsjurel, H. Malab. part. 12. tab. 65.*

**A** Sarinæ foliis & flore, capsulâ bivalvi lignosâ, è *Maderaspatân. Nella-Mullee Malabarorum.*

Asparagus *Africanus* spinosus, crassioribus Lariceis foliis, Vesicæ inflatæ adinstâr, translucentibus bulbis.

Asparagus *Africanus* tenuifolius, Viminalibus virgis, foliis Laricis ad instâr ex uno puncto numerosis, stellatim dispositis.

Asphodelus elatior *Floridanus*, gramineis foliis, floribus parvis ex herbaceo-pallescentibus.

Asphodelo affinis *Floridana*, ramoso caule, floribus Ornithogali obsoletis.

Asphodelo affinis *Africana*, non ramosa, floribus luteis, cepaceis foliis, succulentâ mucagine farctis. Aloe falso dicta.

**A** Ster *Cheusanensis*, Tripolii nostratis æmulus, & fortè idem.

After purpureus elatior *Floridanus*, gramineis foliis argenteo-sericeis.

After

After *Africanus* frutescens, foliis Senecionis crassioribus, *H. Amst. part. alt. fol. 61.*

After cæruleus *Cheusanensis*, foliis subrotundis impensé scabris.

After cujus discus ex flosculis luteis, multifidis, (stamine bicorni præditis) & corona ex semiflosculis cæruleis componitur, & calyx squamosus, & semina pappis instructa; Folia fert subrotunda, & oblonga rigida, & villis aspera, alternatim posita; & flores ex foliorum alis solitarios; *Octobri* floret. *D. Cunningham.*

After *Cheusanensis*, Virgæ aureæ Scabris foliis, floribus cæruleis.

Planta flore radiato, cujus discus ex flosculis plurimis flaviscentib. corona vero ex semi flosculis cæruleis componitur, embryonibus infidentibus: Embryones autem indé abeunt in semina teretia, minuta, pappis instructa, & calyce squamoso comprehensa; Folia alternatim brevibus pediculis nascuntur, oblonga, acuminata, rigida & parùm aspera, crenis raris notata. Flores infident cauliculis foliolis donatis, è foliorum alis propé summitatem egredientibus. *Octobri* floret, bipedalem assurgens altitudinem. *D. Cunningham.*

Idem floribus albis.



*Aster Floridanus*, Ptarmicæ capitulis, Dentillariæ *Rondeletii* folio, floribus cæruleis.

*Aster Floridanus* ramosior, nervosis foliis, Ptarmicæ capitulis, cæruleus.

*Aster parvus Africanus*, Scabiosæ *Ovillæ* hirsutis foliis, flore unico cærulescente.

*Aster Cheusanensis*, Virgæ aureæ alternis foliis, summo caule flore parvo singulari.

*Aster Orientalis*, folio oblongo, ad oras crenulis minutissimis asperato, floribus albis.

*Aster Floridanus*, Bellidis Umbelliferæ foliis pilosis, amplioribus floribus, insignitus.

*Aster luteus Floridanus*, Virgæ aureæ *Americanæ* foliis, summo caule brachiato,

*Aster luteus Cheusanensis*, Salignis foliis incanis.

*Aster Cheusanensis* luteus, *Lyfimachiæ* filiquosæ foliis, inferne villosis.

*Aster*, s. *Planta* flore luteo radiato, cujus discus ex plurimis flosculis luteis multifidis, corona quoque ex semiflosculis luteis componitur; embryonibus insidentibus, & calyce squamoso (squamis longioribus) comprehensis: Embryones autem deinde abeunt in semina pap-  
pis

pis instructa ; Ex flosculis provenit stamen longius bicornè, Folia fert alternatim posita, oblonga, & acuminata, supernè pallidé viridia, infernè incana, & villosa ; *Septembri & Octobri* floret. D. *Cunningham.*

After *Floridanus* aureus, caule alato, summa parte brachiato, petalorum apicibus profundè crenatis. An hæc forsàn sit *Tlaloceloxochitl.* *Nov. Hispaniæ Hernand.* apud *Recc.*

After luteus *Cheusanensis*, Bliti majoris folio, paucioribus floribus, summo caule brachiato.

After *Maderaspatanus*, foliis denticulatis lanceatis, summo caule flore parvo, singulari, luteo.

After *Cheusanensis* luteus, Botryos folio, plurimis floribus, summo caule brachiato.

After *Canadensis*, Bardanæ majoris serrato folio, floribus parvis, in fastigio ramulorum coronatus.

*Astragalus alpinus conophoros*, s. *Alopecuroides*, *Schol. Bot. Turnefort. & Institut.* 416.

**A** Uriculæ Ursi affinis (*Androsace dicta*) *Sinensis*, Saxifragæ aureæ foliis, pediculis longis infidentibus.



B.

**B**Alaustii foliis bijugis, ad genicula spinulis parvis barbata, Frutex *Maderaspatanus*.

**B**alsamina lutea *Virginiana* major &c. *Almag. Bot.* 63. pl. 2. à *Nov'anglicanis* colonis, The *Humming-Bird-Plant* nuncupatur; Icon exhibetur apud *Rariora. Nov'angl. Jo. Josselin. pag.* 73.

*Barba Jovis Indiae Orientalis*, foliis conjugatis, subtus incanis, *Turnefortl. Institut.* 651. In *Hort. Episcopali* apud *Fulhamiam* colitur.

**B**ellis montana major, Chrysanthemum vulgare folio, splendente, pingui, *Hort. Comptoniani*.

*Bellis montana* major foliis saturatè virentibus, profundè incis, flore minore, *ejusd. Horti.* An *Leucanthemum Alpinum*, foliis profundè incis, *Turnefort. Inst.* 1493.

*Bellis umbellifera Americana*, floribus amænè cæruleis, ex *Hort. Badmingtoniano*.

*Bellis minor umbellifera*, *Gnaphalii lanosis foliis Floridana*.

*Bellis Americana*, *Auriculæ ursi* foliis crassis *Badmingtoniana*. D. *Sherard*.

Bellis

*Bellis Africana* major, surrectis rigidioribus (*Agerati* foliis, floribus parvis, ferè umbellatis.

**B**litum minimum nodosum, *Ind. Or. Cherukera Malabarorum.*

*Blitum* odoratum lignosum, s. *Arborefcens Americanum.*  
*Botrys fruticosa Americana, Park. Theatr.*

*Blitum Kali* dictum *Sinense* maritimum, album, vermiculatis & crispatis comis. *Chamæpitys maritima. D. Cunningham.* ex *Insula Cheusan.*

**B**raffica sylvestris, *Telephii Hispanici* foliis, floribus amplis cæruleis, radice perenni. *Braffica sylvestris, Fabbriæ foliis Bocconi de Plantis Sicul. pag. 49. cum Icone.* Non differt à *Braffica secunda sylvestri Clusio*, nisi radice (inquit *Bocconus*) quæ in nostrâ perennis est.

*Brunella Mauritanica*, *Hyssopi* longiore folio, capitulis tomentosis.

**B**ryonia alba baccis nigris, *C. B. P. 297.* *Vitis* s. *Bryonia baccis nigris, J. B. Bryonia alba vulgaris, fructu nigro, Volkamer. Flor. Noriberg. circa Cantabrigiam nostram, hæc infrequens oritur.*

*Bryonia Africana*, tenuissimè laciniatis foliis, radicè rapacè nigricante. *Bryonia Africana glabra, foliis profundè sectis tenuioribus, Parad. Batav. cum Icone. pag. 108.*



Bryoniæ (forte) species, aut Cucumis *Maderaspatana*, foliis multiscissis, Cal-covy *Malabarorum*.

Bryoniæ nigræ s. racemosæ vulgaris Planta similis, ex *India Orient.* Cheendil-curry *Malabarorum*.

Bryoniæ nigræ similis *Maderaspatana*, foliis rigidioribus, spicatis floribus atropurpureis.

Bryoniæ nigræ similis *Floridana*, muscosis floribus Quernis, foliis subtus lanugine villosis, medio nervo in spinulam abeunte.

**B**ucanephyllon *Americanum*, Limonio congener dictum. *Almag. Bot. fol. 71. pl. ult.* Hujus folia in terram procumbunt; Icon habetur satis infelicitè exculpta apud *Nov' angl. Rariora Jo. Josselin. pag. 54. Sarracena Canadensis* foliis cavis & auritis, *Turnefort. Inst. 657.*

Bucanephyllon elatius *Virginianum* *Almag. Bot. fol. 72. pl. 1.* cujus Icon exhibetur in *Phytograph. Tab. 152. fig. 3.* exactior autem in *Amalthæo.* Hujus folia eriguntur.

**B**uglossum *Maderaspatanum*, Coida-humbee *Malabarorum*.

Buglossum simile *Bengalense*, angustioribus foliis. An fortè Buglossum similis Planta *Indica*; *J. B. tom. 3. lib. 34. 631.* Nascitur apud *Gangem* fluvium, Planta hæc Buglossum confimilis, quam conterentes, succum ipsius servant, & profundâ nocte latibula Tigridum circumfundunt; ipsæ

ipsæ vero propter facultatem effusæ viriditatis, cum progredi non possint, moriuntur, sicuti memorat *Plutarchus* (non *Chæronensis* ille) ex opinione *Callisthenis* in lib. 3. *Venationum*.

Buglossum parvum *Tituanense* *Elatines* fæminæ foliis hirsutæ asperis, ad summum caulem flore unico cærulescente.

**B**ulbocastano similis planta *Indiæ Orientalis*, *Hort. Uvedal.* Hujus semen à *D. D. Sherardo*, fuit communicatum. An Cuminum semine longo.

**B**upleurum *Lusitanicum*, gramineo longiori, & rigidissimo folio, *Instit. 310.*

Bupleurum *Tituanicum*, radice *Vetonicæ* minimæ densissimo foliorum stipatu, obvallatâ.



[illegible]

Alamintha montana, longiori folio glabra, è  
Maderaspatán. Cauto-tullashy Malabarorum.

*Maderaspatán. Cauto-tullashy. Malabarorum.*

**C**alamintha *Sinensis*, Ocymi folio, & odore  
Sifymbrii.

Sifymbrii.

**Calamintha montana** *Cheusanensis*, Origani folio, odore  
Pulegii.

Pulegii.

Calamintha *Mariana*, calyculis lanatis, cum folliculis, s.  
Calamintha *Americana* Halicacabos.

Calamintha *Americana* Halicacabos.

*Calamintha Lybica* Camphorata, foliis incanis.

Calamintha *Cheusanensis*, Pulegii odore, dentatis foliis, floribus dilutè cæruleis, ex longo, ramoso, & brachiato caule prodeuntibus. An Calamintha montana præalta, *Boccon. Mus. part. 2. pag. 45.* Calamintha præalta Pulegii odore; *Ejusd. Tab. 40.* Calaminthæ præaltæ Pulegii odore altera *Icon, ex Sabaudia. Ejusd. Tab. 38.*

Calendula maritima, lanuginosa, fortè Caltha maritima  
Lusitanica, lanuginosa, Turnefort. Inst. 499.

*Lusitanica*, lanuginosa, Turnefort. Inst. 499.

Calendula sylvestris, elatior. *Hispanica*. An Caltha syl-  
vestris *Lusitanica*. *Turnefort. Inst. ibidem.*

vestris *Lusitanica*. Turnesfort. *Inst.* ibidem.

Calendula fativa, flore pleno saturatè croceo.

# Canipa-

**C**Ampanula *Sinica*, Ocymi majoris folio, flosculis ad summitatem perexiguis.

Campanula *Africana*, annua, glabra, ferrato folio, flore pallido. *H. Amst. part. alt. 71.*

Campanula *Africana*, hirsuta, parvo angustoque folio, flore pallide violaceo. *H. Amst. part. alt. 73.*

Campanula parva, Satureiæ foliis, flore purpurascente, *Maderaspatana*. *Vaucaupundoæ Malabarorum.*

Campanula *Maderaspatana*, Pulegii foliis hirsutis, flore cæruleo parvo.

Campanula. s. Speculum Veneris longifolium, è *Siciliâ*, *Hort. du Boisiani.*

Campanula, s. Speculum Veneris *Thracicum*, flore amplissimo, *D. Covel. Raii Cat. Stirp. Orient. pag. 19.*

Campanula pentagonia, perfoliata, minor, ex *Floridâ*.

Campanula minima *Maderaspatana*, Alfinæ Holostæ minoris folio, flore parvo violaceo. Est Rapunculi (fortè) genus.

**C**Annabis sterilis, s. fœmina nostras è regione *Sinarum*. *Kalensgi-Cansjava. H. Malab. part. 10. tab. 60.*



**C**Apparis (forté) Frutex, duplicatis spinis, brevibus, recurvis, atronitentibus, è *Maderaspatán*.

**C**Ardiaca perennis *Africana*, frutescens, Nepetæ foliis, flore phœniceo minore. Leonuros *Hysiquanensis* frutescens, Nepetæ folio, *Cat. Plant. ad calcem Parad. Bat.*

Cardiaca angustiori folio *Sinica*, flore cærulescente, & purpureascente.

Cardiaca *Sinensis*, Ballote foliis, ex *Insula Crocodilorum*.

Cardiaca *Sabaudica*, Grossulariæ folio, longis aculeis donata galeâ florum lanuginosâ. Invenit D. *Sherard* in Montibus *Sabaudia*.

**C**Arduus lanceatus angustifolius, *C. B. prodr. ex Sicilia*.

Carduus tomentosus, s. Acanthium, ex *Aleppo*, alato caule, flore magno cæruleo, Cinaræ instar. *Hort. Med. Edinburg. pag. 4.*

Carduus *Siculus* elatior, Acanthi foliis, capitulis tomentosis, summo caule glomeratis, *Hort. du Boissian*.

Carduus palustris major, altissimus, *H. du Boissian*. An *Cirsium Pyrenaicum* altissimum, *Turnefort. Instit. 448.*

Carduo-Cirsium exoticum, foliis splendentibus glabris, capite magno singulari, *Hort. Uvedalens.*

Carduo-Cirſium *Sinarum*, foliis magis ſpinofis, capitulo ſingulari.

Carduus *Floridanus*, anguſto Salicis folio, mitioribus ſpinis, ſubtus incano, capitulis Cirſii. An fortè Carduus Jacæoides purpureus, foliis ſubtus incanis, capite viſcoſo. *Baniſt. Cat. Stirp. Virg.*

Carlina purpurea, Carduncelli foliis, capitulo rotundo, Calcitrapæ in modum aculeato, ex Inſulâ *Cypriorum*. An Carduus Eryngioides, capite ſpinofis, *Proſp. Alpin. pl. exot.* 158.

Carlina Chryſanthemos, foliis ſubtus argentea lanugine villoſis, capitulis parvis, in umbellam ſitis. *Hort. Comptoniani*. An fortè *Acarna montana*, umbellata, lutea, *Schol. Bot.* 218.

Carlina *Mauritanica*, caule ramoſo capitulis parvis luteis, ſpinis aureis echinatis.

Carlina *Feffanenſis*, floribus intus aureis, extus venuſtè purpureis ad caulium nodos ſpicatim enaſcentibus.

Eadem puſilla ſpecies, flore unico verſicolore, ex *Feffei* regni montibus *Forjoon*.

Carotæ effigie, ſ. Paſtinaca tenuifolia, è *Maderaſpatân*.

Carpini foliis Exotica profundius dentata, virguliſtenuiſſimis, ex *Horto Comptoniano*.

Carpi-



Carpini angustioribus elegantè venosis foliis, Planta convolvulacea, ex *Provincia Caroliniensi*.

Caryophyllata alpina quinquefolia, *C. B. P.* 322. Caryophyllata alpina pentaphyllæa, *Lob. Adversar. cum Icone*.

Caryophyllata *Floridana*, flore luteo imis foliis perpetuò trifariam divisis.

**C**assia Cinamomeæ Myrrhæ odore *Phytograph.* similis, ex *Insulâ Cheusan*.

Cassia sylvestris *Maderasptaana*, pinnis, elegantè venosis pediculis brevibus atropurpureis innixis, flore luteo, fructu fistulari.

Cassia Fistulæ *Indica*, flore carneo, *Cl. Sebastiani Jagerii Breyn. Prodr.* 2. 26. Hujus semina cum orbiculis fungosis studiosè asservantur apud *Collectaneas Orientales* in nostro *Rarithecio*.

Cassiae Fistulæ *Jamaicensi* similis, Tamarindi ovatis foliis, densioribus, glabris, & alternatim sitis, è *Maderaspatân*.

Cassine altera *Floridana*, folio *Alaterni Hysicanensis* æmulo, ex *Horto D. Darby*. Vid. *Almag. Bot.* 55. pl. 7. de *Ufu*. Incolæ *Provinciae Carolinae* dictæ in *Floridâ*, è foliis hujus Arboris potum Theæ similem, & viribus ferè parem, conficere dicuntur.

Castanea

Castanea folio multifido nana, Saamounæ foliis, *Americana*.  
Idem fortè est, quod nos aliquandò habuimus pro ipsissimâ Saamounâ.

**C**entaurium medium, s. Serratula *Floridana*, foliis vix ferratis.

Centaurium medium, s. Serratula Mentaſtri folio, *Æthiopica*.

Centaurium minus, Vulgari similis, ex Insula *Sinarum*, Ukui-san. Mense *Junio* collectum.

Centaurium minus Ascyroidis folio alterno, Trapezii formâ transparenti, ex Insulâ *Cheusan*. Huic Folia ad caulem non sunt bina, & bina, sed alterno ordine sita.

Centaurium minus, Strychnodendri foliis, floribus purpureis, ex Lini quasi capitulis, summo caule irruipientibus. Narry-cum-batty *Malabarorum*. A Narre-comptee *Malabarorum* Mantissæ nostræ haud multum discedit.

Centaurium minus *Cheusanense*, spicatum; *Augusto* mense floret.

Centaurium luteum perfoliatum, ampliori folio, et flore *Mauritanicum*.

Centaurium minimum *Mauritanicum*, flore luteo.



**C**Erasmus racemosus, *Ind. Or. Lauri vulgaris folio*, fructu in spicam disposito, *Nelinsgimaram Malabarorum*.

*Cerasa Hottentottorum* (quoad folia) haud absimilis, fructu coronato, ex *Insulâ Cheusan*.

*Ceratia diphyllus Animifera*, foliis amplissimis, è *Maderaspatan*. *Arkenarmora Malabaréis* audit.

*Cerinthæ alpina perennis*, flore striato, *Turnefortî Instit.* 80. *Glastrum montanum Dalechampii*; *Hist. Lugd.* 1204.

**C**Hamædrys hirsuta, *Cretica* floribus purpureis, *Polii* in modum, summis ramulis coronata.

*Chamaelea Indica* tricoccus, *Salicis splendentibus*, glabris foliis, fructu rugoso, triplici diademate coronato. *Canton-anna, Malabarorum*.

*Chamæmelum erectum*, crassioribus foliis, *Africanum*.

**C**hristophoriana cæruleis bacceis, *Floridana*, fructuum pediculis crassis, & compressis.

*Christophorianæ facie*, *Herba spicata*, ex *Provincia Floridana*.

*Chrysanthemum majus Floridanum*, folio hastæ cuspidi simili scabro.

*Chrysanthemum Floridanum*, majus album, foliis *Chelidonii maximi Canadensis* foliorum æmulis, marginibus rariùs

rius dentatis, floribus parvis. Huc fortè spectat illa pictura apud *Josselinum* exhibita; pag. 77. *Nov'anglican. Rariorum.*

*Chrysanthemum Floridanum* majus, foliis mucronatis, subtus cœsiis, ferris minutissimis margine asperatis.

*Chrysanthemum Floridanum* pilosissimum non ramosum, sulphureo flore amplo, summo caule singulari.

*Chrysanthemum* angustiori folio, hirsutie molli, villoso, florum disco nigro, petalis aureis radiato, ex *Carolinâ*.

*Chrysanthemum* frutescens *Africanum*, *Telepii* ferè foliis crassis, *Osteocarpon*. (i. e.) semine ferè orbiculato, officula *Cerasorum* æmulante.

*Chrysanthemum Africanum*, *osteocarpon*, *Lycii* more aculeatum. *Chrysanthemum Africanum* frutescens, spinosum *Volkameri*, *Flor. Noriberg.* pag. 105. cum *Icone. Jacobææ* spinosa, brevi *Leucoii* folio, viridi, *Boccon. Mus. Pl. decad.* 12. pag. 173. tab. 121. Ad hanc classem referri potest.

*Chrysanthemum* angulosis. *Platani* foliis, *Virginianum*, *Almag. Bot. fol.* 99. & *Phytograph.* exhibitum, *Tab.* 83. fig. 3.

*Chrysanthemum Virginianum*, *Plantaginis* rugosis foliis, radice repente. *Almag. Bot.* 99. pl. 2. Hujus Icon, sed minus



minus fælicitèr depicta, exhiberi videtur apud Jo. Josselin. *Nov'ang. Rarioribus. pag. 82.*

*Chrysanthemum Maderaspatanum*, Altheæ folio molli, caule scabro floribus parvis luteis.

*Chrysanthemum Malabaricum* Scrophulariæ foliis octopetalon ; Vallia-manga-nari, *H. Malab. part. 10. tab. 40.*

*Chrysanthemum Malabaricum*, Bellidis majoris folio, flore octopetalo, Pee-Cajennéam, *H. Malab. part. 10. tab. 42.*

*Chrysanthemum Sinicum*, Bellidis majoris folio, floribus parvis, in ramulorum fastigiis.

*Chrysanthemum Indianum*, Conyzæ mediæ foliis scabris, crispatis, floribus gemellis, ex alis foliorum, pediculis, brevissimis infidentibus. *Corachinaconee Malabarorum.*

*Chrysanthemum Africanum* minus, foliorum marginibus, & medio nervo spinulis asperatis, flore singulari parvo.

*Chrysanthemum* minus, Anchusæ foliis, floribus parvis *Cheusanense.*

*Chrysanthemum Sinense* procumbens, Hyssopi foliis, pilis tenuissimis, margine fimbriatis.

*Chrysanthemum*, Cannabinæ aquaticæ latiore folio indiviso, ex Insula *Cheusan.*

*Bidens* s. *Eupatorium aquaticum*, folio ferrato non diviso, flore flosculofo luteo, plurimis flosculis constante, multifidis, embryoni infidentibus, foliolis membranaceis intermediis, & calyce folioso, cum foliolis membranaceis composito, comprehensis. Embryo autem abit deinde in semen, in duos desinens aculeos, Septembri floret, Folia fert bina oblonga, ad basim, & summitatem, in acumen desinentia, Sinicè *Mok-teu-tsaw* nominatur D. Cunningham.

*Crhysoanthemum Orientale* *bidens*, s. *bicorne*, *Ocymi majoris* folio profundè crenato; floribus parvis bullatis aureis. Recensetur Hæc planta inter *Seneciones*, per errorem in *Almagest.* nostro, fol. 343. pl. 9. Nam à D. Sherardo primo didicimus Hanc *Acme*llā à *Ceylonensibus* nuncupari, qui nobis asseruit, hujus semina esse solida, minimè pappescentia, & bicornia. Quæ omnia vivâ voce nobis confirmavit, Cl. Vir, Jo. Philip. Breynius, qui integram Dissertationem de illa doctissime scripsit, sub titulo *Chrysoanthemi bidentis Zeylanici*, *Acme*lla dicti; ubi de Virtutibus satis diffusè pertractavit.

*Chrysoanthemum*, *Conyzoidi Cannabinæ* simili, capitulis deflexis *Almag. Bot.* 101. s. *Asteri cernuo* *Fab. Columnæ* proximè accedens, Herba ex Insulâ *Cheusan*.

Planta est flore flosculofo, plurimis flosculis constante, multifidis, brevibus, viridibus, (capillamento flavescente præditis) Embryoni infidentibus, & calyce squamoso, ac foliato comprehensis: Embryo autem abit deinde in semen longiusculum, pappis nequa-



quam instructum. Folia fert oblonga, & lanceolata, alternatim posita, *Octobri* floret, *D. Cunningham.*

*Chrysanthemum Creticum* flore polypetalo, s. pleno, *Hort. Catholic. Supplem. 2. 18.* flore albo. Idem flore luteo.

*Chrysanthemum* flore pleno, partim candido, partim luteo *Turnefort Inst. 492.*

**C**Ichoreo affinis *Lampisana Sinica*, *Mentastri* foliis, calyce fimbriato, hispido. *Sinice Hî-hîm-tsaw* dicta.

Planta est flore luteo radiato, cujus discus ex plurimis flosculis, corona verò ex semiflosculis componitur, embryonibus insidentibus. Embryones autem deinde abeunt in involucra, s. capsulas semine fœtas incurvo, pyramidato, inverso, cujus basi adhæret flos, non vero capsulæ, quæ interiùs dehiscit, capsularum semiflosculos sustentantium, pars exterior quasi echinata, interior lævis, flosculorum capsulæ totæ læves. Calyx fit ex quinque plerumque segmentis angustis, extensis, ad summitatem obtusioribus, inferiùs levibus, superiùs uncinulis hispidis armatis, chartæ adhærescentibus; semiflosculi sunt brevissimi, parvi, & trifidi, ex averso parum fusci: Folia fert bina, & opposita, subrotunda, ad basin & summitatem acuminata, in æqualiter dentata, cauli brevissimo pediculo adhærentia; Planta est ramosa & *Lampsanæ* assimilatur, quoad externam faciem, *Natali* solo, *Septembri* floret. *D. Cunningham.*

*Circææ* foliis, *Amaranthi Siculi Bocccone* spicâ, floribus parvis, purpureis, propendentibus, *Herba Floridana*.

*Cistus Rhododendros*, fericeis foliis, *Insulæ Cheusanensis*.

*Cistus chamærhododendros Mariana* triphyllos, *Myrtinis* foliis, floribusq; purpureis, parvis, circa caulem verticillatim positus. Idem cum *Arbuscula Mariana Ligustri* foliis ternis, circa caulem ambientibus floribus plurimis, ad ortus foliorum amænè purpureis, *Mantiss. 26. pl. 5.* Cujus *Icon* habetur in *Phytograph. Tab. 339.*

*Cistus Sinica*, *Cisti Populi* nigræ majoris, foliorum æmula.

*Cistus minor Cheusanensis*, *Salicis pumilæ* folio angusto & incano.

*Cistus humilis azoides Africana*, glauco folio flore, albo, *Parad. Batav. 122.* *Telephium maritimum*, Sedi folio, flore albo, *Turnef. Inst. 248.*

*Cistus humilis*, s. *Chamæcistus elatior*, flore luteo, *Floridanus*.

*Cistus humilis Lusitanicus*, s. *Helianthemum Genistæ tinctoriæ* frutescentis, foliis incanis.

*Cistus humilis*, s. *Chamæcistus* flore albo, *Vulgari* similis, ex *Insulâ Crocodilorum*.

Clematis



*Clematis Bucananthos minor Americana*, Cardamines alternis foliis majoribus & subtus incanis.

*Clematis Cheusanensis*, Bucananthi majoris ferè foliis solitariis, ad margines, spinosis ferris, spica florum ampliori, ex foliorum alis.

Descriptio sequitur *Cunninghamiana*. Planta repens flore purpureo-violaceo, monopetalo, Infundibuli-formi, quadripartito plerumque, ex cujus fundo surgit pistillum, duobus ut plurimum staminibus stipatum, quod in vasculum abit feminale, ovatum, calyce donato profundè multifido, flores in foliorum angulis, spicatum nascuntur, folia cauli alternatim brevibus pediculis adhærent ferrata, é basi obtusiore in acumen desinentia, viridia, & lævia, Septembri floret, in Saxo-sis proveniens. Ad Amaranthioidem accedit.

*Clematis arborea*, summo folio bicorni, ex Insulâ *Cheusan*. Naga-mu-valli, *H. Malab. part. 8. tab. 30. & 31.*

*Clematitis latifolia*, s. *Atragene* quibusdam similis, tetraphylla, è *Maderaspatan*.

*Clematitis*, s. *Flammula* scandens tenuifolia, floribus amplis, semper trifoliata, ex *Floridâ*.

*Clematitis maritima minor Sinensum*

**C**linopodium *Sinense*, nostrati simile, sed minus.

Clinopodium

*Clinopodium* Origano simile ex Insulâ *Cheusan*.

*Clinopodium* Origani fistulosi *Canadensis* folio, coronatum, Camphoram spirans *Mantiss.* 52. Ocymo affinis *C. B. P.* 226. Albahaca herba, quæ odoris gratia in *Novâ Hispaniâ* excolitur; *Joseph. Acosta. lib. 4. cap. 27.*

*Clinopodium Cheusanicum* Chamædryos folio majore.

*Clinopodium* parvum *Sinicum*, hirsutis Majoranæ foliis, coronatum. Majoranæ species, flore cærulescente monopetalo, labiato, cujus labium superius surrectum est, subrotundum, bifidum, inferius verò tripartitum, foliis parum villosis. *Septembri* floret, *D. Cunningham.*

**C**occuli *Indi* species, tenerioribus subrotundis foliis, incanis; Caulcadde *Malabarorum*. Huic nostræ, *Natsjatam*, *H. Malab. part. 7. tab. 1.* propius accedere videtur.

*Cocculi Orientalis* Frutex, convolvulaceus, orbiculatis foliis, pronâ parte villosis, ex unâ de Insulis *Crocodilorum*.

*Cocculus Indus* Afari grandioribus foliis, glabris, è *Maderaspatân*. Hujus sunt fructus, *Cocculi Indi Officinarum*.

*Cocculus Indus*, foliis *Aristolochiæ* subtus lanuginosis, fructu minore, *Perrun-curry Malabarorum*.

*Cocculi Indi* altera species minor, scandens *Vincæ* pervincæ foliis villosis. *Chaunacurry Malabarorum*.

R.

Cocculi



Cocculi Orientalis Convolvulaceus Frutex, foliis subrotundis glabris, & *Maderaspatán*. An forte Batta-Valli & Cattu-Valli *H. Malab. part. 11. tab. 62.*

Cocculi *Indi* species minima, Myosotidis scorpioidis hirsutis foliis & facie, fructu minimo reniformi. *17. Acc.*

**C**Oles fructui similis, s. Fructus ex *Bengalá* ad Coles accedens, *Clus. Exod. lib. 2. cap. 14.* Fructus oblongus, cineraceus, rugosus, & gibbosus, *C. B. P. 404.*

Colutea *Maderaspatensis*, amplioribus foliis, floribus spicatis parvis, *Arymaram Malabarorum*,

Coluteæ facie *Maderaspatana*, folio, & sapore *Glycyrrhizæ*.

Colutea parva *Malabarica*, foliis pubescentibus, filiquâ Scorpioides brevi. *Man-todda-Vaddi, H. Malab. part. 9. tab. 22.* Mimosa *Malabarica*, foliis pilosis non spinosa, minor, flore papilionaceo luteo, filiquis angustis, articulatis, *Commelin. Notis. in locum.*

Colutea minor *Maderaspatana*, Ornithopodii foliis, filiquis hirsutis asperis.

Colutea *Africana*, argentea minima, *Prom. Bon. Spei. Hort. Compton.*

Colutea Vesicaria *Africana*, vesiculis depresso, floribus pureis, spicatis parvis, *Cat. Plantar. ad calcem Paradis. Bat.* Colutea *Africana* vesicaria, vesiculis compressis, flosculis atrorubentibus, *Volkamer. Flor. Noriberg. pag. 118.*  
Conferva

**C**onferva *Maderaspatana*, Alloco-pashy *Malabarorum*.

*Conferva Rivulorum nostras*, bicornis, filamentis tenuissimis; Invenit Ingeniosissimus, *Dominus Rand*.

*Convolvulus Maderaspatensis*, foliis amplissimis. An fortè *Munda-Valli*, *H. Malab. part. 11. tab. 50.* *Convolvulus Malabaricus* flore amplo viridi, diluto colore, *Commelin. Not. in locum.*

*Convolvulus Maderaspatanus*, amplissimis foliis, subtus lanugine argenteâ splendente, densius vestitis.

*Convolvulus Maderaspatanus*, subrotundis amplioribus foliis, viticulis spinosis. Idem forte cum illo *Americano*, qui habetur in *Almagesto Botan. fol. 115. pl. 2.* cujus *Icon* habetur in *Phytograph. tab. 276. fig. 4.*

*Convolvulus Floridanus*, majore folio incano, summo apice longiùs mucronato, flore parvo puniceo. Seminibus è *Carolinâ* transmissis natum Vidimus, in *Horto D. Darby* apud *Hocksdon*. Hujus quoque semina ex *Persia* sibi fuisse allata, nobis affirmavit Eximius Exoticarum stirpium cultor, *Dominus Reynardsonus*. An *Quamoclit Americana*, foliis amplissimis, cordiformibus, *Plumiero, Turnefort. Inst. 116.*

*Convolvulus major Floridanus*, folio incano Ari quodammodò referens, auriculis magnis subrotundis.

*Convolvulus Maderaspatanus*, trifido *Palmodeccæ* folio, hirsutie pubescens. *Collycaucana Malabarorum.*

Con-



*Convolvulus Maderaspatanus*, Pistolochiæ foliis, floribus purpureis.

*Convolvulus angustissimo lanceolato folio, flore minore albo*; Amear-Blundoo *Malabarorum*.

*Convolvulus angustissimo, auriculato, longiori folio, lanceolatus, flore purpureo, parvo.*

*Convolvulus minor Sinenfis*, longiore hirsuto folio, flore albo parvo.

*Convolvulus Maderaspatanus minimus*, Alfinæ folio argenteo, molli, flore purpureo. Neer-crandy. *Malabarorum*.

*Convolvulus maritimus*, s. Soldanella minor Vulgari similis, è *Maderaspatan*. Parrette *Malabarorum*.

*Convolvulus argenteus, rectus Sinarum*, spicæ folius.

*Conyza arbor Ceylonensis*, subrotundo folio maximè tomentoso.

**C**Orallina parva tenuissima, eburnei nitoris plumosa, *The feather'd-fine Coralline*. Ad oras maritimas nostras, spontè nascens. An Corallina capillacea argentea; *Turnefort. Instit. 572*. Muscus argenteus marinus nostras, similis plumæ *Donati. 114*.

*Corallium album minimum, Armoricum, & Cambrobritanicum*, rupibus adnascens.

Corio-

**C**oriotragematodendros, s. Arbor Caroliniensis, *Ælæagni Cordi* foliis, fructu saccharati specie, & magnitudine *Coriandri*. **The Coriander Comfit Tree, of whose Berries they make Candles.** An forte *Ligustrum Americanum*, *Lauri* folio, flore flavescente, bac-  
cis niveis *Plumieri*. *Turnef. Instit. 597.*

**Coriotragematodendros**, s. *Ælæagno Cordi* similis, Frutex *Africanus*, brevioribus hirsutis foliis, levitèr dentatis. Ad hanc Classem fortè spectat *Laurus Africanus*, serratis fo-  
liis, *Bartholin. Act. Medic.*

**Coriotragematodendros** *Sinārum*, foliorum marginibus ma-  
gis serratis.

**Coriotragematodendros** *Africana*, Botryos amplioribus fo-  
liis densis, ex *Prom. Bon Spei*. An *Laurus Africana* minor  
*Querci* folio, *Hort. Amst. part. alt. fig 81. fol. 161.*

**Coriotragematodendros** minor *Africana*, *Quercinis* tenuius  
dissectis foliis.

**Coriotragematodendros** *Ilicis aculeatæ* folio, ex *Prom. Bon. Spei*. *Tithymali* facie *Planta Æthiopica*, *Ilicis aculeato* folio, *Almag. Bot. 373.* cujus Icon habetur in *Phytograph. Tab. 319.* Hujus generis Arbores omnes fructum fe-  
runt parvum, monopyrenum, veluti Saccharo candidis-  
simo in crustatum, stipitibus in racemos adnascentem.

**Corni** fæminæ folio Frutex ex Insulâ *Cheusan.*



Corni similis *Cheusanensis*, baccâ parvâ calyculatâ, striatâ rubrâ, foliorum alis binatim egrediente.

Frutex baccifer, foliis ex adverso binis subrotundis acuminatis, baccis rubris, umbone præditis binis, brevi pediculo & calyci integro insidentibus, in pulpâ molli, & lutescente, semina compressa, Sesami instar continentibus. Mense Septembri collegit D. Cunnigham.

Corno feminae similis, Arbuscula *Floridana*. An Fruticulus Cornifoliis, floribus albis, fistulosis, racematim in spicam congestis, *Banister. Cat. Stirp. Virgin.* Nostri tamen flores, Corymbi in modum sunt dispositi.

Cornus mas s. Sassafras, Laurinis foliis indivisis, ex Provincia *Floridana*. Sassafras fortè Lauri foliis *Pison. 146.*

Coru genus *Ind. Orient.* spinosum, Mali medicæ foliis subrotundis; *Peringorundy-chedde Malabarorum.*

Coru altera *Maderaspatana*, Limoniæ parvis foliis, summâ parte sinuatis, *Corenda-chedde Malabarorum.*

Coru *Indorum*, Myrti *Bæticae* latioribus foliis, Limoniæ fructu parvo, aggregato, carulescente.

**C** Rocus purpureus minimus, foliis gramineis, *Prom. Bon. Spei.*

Crotalaria *Maderaspatana*, singulari folio amplo argenteo, & sericeo, floribus aureis.

Crota-

*Crotalaria* Genistæ tinctoriæ foliis sericeis, *Maderaspatana*.

*Crotalaria* Ind. Or. Salicis pumilæ angustioribus, sericeis foliis, filiquâ inflata brevi, Elly-pundœ *Malabarorum*.

*Crotalaria* Ind. Or. foliis singularibus, parvis, argenteo-sericeis, filiquâ subrotunda brevi. Nevally-pondœ *Malabarorum*, & aliquando Nella-crandee. Attamen à Loto affini monophyllo, Polygalæ foliis, argentea hirsutie pubescentibus; *Mantiss. nostr.* 120. sub eodem titulo apud *Malabareos*, est planè diversa.

*Crotalaria* Unifolia minor Ind. Or. hirsutis foliis, floribus ad alas purpuro-ceruleis; An Katu-Vistna-clandi, *H. Malab. part. 9. tab. 61.* absq; fructu depicta.

*Crotalaria* myosotis *Floridana*, flore luteo minore. Hujus folia haud parùm similia sunt iis, quæ habentur in *Phytographia* nostra, *tab. 205. fig. 7.* sub titulo Myosotis, foliis subrotundis, *Herbæ Ind. Orient. in Almagest. fol. 258.*

*Crotalaria* *Maderaspatana*, folio obtuso cordiformi, subtùs incano. Votta-Clegepa *Malabarorum*.

*Crotalaria* minor, argenteis Chamæcisti foliis *Maderaspatana*.

*Crotalaria* *Cheusanensis*, spicæ foliis argenteis, filiquis pro-pendentibus glabris, calycibus villis ferrugineis obductis, in totum ferè immerfis.



Cruciata *Lusitanica*, latifolia glabra, flore albo. *Turnes. Inst.* 115. Cruciata minor glabra, flore Molluginis albo, *Barrelier Icon.*

**C**ucumis *Indorum*, s. Momordica, prælongis hastatis foliis. Neer-covy *Malabarorum*.

Cucumis parvus, foliis eleganter auriculatis, & crenatis. Collar-Moosh-moshica *Malabarorum*. Et nonnunquam Cherragoon butty eorundem.

Cucurbitifera Malabathri foliis scandens, Catalongay *Philippinis Orientalibus* dicta, *Mantiss.* 60. An Camolonga *Ludovic. Roman. lib. 5. Navigat. cap. 15. Clus. in Garc. fol. 236.* quæ inter Citrulos habetur, *Jo. Bauhino. tom. 2. lib. 16. 237.* sub hoc titulo, Citrulo vel Meloni Indico accedens Camolonga. Et memoratur à *Josepho Scaligero Exerc. 81. part. 15.* Camolangæ nomine. *Historia Lugdunens. fol. 1837.* vocat Camolangam. *Munster. Cosmograph. lib. 5.* Camolangam provenientem in *Calecut*, &c.

Cucurbitifera Arbor *Guadelupensis*, fructu Melonis magnitudine, & formâ, cortice crasso, & lignoso, ex sericeo viridiq; lanugine obducto, intus feminibus reniformibus, spadicei coloris, cum filamentis crocæis in latere sparsis, pulpâ candidissimâ gratæ acciditatis, & (quando ficcata) valdè friabili, obvolutis. Abavo *Belli Epist. ad Clus. Baobab. s. Abavi Clus. lib. 2. cap. 1.* Baobabifera arbor *Prosp. Alpini de Plant. Ægypt.*

Guanabanus

Guanabanus fortè Scaliger. libr. de Subtilitat. advers. Cardan. Exercit. 281. part. 6. Fructus Æthiopicus Melonis magnitudine, brevi lanugine obsitus. C. B. P. 434. An porro affinis non tantum, sed ipsissimum Idem, fructui, ejus Arboris, cujus Thevetus, cap. 10. libr. Singularium Americæ meminit his verbis. Tres sunt Insulæ ad Æthiopum Promontorium (Caput viride vulgo appellant,) in quarum unâ, Arbor invenitur, folio nostratis Fici, (an rectè observavit folii formam, nescio inquit Clusius) fructu Cypriis cucurbitis hæud ab simili, duorum ferè pedum longitudine, & crasso: Non nulli eo fructu Vescunter, ut nos Melonibus, continet vero semina fabæ magnitudine, leporinis renibus similia. His quidam Simias alunt, alii monilia ex iis collo aptanda, conficiunt. Siccata enim & benè matura, aspectu pulcherrima sunt. Visendum nobis primò obtulit, amicus noster, Dominus Jacobus Ayre.

Cupi Malabaricæ accedens, Arbor Maderaspatana, subrotundis foliis transversim eleganter venosis.

Cupressus Cheusanensis, Juniperinis arcuatis foliis, clavis galbulorum eleganter cristatis.

Cuscuta aurea Maderaspatana, Sherry-pasha Malabarorum.

Cyanus major Alpinus, foliis incisissimis Triumphetti, de Ortu & Vegetat. Plantar. cum Icone.

T

Cynoglossum



**C**ynoglossum purpureum, Buglossi foliis perfoliatum,  
ex Provincia Floridanâ.

Cynoglossum asperi-folium, Myosotidis facie pusillum,  
florè cæruleo parvo. Hort. Uvedalens. An Cynoglossum  
pumilum s. Austriacum alterum Clus. Hist. 2. 163. Cy-  
noglossa minor montana serotina altera Plinii Fab. Co-  
lumn. Ecphras. part. 1. pag. 180. A Lappulâ rusticorum,  
Hist. Lugd. maximè diversum; Utut à Cl. Casp. Baubino  
in Pinace, 257. confunduntur.

Cynoglossi ferè foliis subtùs cœsiis, ex Insulâ Cheusân.

**C**yperigenus Indianum, paniculâ speciosâ, Pering-cory-  
pillee Malabarorum.

**C**ytisus folio argenteo, Montis Olympi. D. Wheeler. in  
Horto Badmingtonio nuperrimè succrevit.

**Cytisus Tituanensis**, subrotundo folio glabro, siliquis biunci-  
alibus, latis & compressis.

**Cytisus an Genista, Floridana, Ebeni-Cretica** foliis longio-  
ribus, & tenuioribus, trifoliata.

**Cytisi facie, lato, subrotundo glabro, & punctato folio,**  
*Prom. Bon. Spei.*

Dens

D

**D** Ens Leonis *Floridanus*, Cornu cervini amplioribus foliis, radice bulbosâ.

**D** igitalis procerior *Floridanus*, Jaceæ nigrae dissectis foliis, floribus albis amplioribus.

*Digitalis Verbesinae* foliis è regione binis, spicâ florum compactiore. *Almag, Bot. Mantiss. 64. pl. 4.* Hujus Icon exhiberi videtur, apud *Rariora Nov' Angliæ à Joan. Jossellino edit. pag. 78.*

**D** oronicum integro, & crasso folio, *Bot. Monsp. An Doronicum Helveticum humile, crassis foliis. C. B. Prodr. in Hort. D. Uvedale inveni.*

**D** oronicum Tuffilaginis folio ex *Insula Cheusan, flore magno singulari.*

**D** oronicum Plantaginis folio, *Floridanum, floribus ut plurimum ad summum caulem quaternis.*

**Echium**



## E

**E** Chium *Africanum*, frutescens, foliis pilosis, *Hort. Amst. part. alt. 107.*

**E** Latines fœminæ folio subrotundo, folliculis hirsutis turgidis, è *Maderaspatan.* Ciceris vesicariæ, hujus fructus inflatus, perquam similis est.

**E** lichrysum *Lithospermi* foliis, *Insulæ Crocodilorum.*  
**E** lichrysum *Africanum*, Abrotani folio molli, & incano, ingrati odoris.

**E** lichrysum *Gnapholoides aromaticum*, *Indiæ Orientalis.*

**E** lichrysum frutescens, lanceatis foliis lanatis, comis albicantibus *Africanum.* An *Gnaphalium Africanum*, floribus minimis albicantibus inodorum. *Volkamer. Flor. Noriberg. 194.*

**E** lichrysum angusti-folium *Sinicum*, incanis foliis, floribus parvis sulphureis in capitulum congestis.

**E** lichrysum *Æthiopicum* frutescens, Coridis foliis incanis, capitulis parvis glomeratis, inter ramulos dispersis. An *Elichrysum Africanum* frutescens, Coridis folio *Oldenlandii.* *Turnef. Inst. 453.*

Elichry-

Elichryson *Æthiopicum* frutescens, *Ericæ* foliolis parvis, capitulis singularibus, sparsim per ramulos, absq; pediculis natis. Huc fortè spectat frutex *Africanus* aromaticus, flore spicato exiguo, *H. Amst. part. alt. fig. 59. fol. 117.*

**E** Phemeron Phalangoides *Floridanum* erectum, *Lilii* *Convallii* foliis lævibus, ad vaginas caulium, molli hirsutie imbutis.

Ephemeron Phalangoides, longioribus angustis foliis, floribus ex inflatis, & pubescentibus foliorum vaginulis, veluti ex utriculis pronascentibus; Mella-caula *Malabarorum*. Nir-pullu (fortè) *H. Malab. part. 10. tab. 13.*

Ephemeron Phalangoides tripetalon, gramineis foliis, *Maderaspatanum*. An Tali-pullu, *H. Malab. part. 9. tab. 63.*

Ephemeron Phalangoides aphyllon, cauliculis convolvulaceis, ex *Ind. Or. Nelipú* (fortè) *H. Malab. part. 9. tab. 70.* Planta aquatica aphyllus, repens, flore cæruleo difformi; *Comelin. Not. in loc.*

**E** Pidendron *Maderaspatanum*, foliis latioribus, oblongis, crassis, Schetti *Malabaricæ* floribus longis, coccineis; fructu parvo oblongo, ex alis foliorum racemosis. Cherry-mel-chedde *Malabarorum*. Quod pro omni ferè parasiticarum Plantarum genere, apud *Malabareos*, est commune Appellativum.



**E**quisetum nudum non ramosum, asperum, fimbriis ciliaribus ad genicula cayaneis; ex Insula *Crocodilorum*.

*Equisetum montanum Créticum, Prosp. Alpini; de Plant. exort. 140.*

*Equisetum frutescens aphyllon, Wheeleri In Horto D. D. Uvedal. apud Enfeldiam cultum invenimus.*

**E**rica *Tituanica* foliis longioribus, densius stipatis, floribus purpureis, parvis numerosis.

*Erica Tingitana, Coridis folio incana, flosculis stamineis, ad summum caulem pronascentibus.*

*Erica Cantabrica, flore maximo, foliis Myrti, subtus incanis, Turnef. Inst. 651. Fulhamiæ.*

*Eriocarpos Malabarica, Epidendri. species hexapetalos, gladioli foliis, caule arundinaceo, capsulâ lanâ candidissimâ intus refertâ. An Katou-Kaïda Maravara, H. Malab. part. 12. tab. 26.*

*Eriocarpos Malabarica, capsulâ seminali cum seminibus, gossipio candicante infarctâ. Hujus fructus Anantaly Maravaræ fructui in H. Malab. part. 12. tab. 7. depictæ, perquàm similis est.*

*Eriophoros Æthiopica, folio Coridis craffiori, globulis lanosis, inter ramulos sparsim nascentibus. Idem fortè cum*

cum Elichryso *Æthiopico* frutescente, Coridis foliis; in præcedentibus. Huic nostræ Tamariscus *Æthiopicus*, Coridis folio incano, Jaceæ capitulis parvis, tomentosis, ad ramulos dispersis, *Mantiss. fol.* 178. planè convenit.

**E** Ruca *Floridana*, Resedæ foliò trifoliata.

Eruca pumila *Indiæ Orientalis*, Nelle-pondœ; *Malabarorum*.

**E** Ryngii species *Sinica*, folio ferè plano, trilobato, & crenato, *Sinice* Sha-fin dicta (*i.e.*) in arenis nascens. Ex Insula *Tau-whey-San*.

**E** Uonymo nostrati similis, sed multò latioribus foliis ex Insulâ *Pu-tô*. in ditione *Sinarum*. Arbor fragilis, foliis subrotundis acuminatis, & ferratis, Euonymo similis, flore tetrapetalo, ex albo virscente, staminibus quatuor brevissimis, totidem apicibus purpureis donatis, calyce quadrifido, è quo surgit pistillum, quod deindè abit in fructum quadrangularem membranaceum, in quatuor loculamenta divisum, singula continentia duo grana rubentia, sibi invicem appressa, foliis ex adverso binis, latioribus, ferratis, in mucronem desinentibus. Fructu maturo, capsula purpurascit, *Octobri*, perficitur, Mense *Novembri* ex insulâ *Pu-tô* florentem detulit, Anno 1702. Incomparabilis *Botanicus* & Amicus noster, D. *Cunninghamus*.

Euonymus *Fessanus*, Cupressi compressiusculis foliis, fructu quadrangulâri majori, granis lucidè cæruleis; ex Montibus *Forjoon*.

Euonymo



Euonymo adfinis *Cheusanensis*, Frutex Laureolæ foliis solioribus, tricapsularis, & quadricapsularis.

Euonymo adfinis *Sinenfium*; tricapsularis, foliis subrotundis, Lauri, ex Insulâ *Crocodilorum*.

Euonymo adfinis *Sinarum*, quadricapsularis, subrotundis, rigidis, foliis dentatis; foliis & ramulis ex uno puncto quaternis.

Euonymo adfinis *Cheusanensis*, Arbuscula, Staphylodendri nostratis folio, fructu gemello, bicapsulari.

Euonymo adfinis *Sinarum*, Populi nigræ folio, tricapsularis, granis nigris candidissima substantia obductis, Sebifera. Arbor *Sinenfis*; pinguedinem sebi instar ferens; *Martini Atl. Sinic.* 119. *Johnstoni Dendrolog.* 42. & 477. de quâ *vid le Compté*.

Euonymo adfinis, *Pyracanthæ* foliis, ex Insula *Cheusan*, apud *Sinas*.

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylum spinosissimum*, Fraxini angustiore folio punctatum; ex Insulâ *Cheusan*.

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylum Floridanum*, Fraxini foliis, minus spinosum. In *Horto Industrii Hortulani D. Darby*, apud *Hoxtoniam*, vicum *Londini* nostri suburbanam, ex seminibus natum conspeximus. *Pindaiba Pisonis* 44. Huic nostræ propius accedere videtur. Hujus fructus (forsan) sunt *Fagaræ* majores *Clusii*.

Euonymo

*Euonymo adfinis aromatica, s. Zanthoxylum angustioribus foliis, binatim positis, spinâ longiore gracili.*

Frutex aromaticus, spinosus, spinis & foliis longioribus, angustioribus, & acuminatis, costæ alatæ per conjugationes distantiores innascentibus, impari claudente, cum spinis ex foliorum nervis mediis utrinque excreſcentibus: Fructum fert unicapſularem, rotundum, rubentem, scabrum, seu verrucosum, acerrimum Camphoræ gustum sapientem; (interior capsulæ membrana alba, lævis, & insipida) qui bifariam in apice dehiscens, semen ostendit unicum nigrum, splens, hilo cauo & albente (ubi latet filum quo semen capsulæ adnectitur) notatum; nullius ferè gustus nisi oleosi, &c.

*Euonymo adfinis aromatica, s. Zanthoxylum latiore Fraxini folio conjugato, minus spinosum; ex Insulâ Cheusân.*

Frutex aromaticus arboreſcens (cujus truncus & rami, spinis brevibus & tuberosis horrent) foliis Fraxini alatis, leviter ferratis, perforatis, minime spinosis; Fructum fert in racemis unicapſularem, lævem, vireſcentem, & punctatum, seu perforatum, accerrimum Camphoræ gustum sapientem, (interior capsulæ membrana alba, & insipida) qui bifariam dehiscens, in apice semen ostendit unicum, nigrum, splens, hilo angusto, & obscuro notatum; Rami sunt medullosi, & caui, instar Sambuci: Natali solo, Octobri fructum perficit. Idem forte cum *Herculis* arbore ex *Florida*,  
X nobis



nobis allata ; aut ei quam proximè cognata. Idem  
& Mouli-Ila, *H. Malab. part. 5. tab. 34.* fortè etiam  
Piperifera arbor *Sinenfis*, *Ludovic. le Compte, pag. 100.*

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylum Fraxini* latiore folio, sinuoso, medio nervo utrinque spinoso, ex una de *Insulis Crocodilorum* apud *Sinas*.

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylon spinosum*, *Fraxinellæ foliis Cheusanicum.*

Frutex est aromaticus, spinosus, spinis brevioribus, foliis lævibus, perforatis, brevibus, in acumen desinentibus, costæ per conjugationes innascentibus, impari claudente : Fructum fert unicapfularem, rotundum, scabrum, s. verrucosum, acerrimum *Camphoræ* gustum sapientem, (interior capsulæ membrana alba, lævis & insipida) qui bifariam dehiscens, semen ostendit unicum, nigrum, splendens, hilo cauo, & albente (ubi latet filum quo semen capsulæ adnectitur) notatum, nullis fere gustûs, nisi oleosi ; Fructus in racemis *Octobri* maturescunt, *Sinice* *Hóa-tcháw* nominantur, & vice *Piperis* utuntur.

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylum Sinicum* spinosum, *Cynorrhodi foliis & facie.*

Frutex est aromaticus, spinosus, spinis brevibus, foliis minùs perforatis (sed spinulis quam plurimis supernè notatis) brevioribus, in acumen desinentibus, costæ per conjugationes innascentibus, impari claudente ; Prioris est species, sed fructum nondum vidi, *D. Cunningham.*

Euonymo

Euonymo adfinis aromatica, s. *Zanthoxylum Cheusanense*, spinosum minus, Rosæ Pimpinellæ foliorum æmula; Cujus fructus (forsan) sunt Fagaræ *Clusii* minores.

Frutex est aromaticus, spinosus, minor, foliis alatis non perforatis, levitè, serratis, costâ spinosâ; Fructum fert ad ramorum summitates in fasciculos congestum, unicapfularem, lævem, virescentem, & punctatum, seu perforatum, gustûs camphorati, (interior capfulæ membrana albens, & insipida) qui bifariam in apice dehiscens, semen ostendit unicum, nigrum, splendens, hilo angusto notatum, ubi latet filum, quo semen capfulæ adnectitur. Octobri fructus maturefeit: In quinque aut sex pedum altitudinè affurgit.

Euonymo adfinis *Malabariensis*, summis virgulis plumbeis. *Pua-Tsjetti*, Hort. Malab. part. 5. tab. 52.

Eonymo adfinis *Thea* dictæ similis, Frutex *Insulæ Cheusan*.

Euonymo adfinis nucifera, *Tsia Japonensibus* dicta, flore rubro rosaceo, vasculo seminali rotundo, plerumq; tricapsulari, *Swa-tea Sinenfibus* dicta. Nos qui omnium ferè Gentium mores in cibis, & potu, recepimus, ab Oriente Sole usum liquoris dicti *Thea*, vel *Tzie* accercivimus: Nascitur enim in *China*, & *Japonâ* frutex hic, aut Arbuscula, è cujus foliis vere collectis, & ad ignem, aut Sole ficcatis, & in aquam calidam immisfis, conficitur iste potus, Incolis istarum regionum quam maximè familiaris: Et forsàn non alius erat liquor dictus *Cuia*, (*Chaa*) quam *Paulus Venetus*



*Venetus* scripsit à *Tartaris* ita fuisset præparatum, ut vinum album videretur. *Seres Tartari Orientales*, qui nostrâ ætate *Sinarum* regnum subjugârunt, in lacte cum Sale folia *Theæ* infundunt, & potionem ita paratam maxime probant *Legatio Belgic. ad Sinenſium Regem.*

**E**upatoria *Floridana*, Urticæ ampliffimis foliis, ternis circa caulem ambientibus.

*Eupatoria Floridana*, latiori folio triphylla, flore pallidiore.

*Eupatoria Conyzoides*, *Blattariæ* tenerioribus foliis, floribus pallescentibus, parvis, è *Maderaspatan.* Cheva-rutte *Malabarorum.*

*Eupatoria Conyzoides Maderaspatana*, *Hormini* folio, molli & incano, margine profundius secto, floribus pallentibus parvis. *Calla-mundoe Malabarorum.*

*Eupatorium Americanum*, *Hederæ* terreſtris folio, flore purpureſcente. *Turnefort. Inſtit. 456.*

*Eupatoria Conyzoides Sinica*, *Baccharidis* folio rarius crenato, ſummo caule ramoſo, floribus parvis coronato.

*Eupatoria Conyzoides Floridana*, *Stachydis* paluſtris folio, in ambitu ſpinulis aſperato, capitulis obſoletè luteis.

*Eupatoria Conyzoides Maderaspatana*, *Virgæ Aureæ* villoſis foliis, floſculis pallescentibus, Peatty *Malabarorum.*

Eupatoria

Eupatoria Conyzoides, integro Jacobææ folio, ad sedem ampliore sessili, comâ deauratâ. *Wastana-poo Malabarorum.*

Eupatorium aureum, Asteris folio, *Hort. Badmingtoniani.*

Eupatoria Conyzoides, Styrcis folio subtus niveo, capitulis speciosis. Cyanus arborescens altera, styrcis folio. *Prosp. Alpin. de Pl. exot. 32.* Hujus perelegantis Fruticis ramulum, cum floribus nitidè asservatum, inter collectaneas, D. D. *Sherard*, nos tantum conspeximus, non possidemus.

Eupatoria Conyzoides, Panacis Coloni folio *Floridana*; Huic Eupatoria Jaceoides ex *Terra Mariana*, *Mantiss. nostr. 72.* in totum magis convenit, at *Baccharis Americana*, quoad capitula, propius accedere videtur.

Eupatoria Conyzoides, Verbasculi folio *Malabarica*; *Cke-va-ruttee Malabarorum*; Eupatorium Rapistri arvensis folio, capitulis parvis *Cormandelianum*, *Mantiss. 72.* huic nostræ in plurimis convenit.

Eupatorium Cirsiî vulgaris folio, *Floridanum.*

Eupatorium *Capense*, folio longiori, rariùs & profundius dentato, floribus albis.

Eupatorium *Marianum*, *Salviæ* longissimis, acuminatis, angustioribus foliis non perfoliatum. A *Virginiano* perfoliato ejusdem tituli in *Phytographia. tab. 87.* plurimum diversa planta, Cujus Iconem videsis.



*Eupatorium Africanum*, Agerato affinis *Peruviana* foliis, alternatim positis, floribus glomeratis parvis.

*Eupatorium Sinicum*, Leonuri *Africani* foliis, flore ex albo cærulescente. *Eupatorium* foliis oblongis, ferratis, & acuminatis; D. *Cunningham*. Florem fert album, flosculosum, plurimis scilicet flosculis companiformibus quintifidis constantem, (ex quibus singulis, longum surgit capillamentum, album, bifidum, quibusdam brevibus capillamentis nigris circum datum, extra flosculum non prominentibus, undè Flos apparet, quasi ex albo cærulescens) embryoni insidentibus, & calyce longo, tereti, & squamoso, comprehensis; Embryo autem abit deindè in semen nigrescens, pappis instructum: *Septembri* floret. Alia est ejus species, foliis obtusioribus, & minus ferratis, D. *Cunningham*.

*Eupatorium Floridanum*, *Nepetæ* minoris folio angustiore.

*Eupatorium Conyzoides Sinicum*, *Tarraconis* folio, capitulis argenteis, Planta est flore radiato, cujus discus ex plurimis flosculis luteis, corona vero ex semiflosculis albis componitur, embryonibus insidentibus, & calyce squamoso comprehensis: Embryones autem deindè abeunt in semen pappis instructum; folia fert viridia longa & angusta; *Octobri* in Natali Solo floret; D. *Cunningham*.

*Eupatoria Conyzoides Cheusanica*, *Tarraconis* folio, comâ aureâ amplissimâ.

Eupa-



*Eupatoria Floridana*, strictissimis foliis, ad nodos caulium  
verticillatis

*Euphrasia magna Floridana*, folio molli, floribus purpureis,  
calyce magno striato ferè immerfis.

*Euphrasia Floridana*, *Lyfimachia* filiquosa glabræ foliis,  
quadrato caule ramosior.

*Euphrasia Maderaspatana*, *Salicaria* foliis, capsulis oblongis,  
ad foliorum ortus plurimis. Cullam-mully *Malabaro-*  
*rum*.

*Euphrasia* species, folio *Becabungæ Malabariensis*, floscu-  
lorum labiis amplioribus. Pee-tsjanga-puspam, *H. Ma-*  
*lab. part. 9. tab. 59.* quæ memoratur in *Mantissa nostra*  
*fol. 73.*

*Euphrasia* affinis, oblongis cuspidatis foliis, subtus villosis,  
promissis flosculorum labiis tridentatis; Pull-colli *H.*  
*Malab. part. 9. tab. 69.*

*Euphrasia* adfinis, *Maderaspatana*, *Virgæ aureæ* latiori fo-  
lio, floribus amplis purpureis.

*Euphrasia Sinica*, *Parietaria* foliis, *Rubia* modo spicata.

Planta est flore albente, monopetalo, personato, in duo  
labia distincto, quorum superius acuminatum, & bre-  
vius, inferius vero tripartitum & longius; Ex floris  
calyce profundè multifido, surgit pistillum, quod abit  
in



in fructum, seu testam oblongam, bifariam dehiscen-  
tem, in duo loculamenta divisum, & seminibus fæ-  
tam compressis : Flores in spicis nascuntur, & folio  
ex adverso bina, Teucree similia. D. *Cunningham*.

Euphrasie affinis *Sinica*, Chamædryos laciniatis foliis, Bo-  
tryos instar, floribus purpureis, spicatis, amplis, lon-  
go, & striato calycè exeuntibus.

Euphrasie affinis Majoranæ foliis, floribus galeatis, summo  
caule diffusis.

Euphrasia Chamædryos spuria foliis, ex *Insula Cheusan*.

Euphrasia *Indica*, Ladani Segetum folio, flore amplo pur-  
pureo. Coranny-pooe *Malabarorum*.

Euphrasia *Maderaspatana*, Alsines majoris folio, floribus  
longo tubulo donatis. Cautonar-mully *Malabarorum*.

Euphrasia *Maderaspatana*, Alsines majoris foliis ternis, lon-  
gis pediculis caulem ambientibus.

Euphrasia minor *Sinica*, Betonice Pauli foliis, capsula lon-  
ga filiquam æmulante. Planta est flore carneo, mono-  
petalo, tubulato, personato, labio superiori in acumen  
desinente, inferiori vero trifido ; Ex cujus calyce quin-  
tifido, surgit pistillum, quod abit in filiquam teretem,  
bicapsularem, seminibus minutissimis fætum : Folia bina  
opposita, subrotunda, mollia & leviter ferrata. Ad spi-  
thami longitudinem vix pervenit ; *Septembri* floret, D.  
*Cunningham*.

Euphrasi

Euphrasia *Ind. Or.* purpurea, Satureiæ folio scabro spicato, calycibus florum magnis striatis. Ab Euphrasiâ praten-  
si Satureiæ foliis scabris, è *Maderaspatân. Almag. Bot.*  
142. Cujus Icon habetur in *Phytograph. tab. 177. fig.*  
6. plurimum diversa; Huic autem Anthyllis altera *Ita-*  
*lorum*, quoad picturam apud *Gerard emac. 623.* multum  
convenire videtur.

Euphrasia *Maderaspatana*, Hyssopi folio, flore amplo pur-  
pureo, capsulis plurimis circa caulem ad nodos verticil-  
latim positis.

Euphrasia parva Thymifolio procumbens, s. Cratæogo-  
num minimum *Indorum Arrevenar-pundoe Sinarum.*

Euphrasiæ affinis *Indiana*, Melissæ *Turcicæ* foliis alternis,  
capsulis, pubescentibus trifariam junctis, singulis dupli-  
ci alveolo, duplicem seminum angulosorum seriem con-  
tinentibus, Viciæ Sesamaceæ *Apula* filiquarum æmulis,  
& earum instar plurimis in foliorum alis sessilibus. *Ar-*  
*rawan-mooca Malabarorum.* An hæc verò ad *Lyfima-*  
*chiæ* non papposæ genus potiori jure accenseri potest?  
Fortè *Onagra Americana*, folio *Betonicæ*, fructu hispido.  
*Turnefort. Inst. pag. 302. pl. 6.*

Euphrasiæ affinis pusilla planta, pericarpio lignoso oblongo,  
quadrato bivalvi, Hederæ terrestri minore folio glauco,  
è *Maderaspatân. Nella-mullee Malabarorum.* Idem est  
cum *Asarinæ* foliis, & flore, &c. in præcedentibus me-  
morata. Attamen Euphrasiæ affinem Echioidem *Alma-*  
*gest. 142.* sub eodem titulo Insignitam, aliquando inveni-  
mus. Vid. *Mantiss. fol. 73. ad imum.*

*Torenia  
indica.*



## F

**F** A B A Rotunda oblonga, s. Cylindracea minima, pluribus, quinis, senis, filiquis, uno pediculo exortis ; five *Hattoniana* Moris. *Hist. Oxon. part. 2. 86.*

**F** Agotriticum erectum *Sinarum*, *Perficariæ* folio, floribus in muscariis, calyce floris carneo.

*Perficaria* calyce floris carneo, semine triquetro acuminato, spicâ floris brevi, & multifidâ, foliis ex latiore basi in mucronem desinentibus, ad nodos alternatim positis, rarioribus ; *Septembri* & *Octobri* floret Natali Solo, Lá-leóu *Sinice* nuncupatur, D. *Cunningham.*

*Fagotriticum* rectum *Sinense*, *Convolvuli* minoris folio, ad caulium nodos, appendicibus pilosis auriculato.

*Perficaria* calyce floris albo, foliis lanceolatis, auritis, ex nodis alternatim nascentibus, nodum vero aliud plerumq; foliolum subrotundum, hirsutum, quasi amplectitur ; Flores in ramulorum summitatibus in muscariis disponuntur, quibus semina succedunt fusca, triquetra, & acuminata ; *Palustribus* gaudet, & *Octobri* floret *Sinice* Yá-tiên-tching nuncupatur. D. *Cunningham.*

*Fagotritico*

Fagotritico similis spinosa minor *Sinica*, cauliculis erectis.

Perficaria calyce floris rubente, foliis lanceolatis major, auritis, & angustioribus; caulibus & ramulis spinosis, femine nigro splendente, triquetro, & acuminato. In duorum aut trium pedum longitudinem excurrit, & in palustribus provenit. D. *Cunningham*.

Fagotritico similis spinosa scandens, Ari folio latiore *Floridana*.

Fagus *Americanus*, Ulmi amplissimis foliis, capsulis bigemellis ex *Provincia Mariana*.

**F**icus. *Malabariensis*, folio oblongo acuminato, fructu Vulgari æmulo. D. *Syen*.

Ficus arbor Nostrati similis, fructu nigricante ex *Insula Crocodilorum*.

Ficus *Ind. Or.* latiori folio *Maderaspatan*, fructu rotundo, calyculato, sessili. *Allamaram Malabarorum* Hæc autem re verâ Idem est cum *Peralu*, *H. Malab. part 1. fig. 28.* Et a Ficu *Americanâ*, latiori folio venoso, *Almag. Bot. 144.* admodum diversa.

Ficus *Ind. Or.* *Lapathi* foliis, fructu parvo orbiculari villoso, *Atteemaram Malabarorum.* *Atti-alu*, *H. Malab. part. 1. fig. 25.*



*Ficus Indica*, *Adrachines Theophrasti* foliis, fructu perexiguu. *Culla-Almaram Malabarorum*.

*Ficus* fructu oblongo dulci, foliis profunde laciniatis, *Volkamer Flor. Noriberg. 168. in Hort. Comptoniano* colitur.

*Ficus humilis*, *Nostrati* similis arcuata, s. ramulis incurvis & deorsum flectentibus *Americana*, in *Horto D. Darby* conspeximus.

**F**lcoides *Mesembrianthemum* majus erectum, folio tri- tro viridi versus apicem tuberculofum.

*Ficoides*, s. *Ficus humilis*, folio triangulari, lucido, obtufo, flore aureo magno. *Flor. Noriberg. 165.*

*Ficoides Mesembrianthemum* procumbens, folio triquet- tro viridi, & falcato, omnium maximo.

*Ficoides Africanum*, lato, subrotundo, brevi, serrato, & fal- cato folio, flore minore luteo; *Prom. Bon. Spei.*

*Idem* folio subrotundo, summa parte bifido, *Hort. du Boi- fian.*

*Ficoides Africanum*, foliis ad summitatem dentatis, quâ parte, bina foliola, ad denticulos arctè copulantur. In junioribus foliis, *Serræ* ita inter se mutuò aptantur, ut bina illorum folia, sibi invicem articulatione quâdam conjungi videntur.

*Ficoides*

Ficoides Mesembrianthemum procumbens luteum, folio triquetro, longiore, viridi, ad unicum angulum per longitudinem minutissimè denticulato. An Ficoides *Africanum*, folio longissimo, nonnunquam denticulato, flore luteo, *Cat. ad calcem Paradis. Bat.* Ficoides forte *Africanum* minus procumbens, folio triangulari, nonnihil denticulato, s. spinoso. *Volkamer Fl. Noriberg. 164.*

Ficoides Mesembrianthemum *African.* folio triangulato glauco brevi, ferris tuberculosis cum spinulis mitioribus ad angulos marginaliter asperato, flore phœniceo. An Ficoides *Africanum* folio triangulari brevi, crasso, glauco; *Cat. ad calcem Parad. Bat.*

Ficoides *Africanum* triacanthon, Lycii modo aculeis grandioribus donatum.

Ficoides Mesembrianthemum teretifolium viride, villis roridis splendens, summo vertice spinulis coronato, flore purpureo. An Ficoides *Africanum*, teretifolium spinosum; *Cat. ad Calcem Parad. Bat.* Ficoides *Africana*, erecta teretifolia, nonnihil glauca, summitatibus foliorum spinosis, spinulis in stellam dispositis. *Volkamer. Flor. Noriberg. 165.*

Idem foliis saturatè viridibus glabris, spinulis rarioribus coronatum, flore purpureo. *H. du Boisiani.*

Ficoides Mesembrianthemum, prælongo subtereti folio, micis roridis ornato, flore amplo, amœnissimo, aureo.



*Ficoides Africánum*, Sedi majoris folio, aliquantulum cavo, punctato, magis acuminato, floribus parvis candidissimis. *Hort. Uved.* An *Ficoides Africana* procumbens, latifolia, annua, floribus argenteis minoribus. *Volkam Fl. Norib.* 165.

*Ficoides Africanum*, Sedi majoris folio, flore ampliore candido, *ibid.*

*Ficoides Mesembrianthemum*, tenuissimis vermiculatis foliis *Africanum*, *Hort. Compton.*

*Ficoides Africanum* procumbens, triangulari, lucido longiori ac angustiori folio; *Volkámer Fl. Norib.* in *Horto du Boisiano* cultum conspeximus.

*Ficoides Africanum* erectum folio triangulari, brevi, fimbriato, glauco, *Fl. Noriberg.* 165.

*Ficoides peregrina* procumbens, maxima, foliis latissimis unà cum caulibus chrySTALLINÁ aspergine ornatis. *Fl. Noriberg. ibid.* An vero nostra caulescit, nondum nobis innotuit.

*Ficoides Mesembrianthemum* procumbens maximum, foliis crassis, Lobi alicujus grandioris effigie. *Prom. Bon. Spei.*

*Ficoides Mesembrianthemum Africanum* procumbens, dense fruticosum, folio subtereti, brevi, viridi, flore albo.

Ficoides

Ficoides Mesembrianthemum procumbens, Fritillariæ crassæ fermè foliis, ex *Prom. Bon. Spei.*

**F**ilix mas pinnulis angustioribus, non crenatis, punctis ferrugineis duplici serie juxta nervum dispositis. *Angliæ nostræ alumna est.*

Filix non ramosa nostras, pinnulis brevibus, acutioribus, integris nonnihil falcatis, punctis ferrugineis ad oras pulverulentis; Hæc nō fallor illa species est, cujus meminit D. Doody inter Additiones suas apud *Rai. Synops. Stirp. Britan. app. 341.*

Filix elegans Adianto nigro accedens, segmentis rotundioribus *Raii Synops.*

Filix Adianto nigro *Officinar* similis pediculo viridi, pinnulis magis elegantèr incisis; ex Insula *Cheusan.*

Filix pumila petræa nostras, Adianti nigri foliorum æmula, saxorum interveniis prorumpens.

Filix crispa *Mauritanica*, s. Adiantum album floridum, ramosissimum. Adiantum album *Canariense* ramosius, *Almag. 11.* Item Filix ramosa *Canariens.* Rutæ murariæ pinnulis angustis, altiùs incisis, mediæ costæ alternatim alligatis. *Phytogr. tab. 291. fig. 2.* quod est unum & idem; Huic nostræ ut plurimùm accedit. Cui tamen *Osmundæ* more, duo sunt foliorum genera.

Filix florida, s. *Osmunda* Nostrati similis, ex Insula *Cheusan.*

Filix



Filix *Indica* non ramosa, pinnulis subrotundis, costæ adnatis, in averſa parte duplici serie punctorum insignitis, fummis alis mucronatis. Kari-welli-panna Maravara, *H. Malab. part. 12. tab. 17.*

Filix mas Vulgari similis, ex Insula *Cheusan*, angustioribus alis, ad nervos pinnularum binis lineolis ferrugineis pulverulenta. Huic proxime accedit. Filix mas Vulgari similis *Virginiana*. *Phytog. Tab. 179. fig. 2.*

Filix non ramosa fæminæ pinnulis, medio nervo pulverulentis. *Prom. Bon. Spei.*

Filix non ramosa dentata in orbem nidum avis exprimentem, excrescens. *H. L. Bat.*

Filix ramosa *Ind. Or.* pinnulis subrotundis, costæ nascentibus, ad nervos averſa parte areolis, pulverulenta; fummis alis mucronatis. Para-panna Maravara, *H. Malab. part. 12. tab. 15.*

Filix *Sinenſis* ramosa elegans, rarioribus pinnis, spinulis armata.

Filix mas ramosa, pinnulis non dentatis, ex Insula *Cheusan*.

Filicis non ramosæ genus, pinnulis latius dentatis, ex *Maris Sinarum* Insula *Crocodilorum* dicta.

Filix

Filix non ramosa major, pinnulis longis, angustis, profundè dentatis, supremâ pinnâ longius mucronatâ, è *Maderaspatan*.

Filix non ramosa *Cheusanensis*, pinnulis longioribus, ferratis, auriculatis, & falcatis, punctis ferrugineis binis ordinibus averfâ parte adnexis.

Filicifolia *Lonchitidis* facie *Sinensis*, ad pinnularum nervos, lincolarum ferruginearum duplicem ordinem dorfigerens.

Filix *Cheusanica*, latiori *Lonchitidis* serrato folio, averfâ parte ferrugineis punctulis refertissimo.

Filix *Floridana*, *Thalictri Monspeliensium* foliis rugosis, pediculo nigro, limbo pinnularum pulverulento.

Filicula s. *Bryopteris* repens *Sinarum*, inter Filicem & *Lycopodium* compos, pinnulis averfâ parte, micis argenteis onatis.

Filicula *Sinensis*, elegantissimè plumosa, pediculis permittis foliolis densè stipatis. Ex *Hollandia Novâ*.

Filix *Phyllitis* dicta minima *Cheusanensis*, averfa parte, globulis binis ordinibus per longitudinem foliorum instructa.

Filix minor *Sinica*, foliis integris & trifidis, averfâ parte, punctis ferrugineis rariùs interspersa.



Filicifolia Phyllitis caulifera, similis, trifoliata, ex *Insula Johanna*, *Mantiss.* 81. pl. 6. Hujus folia lato virore superne splendent, inferne vero obliquis pulverulentis areolis, ceu lumbricis ferrugineis virgata sunt. Nella-panna-Maravara, *Hort. Malab. part.* 12. *tab.* 18. proxime precedenti in *Mantissia*; valde assimilatur, & forte idem est.

Filix Hemionitis Phymatodes, (i.e.) cum exanthematis pulverulenta, foliis trifidis, & quinquifidis, segmentis angustioribus, in acutissimum & valde prolixum mucronem abeuntibus, ex *Insula Joanna*: **The Brastle-Moon Fern.** Ab Hemionitide maximâ quinquefolia, *Plumeri. Tab.* 31. ut & Hemionitide maximâ trifoliâ, *Ejusd. Tab.* 32. in *Almagesto* nostro, 155. recensita, plurimum diversa. Idem est cum Hemionitide *Mantiss.* 82. pl. 1.

Filix Hemionitis dicta, pediculis splendentibus nigris, foliis Asari rotundioribus. *Almag. Bot.* 155. pl. 9. Hujus descriptio unâ cum *Icone* satis infelicitè depictâ, habetur apud *Jo. Josselin.* in *Rariorib. Nov' angl.* pag. 65. Multo accuratior *Icon* exhibetur in *Phytograph. nostrâ. Tab.* 287. *fig.* 5.

Filicula *Cheusanica*, s. Hemionitis multifido folio tenuissimè serrato, ad margines seminifera.

Filicula *Africana*, Geranii Robertiani folio magis anguloso. Sub nomine Geranii Robertiani quodammodo similis, folio magis anguloso, Plantæ *Æthiopæ*, recensetur

tur in *Mantissa* nostra, fol. 89. pl. 8. Hæc autem procul omni dubio de Filicularum censu estimanda est, plantula peregrinæ elegantia, in quo judicio tantò securiùs acquiesco, quò certior sum spectatissimum virum, & amicum meum plurimis nominibus honorandum D. *Carolus du Boisium* in cætera ingenii magnitudine illustrem Botanicum, ejusdem mecum esse sententiæ.

Filicula repens Quadrifolii phæi facie, oris spermaphoros, ex *India Orientali*. Ary-Elle *Malabarorum*.

Filicula juncoides pyxidata, ovatis pyxidibus, summo pediculo horizontaliter pectinatis, *Prom. Bon. Spei*. Sub Junci elegantissimi capitulis pectinatis titulo, depictam invenies in *Phytogr. nostrâ tab. 95. fig. 7.* & pro Juncu *Capensi* communicavit nobis ipse *Sherardus*.

Filix clematitis *Maderaspatana*, pinnulis *Pistolochiæ Virginianæ* foliorum æmulis, rachi medio huc & illuc undulatum intorto; Hujus pinnulæ aliquando sed rariùs bisectæ inveniuntur. An *Tsjeria Valli-panna Hort. Malab. part. 13. tab. 44.*

Filix Clematitis *Malabariensis*, majoribus pinnis auriculatis, per ambitum laciniarum adinstar profundè dentatis; *Tsjeru-valli-panna-Warapolii, H. Malab. part. 12. tab. 33.*

Filix scandens *Phaseolôdes triphyllos*, lobis *Sisari* foliorum æmulis, ut plurimum bisectis è *Maderaspatân. Valli-panna H. Malab. part. 12. tab. 32.*



Filicula Clematidis *Sinárum*, Scandicis foliorum æmula.

**F**œnum græcum sylvestre primum *Dodonæi*, *Pemptad.*  
547. *Edit. latin.*

**F**Rutex *Cheusanicus* Bardanæ majoris folio minore, Sambucum olens, floribus Jasmini odoris, summo caule in umbellam feré dispositis. Ab eodem sæpius laudato viro, D. *Cunningham* in hunc modum describitur. Frutex est flore albo, monopetalo, infundibuliformi; (tubo longiore) quintifido, stylo staminibus productioribus stipato, abeunte in fructum mollem, seu baccam rotundam cæruleam, plerumq; dipyrenam calyci infidentem quintifido, ex viridi purpurascente; folia fert bina, lata, in acumen definentia & pediculis longis insistentia, Sambucum vel Scrophulariam olentia; flores vero Jasmini odorem Spirantes. *Septembri & Octobri* floret.

Frutex *Sinensis*, Prunifolius, denticulis ad marginem spinosis, averſa parte parum villosis,

Frutex *Cheusanensis* Prunifolio, ad marginem spinulis rarius ferrato, Aurantiæ flore hexapetalo, fructu baccam æmulante.

Frutex *Cheusanensis* Myrtifolius, flore albo hexapetalo, Jasmini odore fragrantissimo.

Frutex *Sinensis*, Myrtinis foliis pallentibus, alterno ordine dispositis.

Frutex

Frutex *Sinenfis* baccifer, Ligustri foliis, fructu parvo, rotundo; nigro, monoppyreno, calyce donato.

Frutex *Malabaricus*, folio auriculis prælongis donato, fructu parvo tuberculoso. An fortè sit de censu Arundineo. An Ana parna *H. Malab. part. 7. tab. 40.* Licet enim semina piscium includi dicitur, in hujus descriptione, in picturâ tamen nucleum integrum, intra pericarpium corticale contineri, & instar aliarum hujus fortis, Nuciferum esse videtur.

Frutex *Cheusanicus*, *Pyracanthæ æmulus*, non aculeatus, fructu monoppyreno nigro.

Frutex *Sinicus* non spinosus baccifer, *Pyracanthæ* foliis majoribus, fructu parvo, rotundo polypyreno.

Frutex *Marocanus*, subrotundis, solidioribus foliis brevibus, limbis venustè purpureis.

Frutex *Maderaspatanus*, *Berberidis* folio solidiore, margine lævi, fructu verrucario crinito, plurimis ad foliorum ortus confertim nascentib. *Neen-neringy Malabarorum.*

Frutex *Ind. Or. cordatis Buxi* foliis fructu parvo, calyculato, bacci-capsulari. *Conne-maram Malabarorum.*

Frutex *Cheusanensis* baccifer, *Theæ* foliis lætè virentibus, flosculis parvis virescentibus, plurimis simul ad foliorum ortus, ex calyce squammoso prodeuntibus.



Frutex est flore minore, pentapetaloide, ex viridi albente, petalis reflexis squammatim nascentibus; ex calyce squammoso prodit pistillum quadrifidum, quod deinde abit in baccam purpurascentem. *Novembri* floret. *D. Cunningham.*

Frutex *Cheusanicus*, floribus Theæ ex albo carneis, fructu unicapsulari, capsula trifida. Foliis Theæ sed lævioribus, & magis viridibus, nec in usum adhibendis, *D. Cunningham.* Insulæ *Cheusan* Indigena est.

Frutex *Sinensis*, Alaterni longioribus foliis dilute viridibus, flosculis plurimis, squammosis, ad ortum foliorum cauli appressis.

Frutex *Cheusanensis* baccifer, Celastris foliis rarius dentatis, flosculis parvis, virescentibus, plurimis simul ad foliorum ortus, ex calyce squammoso racematim enascentibus.

Frutex est flore pentapetaloide, petalis ex luteo virescentibus, fundo purpureo; ad divisuras petalorum prodeunt stamina brevia, ex luteo virescentia apicibus rotundis donata, pistillum virescens abit in baccam calyci hexaphyllo insidentem: Flores foliorum alis racematim apprimuntur; Folia fert pallide viridia, crassa lævia, subrotunda & acuminata, crenis raris leviter incisa; Gustus astringentis, parum salis & amari. *Novembri* floret; *D. Cunningham.* Proximè præcedentis fortè species est.

Frutex

Frutex *Javanensis*, *Pyracanthæ* foliis longioribus, & mucronatis, flosculis ex alis foliorum in spicam laxiorem pronascentibus; ex *Insula Combuys Javæ* adjacente.

Frutex anonymus quintus *Marcgr. lib. 2. cap 15.* *Mespilus* (fortè) *Floridana*, spinis vidua, *Pruni* longioribus foliis, flosculis parvis luteolis ad stipitem sessili modo confertis.

Frutex aromaticus Orientalis, *Visci* foliis, floribus Juliformibus, quæ odoris gratiâ in *Hortis Javanorum* excolitur. Idem est cum *Dammarâ* longiori folio *Amboinensi*. D. *Rumphii* in *Navigat. Dampier* recensitâ pag. 158.

Frutex *Saligneis* foliis, caule purpureo, capsularis; ex *Floridâ*. Aut melius Frutex *Floridanus*, *Chamænerii* foliis, capsula subrotundâ, brevi, pentagona, ad angulos valdè obtusos fimbriatâ; & quinque petalis amœnè purpureis, eleganter coronatâ. An fortè *Cistoides* quoddam singulare, summis ramulis florigerum; sive *Planta* ad *Cistos* accedens.

Idem ad sedem foliorum, secundum caulem floridum.

Frutex *Maderaspatanus*, *Mazerei Arabum* foliis minutissimis crenis asperatis, *Roodera-Corumbou Malabarorum*.

Frutex *Sinensis* *Uvæ ursi* longioribus foliis, leviter crenatis ex *Ins. Crocodilorum*.

Frutex



Frutex *Indianus*, Senæ *Florentinæ* foliis, subtus candicantibus, vasculis oblongis lignosis, in ternas se partes aperientibus, quarum singulæ in binas cellulas divisæ, bina semina membranaceis appendicibus Pinorum instar alata, includunt. Cedrus *Barbadensis*, alatis Fraxini foliis, huic quodammodo convenit; Et Utraque brevitatis gratiâ, Cedreleta nominari possit, viz. Cedreleta *Barbadensium*, alatis Fraxini foliis; Et Cedreleta Senæ foliis subtus candicantibus, *Maderaspatana*. Purrasum-maram *Malabarorum*.

Fruticulus capsularis, majoribus Senæ foliis subtus cœsis- Pelandy-cheddy *Malabarorum* & interdum Nechetty inscriptione, è *Maderaspatan*, transmissum habuimus.

Frutex *Sinensis*, Majoranæ minoribus foliis, pronâ parte candicantibus, venis pullis è directo, & lineolis transcurrentibus elegantissimè delineatis, Insulæ *Crocodilorum*. Hunc pervenustum Fruticem cum plurimis aliis raris & exoticis, ex Insula *Cheusan* acceptum habuimus, ab optimo viro D. *Jacobo Cunninghamo*; Qui apud *Insulanos* cum laude, & successu fælici, Medicinam exercet, cujusq; studio indefesso, in re *Botanicâ*, multum debetur.

Fruticulus *Africanus*, Myrti *Tarentini* foliis sericeis, cauli appressis apicibus; tantum recurvis, squammoso capitulo molli.

Fruticulus *Capensis*, Salicis pumilæ angustioribus foliis, oris & apicibus foliorum spinosis.

Frutex

Frutex *Africanus*, Genistæ aculeatæ foliis recurvis, summo capite cæsarie villoso. An Thymelææ capitatæ genus *Africanum*?

Frutex *Africanus*, foliis parvis Eryngii modo spinosis, ex Horto Comptoniano.

Fruticis ambram spirantis altera species; ex *Prom. Bon. Spei.*

Frutex *Sinensis* monococcus, Rubi foliis parvis, viticulis spinulis asperatis. An Rubus monococcus saxatilis alpinus, ex Insula *Cheusan.*

Frutex spinosus baccifer *Sinarum*, foliis Pentaphylli quinquifidis.

Frutex *Sinensis* baccifer Convolvulaceus, Cisti foliis pubescentibus, ad ramulorum nodos confertis: *Mareta Inalli*, *H. Malab. part. 11. tab. 63.* ubi pictura exhibetur fructu destituta.

Frutex Convolvulaceus spinosus *Sinicus* rotundiorè nervoso folio, floribus parvis umbellatis, claviculis ligneis binatim donatus.

Frutex *Indicus* scandens, folio Mendoni instar in capream desinente, fructu parvo coronato. An fortè species Rotang, & pro genere Arundinis *Indicæ* volubilis *C.B.P.* haberi potest. An Panambœ & Panambu-Valli *H. Malab. part. 7. tab. 53.* sub Shevenar *Malabarorum* nobis aliquando transmissa est.



Fruticulus *Orientalis* hexapetalos, Lentisci foliis baccicap-  
sularis, caule alato ; Erra-Achuncheddy *Malabarorum*.

Frutex *Cheusanensis* Conifer, foliis Juniperi planis, & tere-  
tibus Cupressi, D. *Cunningham*.

**F**ucus niger longissimus, Setam equinam referens ca-  
naliculatus, una parte concava, altera convexa, ex  
Oris *Mauritaniae*.

Fucus teres ramosus Pini setis sursum rigentibus, cinerea  
quâdam crustâ, velut gypso creberrimis foraminulis re-  
fertâ, obductis ; ex *Virginia* à Domino *Jacobo Marshal*,  
accepimus.

**F**umaria *Sinica*, foliis Chelidonii modo lacinatis.

Fumaria filiquosa, nodosis filiquis, *Insulae Cheusan*.

**F**ungus Coriaccus subterraneus, *Mandels. Excerpt. 4.*

Fungus Collyricus in putrescenti Salice natus. Ita dictus  
quod Collyrae *Judæorum* nostratium *Paschali* valdè affimi-  
latur.

Galactoxylon

G

**G** Alactoxylon *Almag. Bot. s. Laurifolia* arbor venenata *Cat. Jamaic.* Eadem forte Arbor cujus mentionem facit *Maiolus Colloq. 21. fol. 361.* his verbis. Non procul à *Malacca* Arbor est, cujus radices cum multæ sint, in varias dispersæ sunt partes, quæ enim ad *Orientem* spectant, Antidotum præbent adversus Venenum quodlibet, febresque pellunt, aliasvè ægri tudines, at quæ vergunt in *Occasum*, ipsissimum venenum sunt, valdeque vehemens, ut ita res eadem sit simul Antidotum & venneum. *De rebus Sinarum, p. 4. cap. 17.* Item *Gaspar. Schottus* in quarta part. *Magiæ, Syntagm. 1. cap. 2. pag. 366,* de quâ etiam *Pineda* in *Salamone prævio. lib. 3. cap. 22.* cum dicit, Cujus radix multifida oppositas habet virtutes, ita ut fibræ ad *Orientem* spectantes, Antidotum contra venenum, spectantes vero ad *Occidentem*, sint ipsissimum venenum.

Galeata & verticillata *Floridana*, *Lyfimachiæ* filiquosæ glabris foliis conjugatis. *Dracocephalo* affinis *Americana.*

Galega *Africana* floribus majoribus, & filiquis crassioribus *Turnes. Instit. 399.*

Galeopsis *Cheusanensis* spicata, *Sideritidis* folio & facie.

Gallium



**G** Allium montanum latifolium ramosum. *Turnef, Inst.* 115. *Rubia sylvatica lævis, J. B. tom. 3. 716.* Molugo montana, latifolia, ramosa, *C. B. P. 334.* Gallium montanum, latifolium, cruciatum, *Fab. Column. ecphras. 296.*

Gallium Saxatile, glauco folio: *Boccon Mus. pag. 172. tab. 116.*

Gallium minus *Cheusanicum*, locis uliginosis innascens.

Gallii lutei similis, Herba *Tituanica*, flosculis colore cæruleo fistulosis.

Gallium luteo simile, flore niveo *Mauritanicum*.

**G** enista *Africana* foliis perpusillis, Fruticis cineracei muscosi *Breynio* referens, sed magis virentibus.

Genista Spartium aphyllon. *Prom. Bon. Spei.*

Genista trifoliata argenteis, & angustis foliis, *Mauritanica*.

Genista *Africana* monospermos, Ericæ foliis viridibus, flore albicante, ex *Horto Episc. Fulhamiæ*. An forte Spartium *Africanum* frutescens, Ericæ folio, *Hort. Med. Amst. part. alt. fol. 193.*

Genista *Africana* platyphyllos, flore luteo, foliis purpureis in capitulo sphaerico rotatis.

Genista

*Genista Mauritanica* platyphyllos lignosa, uno ex altero *Opuntia* in modum enascente folio, floribus planè aureis. An *Genistellæ* herbacæ platyphyllos, *J. B. tom. 1.* species fruticosa? An *Genistella fruticosa Lusitanica*, latifolia. *Turnefort. Instit.* 646.

*Genista Mauritanica* frutescens, angustioribus foliis, quadam veluti articulatione sibi invicem innascentibus. An *Genistella fruticosa Lusitanica*, angustifolia. *Turnefort. Instit.* 646.

*Genista spinosa* è *Tingitaniæ* Monte *Moosa*, floribus parvis croceis floribunda.

*Genista spinosa minor Mauritanica*, spicâ florum in aculeum desinente. Ex ea *Mauritaniæ* parte ubi Urbes Fessa, & Marochum sita sunt, delata est.

*Gentiana major purpurea*, *C. B. P.* 187. *Gentiana magna* flore purpureo, *J. B. tom. 3. fol. 521.*

*Gentiana major* flore punctato, *C. B. P.* 187. *Gentiana major* flore pallido, punctis distincto, *Clus. Hist.* 312.

*Gentiana major* aphyllus, aduncò flore purpurascens, ex *Insulâ Cheusan.* Planta flore *Digitalis* purpureo absq; foliis è Terra prorumpens. *D. Cunningham.*

*Gentiana* (forte) *Nov'eboracensis* tenerifolio longiori, semine orbiculari margine foliaceo.



Gentianella Ascyroides *Malabariensis*, flore cæruleo. An  
Tsjanga-puspan : *H. Malab.* part. 9. tab. 57.

Gentianella æstivalis *Maroccana*, flosculis parvis ochroleucis.

**G**eranium *Africanum*, foliis inferioribus Afari, superi-  
oribus Staphydis agriæ maculatis splendentibus, &  
Acetosæ sapore. *Casp. Comel. Prælug. Bot.* 52. In *Hort.*  
*Comptoniano* ex feminibus natum invenimus.

Geranium *Africanum*, Hederæ folio anguloso pingui ; cau-  
liculis farmentosis, amplissimo flore ; ex Horto *Illustris-*  
*simæ Ducissæ de Beaufort* apud *Badmingtoniam* in Comita-  
tu *Glocestriæ* stirpium exoticarum refertissimo. Hedera-  
cæ foliis Plantæ *Lobelio* pictura apud *Parkinson* 679.  
Huic nostræ quoque folia, multum convenire videtur.

**G**ladiolus *Indicus* palustris latifolius, flore albicante.  
*Commelin.* *Bela-pola Hort. Malab.* part. 11. tab. 35.

Gladiolo affinis *Maderaspatana*, flore luteo, lituris nigris  
striato.

Gladiolo affinis, s. Gladiolus cæruleus, floribus parvis con-  
fertis, spicam compressam, disticham, pyramidalem, ef-  
ficientibus, ex *Prom. Bon. Spei.* apud *Sherardinas*.

Glauci exiguae maritimæ similis, plantula *Maderaspatana*,  
*Colerawy Malabarorum*.

Gnaphalium

**G** *Naphalium Africanum* minus, foliis brevibus reflexis.

*Gnaphalii minoris* genus *Sinense*, ex *Insula Crocodilorum*.

*Gnaphalium Monomotapense* pumilum, capitulis squammosis. *Prom. Bon. Spei*.

**G** *Ossampinocarpon*, s. *Planta Gangetica*, fructu ovato, parvo striato, intus lanugine farcto.

*Gossampinophyllon Africanum*, s. *Frutex Taxifoliis* brevibus albâ lanugine farctis. An fortè sit species, vel varietas *Chamælææ nostræ Africanæ Taxifoliæ Mantiss.* 45. Cujus folia pariter sunt intus lanugine referta; Ista autem sunt Hujus longè majora. *Frutex* hic *Buh-hu Hottentotis* dictus. Quem in sevo contundunt ad corpora sua ungenda, ut nos monuit *Insignis Botanicus. D. Jacobus Cunningham*.

*Gossampinophyllon fruticosum Africanum triphyllum*, *Rosmarini* angustissimis foliis, albâ lanugine farctis, summo caule flosculis glomeratis, ad *Genistam nostram Æthiopiam*, *Pinastris* foliis triphyllam *Phytograph.* quoad folio saltem, propiùs accedere videtur.

*Gossipium herbaceum*, s. *Xylon Maderaspatense* minus, flore sulphureo pentaphyllæum, *Parety Malabarorum*.

**G** *Ramen pratense Malabaricum*, *Tsjama-pullu*, *H. Malab.* part. 12. tab. 41.

Gramen



Gramen pratense *Sinicum*, Amoris paniculâ, sparsâ, & speciosâ.

Gramen Secalinum, utriculis echinatis. *Hort. Uvedal.*

Gramen Avenaceum *Maderaspatanum*.

Gramen Avenaceum Nemorale *Sinicum*, Spicâ longâ spadiceâ molli.

Gramen Avenaceum *Ind. Or. Schoenantho* affine aromaticum, panicula magna condensâ.

Gramen Festucarium *Maderaspatanum*, spicâ spadiceâ, caule tenui, & si deorsum digiti ducantur aspero. *Curkay Malabarorum.*

Gramen Festucarium *Sinicum*, spica compactiore, pyramidata, cristata, summo culmo hirsutie pubescens.

Gramen s. Festuca altera, capitulis duris spica longiore. *Bot. Monsp. append. alt. Festuca capitulis duris, spicâ longâ sive duplo longiore. H. Cathol. Supplem. alt. Gramen spicatum durioribus & crassioribus locustis, spicâ longissimâ Turnef. Instit. 519. Festuca altera, capitulis duris, spicâ triunciali. C. B. P. 10.*

Gramen Typhinum, spica longa gracili, *Hort. Uvedal.*

Gramen Typhinum *Maderaspatanum*, spicâ longâ interruptâ *Codry-pillœ Malabarorum.*

Gramen

Gramen *Indianum*, spicâ interruptâ, villosâ, ex Insulâ *Jō-annâ*.

Gramen *Alopecuroides Sinicum* spicâ spadiceâ, ex Insula *Cheusan*.

Gramen *Alopecuro* accedens, ex culmi geniculis spicas cum petiolis longiusculis promens, *Almag.* 177. & *Phytogr. tab.* 33. fig. 7. Gramen serotinum arvense, spica laxa pyramidali, *Raii. Hist. Pl.* Est Graminis panicei genus elegans. An Gramen culpidatum, tenui, torosâ, villosâ, spicatâ glumâ, Panici granulis prædita; *Lobelii. Illustrat.* 39.

Gramen arundinaceâ paniculâ, ex *Ind. Or.* An *Tsjama-pullu*. *H. Malab. part.* 12. *tab.* 45. Eodem nomine Gramen pratense eorundem in præcedentibus, ab iisdem insignitur, licet inter se sunt Valdē discrepantia Gramina.

Gramen arundinaceum minus *Mederaspatanum*, radice repente. An *Beli-caraga* *H. Malab. part.* 12. *tab.* 47. ubi dicitur plurimis cæremoniis Religione *Bramannum* celebratur hæc planta.

Gramen arundinaceum minus, ē *Maderaspatan*, panicula eleganti spicata, *Poopilloë Malabarorum*.

Gramen arundinaceum *Ind. Or.* panicula non tomentosa, *Pille-curca Malabarorum*.



Gramen arundinaceum acerosa glumâ, ex Insula Crocodi-  
lorum.

Gramen tomentosum spicatum, C. B. P. 4. Gramen Alopecu-  
curos spicâ longâ tomentosâ candicante; J. B. tom. 2.  
474. Gramen tomentosum, Alopecuros vera Plinii &  
Theophrasti Hist. Lugd. 430.

Gramen arundinaceum ramosum plumosum, C. B. P. J. B.  
Hist. Pl. tom. 2. 476.

Gramen paniceum, spicâ simplici asperâ majus, Ind. Or.  
Pilleryshy Malabaror.

Gramen paniceum, spicâ simplici levi, aristis aureis Ma-  
deraspatanum.

Gramen paniceum, spicâ laxâ Cheusanense.

Gramen tremulum minus, locustis parvis triangulis. In  
pratibus primo Insulæ Ferseiae deinde in regno Galliae in-  
venit D. Sherard. Raii Cat. Exter. Supplem. 399.

Gramen paniceum Sinicum, spica longiore levi, è plurimis  
spicis conflata.

Gramen paniceum polystachion Sinicum, binis granorum  
ordinibus, & binis, granis in eodem ordine, uno versu  
constante. In Insulâ Cheusan. Septembr. 20. 1702. col-  
legit Optimus Vir & Amicus noster honorandus D. Cun-  
ninghamus. Varrigo-tawly dicitur à Malabareis.

Gramen

# AMALTHEUM BOTANICUM III

Gramen paniceum distachyophoren spicâ binis granorum ordinibus uno versu constante; Mantiss. 94. Teretapullu H. *Malab. part. 12. tab. 44.*

Gramen amoris *Indicum* minus, paniculâ non sparsa, ex Insula *Joanna*.

Gramen maritimum *Maderaspatanum*, Psyllii capitulis cum ramulis ad genicula prorumpentibus; Oopuncarragoë *Malabarorum*.

Gramen cyperoides *Americanum*, spicis speciosis plurimis compressis, summo caule absq; pediculis adnatis. *Phytograph. tab. 91. fig. 3.* Nescio qua causa hanc omissam fuisse in *Almagesto*. Mottenga *Malabarica* H. *Malab. part. 12. tab. 52.* huic nostræ in omnibus penè convenit; in eo tamen differt, quod radices glandulosæ non sint in nostrâ, sed fibrosæ.

Gramen cyperoides *Maderaspatanum* minus, paniculâ compactiore, summo caule trium foliorum in sinu sessili. Mulen-pullu H. *Malab. part. 12. tab. 54.* Graminis Cyperoidis species minor *Indiana*, paniculâ Junci compactâ, Shegapu Corea *Malabarorum Mantissæ 96.* Huic nostræ propius accedit.

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, paniculâ magnâ insignitè squammata. Ira H. *Malab. part. 12. tab. 55.* Gramen Cyperoides *Marianum* habitioribus teretibus, & compactis Cupressi formibus spicis, ad summum caulem pediculis innitentibus, *Mantiss. 97.* Huic maxime convenire videtur.

Gramen



Gramen Cyperoides majus *Malabaricum*, summo caule ex  
 una panicula plures proferens. Ira sive Baluri H. *Ma-*  
*lab. part. 12. tab. 56.*

Gramen Cyperoides *Ind. Or.* latiore folio striato, summo  
 caule paniculis paleaceis. Beera-Kaida H. *Malab. part.*  
*12. tab. 58.*

Gramen Cyperoides *Ind. Or.* spicis ex communi centro plu-  
 rimis, Alopecuro accedentibus, summo caule panicula-  
 tis. Kol-pullu H. *Malab. part. 12. tab. 63.*

Gramen cyperoides *Indianum*, foliis variè adumbratis, pa-  
 nicultis Graminis pratensis minoris *Nostratium*, ex alis  
 foliorum prodeuntibus. Tsjolap-pullu H. *Malab. part.*  
*12. tab. 67.*

Gramen Cyperoides *Malabaricum*, tenui paniculâ sparsâ.  
 An Wara-pullu, H. *Malab. part. 12. tab. 42.*

Gramen Cyperoides *Cheusanense*, tricephalon, globulis ec-  
 hinatis.

Gramen Cyperoides parvum tricephalon, è Regione *Made-*  
*raspatân.*

Gramen Cyperoides parvum *Sinicum*, capitulo globoso,  
 ad summum caulem inter quatuor foliola sessili.

Gramen Cyperoides *Floridanum*, spicis in summitate tere-  
 tibus, brevibus, & compactis.

Gramen

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, capitulo grandiore simplici, globofo, candicante, ad summum caulem medio foliorum sessili. Pee-Mottenga *H. Malab. part. 12. tab. 53.* Hujus minor species recensetur in *Mantissâ nostrâ, fol. 98. pl. 2.*

Gramen Cyperoides halicacabum, s. *Floridanum*, semine albo triquetro, Vesiculis inflatis, summo caule glomeratis, incluso.

Gramen Cyperoides *Ind. Or.* capitulo ex pluribus apicibus coagmentato.

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, Cyperi paniculis viridifuscis, radice irrepente. An Potta-pulla *H. Malab. part. 12. tab. 50.* Cum hoc Gramine ædes obteguntur, Incolas per biennium contra aëris æstus, Ventorumque injurias, fartos & integros fervans.

Gramen Cyperoides *Maderaspatanum*, Junci paniculâ sparsâ, Kaden-pullu *H. Malab. part. 12. tab. 48.*

Gramen Cyperoides Junci capitulis, s. Gramen parvum Junceum erectum, vel *Holosteum* strictissimis foliis glabris, *Maderaspatanum*; Chendöe-curry-pille *Malabarorum.* Hujus supini & hirsuti generis Icon, habetur in *Phytograph. nostrâ, tab. 299. fig. 3.*

Gramen Junceum caule compresso, nodis nigricantibus. *Prom. Bon. Spei.*



Gramen Cyperoides *Maderaspatanum* minimum, Ischæmi paniculis cum aristis.

Gratiolæ affinis *Maderaspatana*, foliis oblongis levitè crenatis, capsulis splendentibus atris. Neer-culla *Malabarorum*.

Gratiolæ affinis *Floridana*, Digitalis æmula, Salicis angustis longioribus foliis, floribus & capsulis in spica brevi, longis pediculis ex foliorum alis prodeuntibus innixis.

## H

H

EDERA arborea *Cheusanensis*, vulgari similis, sed foliis perangustis.

Hedera *Cheusanensis* Glycyrrhizæ foliis rigidioribus.

Hedera arborea *Cheusanensis* baccifera, foliis Ulmi.

Hedera trifolia baccifera *Malabarensis*, Comelin. Not. Kareta-Tsjori-valli; *H. Malab. part. 7. tab. 45.* Taua-Cotamaram *Malabarorum*.

Hedera Quinquefoli *Canadensis* similis scandens, ex Insula *Cheusan*. An fortè Belutta-Tsjori-valli, *H. Malab. part. 7. tab. 10.*

Hedera

*Hedera baccifera Maderaspatana*, foliis plurimis ad genicula caulium prodeuntibus. *Mareta Inala H. Malab. part. 11. tab. 63. vid. inter Frutices.*

*Hedera terrestris Vulgaris minor*, foliis eleganter variegatis.

**H** *Eliotropium minus Supinum. C. B. P. 253.*

*Heliotropium minus Majoranæ foliis, Ind. Or. Codeir podela Malabarorum.*

*Helleborine Calceolus Mariæ dicta Caroliniensis*, bifolia, lateralibus florum petalis prælongis admodum, & angustissimis.

*Helleborine Floridana* biflora, purpureo flore, caule & foliorum nervis hirsutie pubescentibus.

*Helleborine Malabariensis*, Calceoli Mariæ foliis, floribus parvis rubris, in spicam longiorem digestis. An fortè *Basaala-poulon-Maravara, H. Malab. part. 12. tab. 27.*

*Helleborus albus minor botrytis*, Ephemeris Phalangoides foliis, magna sui parte caulem vaginantibus, floribus atropurpureis, ex *Angola Mantiss. 101.* Huic fortè spectat *Elleborinè botryoides*, s. *Alisma racemosum J. B. tom. 3. fol. 517.* *Helleborine altera*, flore atrorubente, *C. B. P.*



**H**erba *Maderaspatana* Violæ Martiæ longiore folio glabro, spica florum *Ephemerum Matthioli* æmulante.

Herba *Maderaspatana* spicata, foliis superioribus Agerati conjugatis, inferioribus plurimis tenuissime divisis, ad nodos circa caulem radiatis, capsulâ parvâ subrotundâ, seminibus nigris minutissimis refertâ. *Spicam suam Euphrosynes instar emittit.*

Herba trifoliata *Sinensis*, Sifari folio.

Herba convolvulacea longiore folio trinervi, Zarza parillæ similis *Maderaspatana*.

Herba parasitica *Barbadensis*, sanguineum liquorem fundens. An fortē *Flabia*, Amoris herba *Marci Aurelii* Imperatoris. Cum enim ipse Imperator Philosophus ad *Antigonum* scriberet, de *Flabia* Herba, meminit in hunc modum. Agens ego (inquit) septimum suprâ Vigessimum annum, degebam in Insula *Cethir*, cui & *Cypri* nomen est; Ibi Mons est admodum excelsus *Arcadius* nomine; in eo *Flabia* nascitur herba cui inditum a Naturâ est, ut si excidatur, emanet ab eâ liquor sanguineus tepescens, quo dum tepor durat, si quis ab alio contingatur, occultâ quâdam ratione, trahitur in amorem ejus qui tetigerit: At si is succus refrixerit, eoq; quicumque contingatur, amoris refrigerationem, benevolentiaq; aversionem inducit. Hæc retulit *Modonetus in Vit. Marci Aurelii lib. 3. cap. 10.*

Herba

Herba *Maderaspatana*, Lentisci tenerioribus foliis, quasi perforatis. An Hyperici species *Indiana*.

**H**esperis *Africana* villosa, flore cæruleo, *Turnef. Inst.* 223. *Leucoium Africanum*, cæruleo flore latifolium, hirsutum; *H. L. Bat. pag.* 364.

Hesperis sylvestris angustifolia, flore parvo, *Park.* Hesperis sylvestris flore parvo, *C. B. P.* An rectius sit *Leucoium*.

Hesperidi affinis dipetalos, filiqua brevi *Malabariensis*; *Kondam-pallu H. Malab. part. 9. tab.* 31.

**H**exapetalos peregrina, ex *Florida*. Bulbosa forsân.

**H**ieracium *Cheusanicum*, Rapistri foliis glabris, ramoso caule, floribus parvis luteis. Planta est flore radiato, cujus discus ex flosculis lutescentibus, & fuscis, quintifidis, (summitatibus reflexis) stamine flosculi unico striato, & quadripartito, cum duobus apicibus luteis, circularitèr reflexis, annuli instar, corona vero ex semiflosculis luteis, octo plerumque composita, embryonibus infidentibus, Et calyce oblongo, tenui, & multifido comprehensis: Embryones autem deinde abeunt in semina pappis instructa; Foliis Hieracii lævibus, & laciniatis, caulibus ramosis, in quatuor vel quinque pedum altitudinem assurgens. *Novembri* floret, *D. Cunningham.*



Hieracium *Cheusanense*, Sonchi laciniatis foliis.

Planta est flore luteo flosculofo, plurimis flosculis constante, multifidis, (ex quibus prodit stamen longius bifidum) embryoni insidentibus; Et calyce cylindraceo multifido, comprehensis; Embryo autem deindè abit in semen pappis instructum; Folia alternatim cauli adhærent, absq; pediculo, laciniata, & oblonga, & flores in ramulorum fastigiis; *Octobri* floret, *D. Cunningham.*

Hieracium *Chondrilla* dictum, Sonchi folio, viminalibus virgis *Maderaspatan.* Severoo-Molingù *Malabarorum.*

Hieracium fruticosum *Sonchites Siculum*, foliorum limbis spinulis asperatis, floribus parvis, summo caule quasi in Umbellam sitis. An *Virga aurea* foliorum limbis asperatis, *Cupani?* Quæritur à *Sherardo.*

Hieracium *Siculum*, s. *Chondrilla Dentis Leonis* folio, floribus luteis in spicam laxiorem dispositis.

Hieracium *Chausanicum*, foliò angustiore, oblongo integro, subtus cæsis, floribus parvis luteis, *Octobri* floret.

Hieracium *Virginianum*, Cichorei foliis, calyce barbato.  
**Yellow Succory** *Nostratibus* dictum.

Hieracium minus, *Chondrillæ* foliis, ex Insulâ *Cheusan.*

Hieracium minus *Cheusanense*, angustis *Scorzoneræ* foliis, floribus numerosis.

Holostii

**H**Olostii majoris haud absimilis, Herba *Maderaspatana* spicata, folio secundum caulem singulari ; Neer-pod *Malabarorum*.

**H**orminum minus *Betonicae* folio, flore purpureo, ex Provinciâ *Floridanâ*.

Horminum *Sinense*, Stachydis alatis foliis, flore purpureo ; Neru-teala *Sinarum*.

Horminum *Sinense* triphyllon, Caryophyllatae foliis, spica florum Galeopseôs legitimæ *Dioscoridis*, Quod D. *Cunningham* sic describit.

Planta flore purpuro-violaceo, monopetalo, labiato, piloso, cujus labium superius falcatum est, inferius vero in tres partes divisum, mediâ Cochlearis instâr excavatâ, cum duobus vel tribus staminibus versus labium superius prodeuntibus ; Calyx parum pilosus purpureascit, Et quasi labiatus, cujus labium inferius bifurcatum. Folia fert *Betonicae* similia versus radicem, ex uno pediculo terna, *Septembri* floret.

**H**Yacinthus parvus *Orientalis*, porraceis foliis, Cautocanna *Malabarorum*.

Hyacintho affinis *Floridana*, caulescens ramosa, gramineo folio, flosculis parvis fistulosis, pallidè purpureis, fummis oris fimbriatis, vasculis feminalibus tetragonis.

Hyacinthus *Floridanus* spicatus, foliis tantum circa radicem brevibus, elato caule, floribus albis parvis, striatis,



tis, & veluti lanugine s. pube quâdam elegantissimè crispatis.

**H**Ypecoi altera species, *C. B. P.* Hypecoum filiquis pro-  
pendentibus, non articulatis bivalvibus; *Morison.*  
*Hist.* 2. 279. Cuminum sylvestre filiquosum, *Ponæ Hist.*  
*Lugd.* Hæc autem unâ cum Hypecoo filiquis erectis ar-  
ticulatis, licet inter se discrepant, Utræq; fortè, nulli-  
bi aptius quàm Papaverum classi averruncandæ sunt.

Hypericum Ascyrum dictum *Cheusanense*, Gummiferum,  
longissimis foliis, thecâ seminum pyramidatâ, ex calyce  
polyphylo quinque capsulari. *Gummi ut Mastichen fundit.*

Ascyri species, flore rosaceo, fructu pyramidato quin-  
que capsulari, ex calyce polyphylo surgente; (gum-  
mi subflavum & lucidum Mastiches instar fundente)  
feminibusque fæto, oblongis & exiguis, foliâ fert  
absq; pediculis, è regione bina, angusta, longiora, &  
lævia, caule quadrangulo; Ad trium vel quatuor pe-  
dum altitudinem *natali Solo* assurgit, *D. Cunningham.*

Hypericum tomentosum *Carolinianum* erectum, foliolis bi-  
natis ad caulem strictissimè appressis, & decussatim po-  
sitis, sempervirens.

**H**Yssopus montana, *Ponæ* folio subtus azureo.

*Jacea*

J

**J** A C E A *Tituánica*, Raphani rusticani foliis variis, capite magno singulari, An fortè Stoebes, an potius Centaurii majoris species, squammatis capitulis, argenteo nitore splendentibus.

*Jacea Stoebe* foliis, alato caule peregrina, *Hort. Uvedal.*

*Jacea altera Babylonica*, floribus luteis paniculatis; apud *Collectaneas D. Sherardi.*

*Jacobæa Sinica.* Irionis *Apulæ* folio, ex Insulâ *Cheusan.*

*Jacobæa Africana* frutescens, foliis rigidis, & hirsutis, *H. Amst. part. alt. 149.*

*Jacobæa Monomotapensis* spicata; *Breynii, Cent.*

*Jacobæa Africana*, Coronopi folio, *H. Amst. part. alt.*

*Jacobæa maritima*, Senecionis folio crasso, & lucido *Masiliensium, Turnef. Inst. 486.*

*Jacobæa Sicula*, Glasti folio, *Turnef. Inst. 486.* *Jacobæa Ætæna* Glastifolio, levitèr dentata umbellifera, *Hort. Catholic.*

*Jacobæa Cortusæ Matthioli* foliis, *Africana*, ex *Prom. Bon. Spei.*



Jacobæa Eryngii campestris folio, & facie; *Prom. Bon. Spei.*

Jacobæa multifida umbellata annua, *Bocconi de Plant. Sicul.*

Jacobæa Hieracifolio glauca, floribus numerosis aureis, *Africana*. Jacobæa *Africana* perennis, integro, obtuso folio, glauco; *Volck. Fl. Norib.* 226.

Jacobæa Chrysanthemi Cretici folio glauco, *Turnef. Instit.* 486.

**J**asminum *Zeylanicum*, amplissimo Coryli folio, non dentato, floribus albis odoratis.

Jasminum Coryli dentato folio *Maderaspatana*, Viminibus lentis.

Jasminum *Japonicum*, Blattariæ folio, floribus tetrapetalis, & pentapetalis cæruleis, summo caule in Umbellam fitis.

Planta est flore cærulescente, tetrapetalo, & pentapetalo, umbilico purpurascente, absque calyce, foliis latioribus ex adverso binis, subrotundis, acuminatis, & ferratis. *Mai*o & *Junio* natali solo floret, ad caulis summitatem in umbellâ quasi fert flores, Ex *Infulâ Japoniâ Sinicè* Seu-kiu-hoa dicitur, *D. Cunningham.*

Jasminum arboreum *Maderaspatanum*, Bucananthi folio incano, floribus purpureis, longo tubo donatis.

Jasminum

Jasminum *Sinense*, foliis venosis floribus purpureis Schetti  
instar longissimo tubo donatis, ex Insulâ *Crocodilorum*.

Jasminum *Virginianum* erectum, Cerasi ampliore folio, flo-  
ribus parvis atropurpureis, in umbellam positis.

Jasminum *Lauri Alexandrinæ* foliis scanforium, floribus al-  
bis parvis fragrantissimum, *Hort. Badmingtoniani*.

Jasminum *Azoricum* trifoliatum lucidum, acuminatis fo-  
liis, flore albo odoratissimo, flexilibus & obsequiosis  
Virgulis. A Jasmino flavo odoratissimo maximè diver-  
sum.

Jasminum *Maderaspatanum*, Lentisci folio pentaphyllon, &  
heptaphyllon, floribus tetrapetalis comosis, staminibus  
plurimis refertis, baccas ferens. Unangoree *Malabaro-  
rum*.

**I** Beris humilior annua, *Floridana* non ramosa.

**I** Lex *Cheusanensis*, Lauri folio leni, subtus incano, glan-  
de parvo, & præ lævore nitente, calyce rugoso. D.  
*Cunningham*.

**I** Licis latiore folio facie, Arbor *Maderaspatana*, Neera-  
dymeram *Malabarorum*.

**I** Lex *Sinarum*, longioribus foliis, à summo ad medium  
usque in margine serratis; ex Insulâ *Cheusan*.

Incognita



**I**Ncognita angustis foliis è regione binis, flore unico papilionaceo, ex finu foliorum longo pediculo insidente.

**I**Ris *Africana* versicolor, pumila, plicatis & hirsutis foliis, radicè bulbosâ.

Iris tuberosa pratenfis angustifolia, folio fætido, C. B. P.

Iris tuberosa, folio anguloso, C. B. P.

**J**uncellus *Maderaspatanus* tricephalos, capitulis compactioribus, acumine longo, simplici reflexo.

Juncellus *Malabaricus* tricephalos, capitulis compactis, summo caule unico foliolo cinctis. Motta-pullu *H. Malab. part. 12. tab. 38.*

Juncus *Sinensis*, paniculis parvis conglobatis, acumine singulari integro.

Juncus parvus *Sinensis*, panicula sparsâ, caule foliaceo compresso.

Juncus *Africanus* nigrinodus, cùm pericarpiis splendentibus, fuscis.

Juncus *Africanus* nigrinodus, spicâ laxa nigricante.

Juncus *Africanus* nigrinodus, paniculâ compactiori, plurimis spiculis intortis conflatâ.

Juncus

*Juncus parvus Africanus* nigrinodus, spicâ longiore compactâ.

*Juniperus major* *Oxycedro* similis, baccâ grandiore oblongâ, rufâ, cærulescente polline aspersâ. *Juniperus major* baccâ cæruleâ, *C. B. P.* 489. *Juniperus maximus Illyricus*, cæruleâ baccâ, *Lob. Icon. tom. 2. 223.* Vidi apud *Collectaneas Sherardinas*, hoc nomine inscriptum, viz. *Juniperus major*, *Cedrus Phoenicea* dicta, baccâ majore, oblongâ rufâ, cærulescente polline aspersâ.

*Juniperus Barbadenfis* *Cupressi* folio, ramulis quadratis. *Almag. Bot. 201. & Almag. Bot. Mantiss. 109.* De hac Arbore forsân Interpretari licet quod dicitur; In regno *Congiano* tanta copia, tantæque magnitudinis, ut indè naves conficiant. *part. 1 Ind. Orient. lib. 2. cap. 1. & in Insula Tercerâ Scaphæ, Currus, rhedæ, & hujus alia opera extruunt, part. 3. Ind. Or. cap. 6.* Sic in *Andes Novæ Hispaniæ* summa copia, ubi alia alba, alia rosea, & fragrans, *Jos. Acoft. lib. 4. cap. 3.* ubi de Cedro admiranda verba facit; Provenit etiam in *Virginia, & Florida, C. B. P. 491.* Et fortè sit eadem Arbor quam *Alexander Cornelius Æonem* appellavit, ex quâ facta esset *Argo*, Navis illa famosissima, quæ nec aquâ nec igni posset corrumpi, nulli alii cognitam (inquit *Plinius*) quod equidèm sciam, *lib. 13. cap. 22.*

*Juniperi* folia *Arbuscula Cheusanensis* Conifera, foliis variis *Cupressi squammosis, & Juniperinis, D. Cunningham.*



## K

K

ALI minus *Sinense*, plurimis ramulis polyspermon.

Kali (fortè) an Blitum, Atriplex dictum, *Maderaspatanum teretifolium*; Collar-wallowy *Malabarorum*.

Kali frutex, tenuissimis vermiculatis foliis peregrinum, ex *Horto Comptoniano*.

Kali geniculato affinis, *Indiæ Orientalis*. Coral-pundoo *Malabarorum*.

Kali spinosum cochleatum *Sinicum*, in sabulosis proveniens locis.

Planta est maritima, ramosa, in sabulosis proveniens, foliis teretibus in aculeum desinentibus, alternatim positis, caulibus rubentibus, & striatis, radice lignosâ, & fibrosâ; Flores foliorum alis singuli, aliquando bini adhærent, & versùs ramorum cacumina, in spicam quasi dispositi; Flos primo aspectu pentapetalos apparet, fundo incarnato, petalis albentibus, rigidis, membranaceis, quorum tria ferè cordiformia, & duo magis angusta, (strictè loquendo nec petalôdes neque stamineus dici potest, quia fit seminis in volucrum; Et staminibus caret) sed reverâ monopetalos, quintifidus, cujus divisionibus ita adnascuntur appendices,

dices, & conjunguntur in umbilicum, ut floris fundum mentiantur, quibus dilatatis, in fundo floris vero, & membranaceo, quasi capsula conspicitur semen unicum, rotundum, membranâ tenui obductum, quâ sublata, observare est semen ipsum, confici, ex filo viridi hinc inde spiralitèr contorto, in figuram sphaericam; Floris calyx quasi Campaniformis, & squammosus, plerumque quadrifidus, aut quintifidus, in aculeos inæquales desinens, *Octobri* floret; Kali est species, *Sinice* Sha-sin (i. e.) in arenis nascens: Ad oram maritimam Insulæ *Tow-whey-san* dictæ provenit, D. *Cunningham*. Kali spinoso Vulgari haud absimile. Ego non invenio (inquit *Banisterus*) hujus semen ab ullo Autore ritè descriptum esse; Grani tritici colore simile est, sed duplo minus, figurâ conoideâ & turbinatâ quemadmodum *Cochlæ*, secundum Solis cursum.

Kali (forte) genus *Herba Sinensis*, rotundiore *Bliti* folio, striato, caule, ad genicula plurimis barbulis ornato; *Tounde-pundöe Sinensibus* dicta; Huic autem haud parum convenire videtur *Anonymos* nostrâ *Americana*, foliis *Parietariæ* scabris, floribus albis ad foliorum Ortum vix conspicuis, in *Phytogr. tab. 136. fig. 4.* depicta.

Kali *Curassavico* haud absimile, foliis subrotundis, e *Maderaspatan*. *Pehindoöe Malabarorum*.

**K** Atsjula-Kelengu *H. Malab. part. 11. tab. 41.* Planta bifoliata, radice tuberosa, flore tripetalo difformi *Malabariensis*. *Commelin* in locum. Huic plantæ confimilis acaulos, sub nomine *Contrayervæ* ex Insulis *Philippinis* nuperrimè allata est.

Kauki



**K** Auki *Indorum Breynio* similis, Arbor ex *Insulâ Crocodilorum*.

**K** Insu, s. Byssini aurei *Herba Sinensum*, *Almag. Bot.* 203. An *Herba Yú* ex quâ sub *Quangsi* in *Chincheu Incolæ* pannos sericum ipsum superantes conficiunt, *Mantiss. fol. 3. vid. Ogilv. Chin. tom. 2. 684.* Kim-Kaw-ia (i. e.) canis rufi capillos, nonnullis *Indis* nuncupatur *vid. Ogilv. Chin. tom. 2. fol. 13.* de *Insula Formosâ*. Ubi Vir quando matrimonium cum fæminâ contrahere vellet, hos capillos inter munera Nuptialia mittit, ex quibus prætextum conficiunt mulierculæ ad frontem, & sua tempora ornandum, quod Ornamentum *Ayam-Maniang* vocant *Indigenæ Formosani*.

## L

**L** A C T U C A sylvestris latiori folio *Floridana*. An *Lactuca sylvestris Peruviana*, *C. B. P. 123.* Huc fortè spectat *Lactucifolia renalis*, *ejusd. C. B. P. ibid.* *Herba ad Renum morbos utilis*, *Monard. & Hist. Lugd.*

**L** Amium floribus in verticillis ad caulium nodos, *Raii Stirp. Brit. pag. 130.*

*Lamium sylvaticum spicatum fætidum*, folio anguloso minus. *Angliæ nostræ Sylvicola* est.

*Lamium Tituanicum*, longiore mucronato folio, floribus ex candido & croceo mixtis.

*Lamium*

*Lamium purpureum Cheusanense*, s. *Galeopsis folio subrotundo trifariam diviso*, Vid. *Horminum*.

*Lamium rubrum minus Sinense*, villosis foliis, ex *Insulâ Cheusan*.

*Lamii rubri similis Malabarica*, radice glandulosâ eduli. Kurka. H. *Malab. part. 11. tab. 25. Insula Ceylonensibus dicta*.

*Lamium album minimum Sinense*, flosculis in summitate sitis.

**L** Apathi Anthoxanthi summis ramulis aliquatenus accedens, Planta caustica *Ind. Or. Kalurêve Malabarorum*, *Mantiss. 112*. Hujus & altera species datur omnibus sui partibus multò major, Conneta-poondoe à *Malabareis*, nuncupata, & sub Anonymi titulo in præcedentibus racensita. Kalurêve autem & aliquando Coluree *Malabarorum*, hujus minor species, vel varietas inveniri potest in *Almagesto* nostro sub titulo Anonymi *Linariæ folio Orientalis*, Gallii lutei flore, *Herbæ capsularis verticillatæ*, fol. 33. pl. 11. & ipsius Icon affabrè exsculpta in *Phytographia*, tab. 136. fig. 2. *Lapathum* autem *Anthoxantho* simile *Maderaspatanum*, *Almag. Bot.* fol. 205. pl. 9. ab utraque plurimum differt, & re verâ *Lapathum* est, & fortè *Rhabarbari* species.

*Lappula Agrimonia dicta minor Sinica*, spicâ florum magis ramosâ.



*Lappula Malabarica* pentapetalos spicata, foliis oblongo rotundis, floribus villosis monopyrene. Pupalvalli *H. Malab. part. 7. tab. 43.*

*Lappula Maderaspatana* monospermos spicata, Amaranthi folio molli, lappulis tomentosis. Wellia-Codiveli *H. Malab. part. 10. tab. 59. Vellanagumyoy Malabarorum.*

*Lappula Indiana*, Altheæ folio, flore parvo purpureo tubuloso. Neer-Tuty *Malabarorum.*

**L** Athyro congener *Ind. Or. s. Catanance* leguminosæ quorundam adfinis, angustis foliis, è regione binis, flore unico papilionaceo, ex sinu foliorum longo pediculo insidente.

**L** Avandulæ facie, Planta aromatica, argenteis foliis ex Insulâ *Crocodilorum.* An fortè *Aster Africanus* frutescens, Lavendulæ folio, flore purpureo, *H. Amst. part. alt. 57.*

**L** Aureola sempervirens *Cheusanica*, floribus ex albo virentibus. Jasminum humile erectum, flore albicante, foliis integris, *D. Cunningham.*

*Laurifolia Ind. Or.* An fortè *Rhaphani*, dicta Hippomagnesia, s. Planta equos attrahens, de quâ *Plinius, lib. 12. cap. 8.* Quæ equos etiam invitos attrahere, & adducere dicitur, non tamèn alia animantia ; Id quod experimento contigisse dicitur *Alexandro magno*, dum equo suo infederet, quem Arbor prædicta ad se traxit, ut refert *Majolus Colloq. 21. fol. 365. ex Plinio, loco citato.*

Verba

Verba *Plinii* sunt. Contermina *Indis*, Gens *Arriana* appellatur, &c. Ibi & Frutex pestilens *Rhaphani*, folio *Lauri*, odore equos invitante, qui penè equitatu orbavit *Alexandrum* primo intuitu, quod & in *Gedrosis* accidit. De hujus Arbore mentionem fecit *Gasparus Schottus* in *Physic. Curios.* 1348. & in *part. 4. Magia lib. 4. cap. 2. pag. 434.* Quod per veram Sympathiam propter efflu-  
vium alicujus qualitatis, & spirituum equis gratum con-  
tingere probabilius existimavit; Ideoque Hippopothos  
sive Desiderium equorum Arbor hæc nominari mereatur.  
Ab Achæmenide *Indorum Democriti*, ut in eodem *Plinio*  
recensetur prorsus aliena; Hanc enim equi adeò aver-  
sabantur, ut Hippophobada eadem appellabatur, quo-  
niam equæ præcipuè caveant eam.

*Laurus Cheusanensis* aromatica, Camphoriferæ haud ablu-  
dens foliis, subtus rore cæruleo tinctis.

*Lauri folio subtus cæruleo Arbor, Tulipiferæ adinstar ex*  
*Sinarum regione.*

*Lauri Africanæ odoratæ similis, ferratis foliis, è Maderas-*  
*patân.*

**L**ens minor *Elatines* fæminæ foliis alternis, splenden-  
tibus, glabris, è *Maderaspatân.*

*Lens Elatines folio singulari, minor pilosa, floribus luteis,*  
*è Maderaspatân.*

*Lens phaseolôdes Floridana, dispermos, filiquis ex uno*  
*pediculo plurimis.*

*Leucojum*



**L**eucoium *Africanum*, cæruleo flore latifolium, hirsutum, *H. L. Bat.* 364. *Hesperis Africana* villosa, flore cæruleo, *Turnef. Inst.* 223.

*Leucoium incanum*, filiquis subrotundis compressis, *Hort. Uvedal.* *Leucoium alyssoides clypeatum minus*, *C. B. P.* 201. *Leucoium peltatum Romanum minus*, *Fab. Columnæ ecphraf. part. 2. pag. 58. & 60.* *Lunaria Leucoii folio*, filiqua oblongâ minore, *Instit.* 218. *vid. Almag.* 215. *pl. 3.*

*Leucoium Thlaspifolium ex Florida.*

*Leucoium maritimum minus incanum, & elegans Mauro- rum.*

**L**ilium nanum, flore unico rubro amplissimo, triplici petalorum serie ornato; Hanc elegantem plantam in *Medii Templi Horto*, curâ honesti Viri *Caroli Garneri* cultam conspeximus.

*Lilionarcissus floribus albis gemellis, longo trubulo donatis, ex utriculo membranaceo prorumpentibus; Narry- vangaygam Malabarorum.*

*Lilium Convallium angustifolium Raii; Synops. Stirp. Brit.* 148.

**L**inaria *Mauritanica*, rarioribus foliis, flore vulgatæ luteæ, sed multò minore. An fortè *Linaria Pannonica*, flore luteo minore, quam in vulgari, *J. B. tom. 3. 458.*

Linaria

*Linaria minor erecta Floridana*, cæruleo flore. Fortè *Linaria minor cærulea recta*; *Park. Theatr. Bot. fol. 460.*

*Linariæ similis*, *Arbuscula Canariensis*, laticre folio viridi.

*Linum perenne majus cæruleum*, capitulo majore *Morison.*

*Linum maximum Africanum*, flore cæruleo *Volckam. Flor. Noriberg. 260.*

*Linum minus Floridanum* ramosius, flore parvo, luteo.

**L**otus *Africanus* major, floribus atropurpureis. An *Lotus Africanus frutescens*, flore spicato rubicundo; *H. Amst. part. alt. 167.*

*Lotus major Africanus*, longioribus & angustis foliis, floribus in fastigio ramulorum ex aureo & atropurpureo insignitis. An *Lotus angustifolius*, flore luteo purpurascente *Insulæ Sti. Jacobi, Hort. Amst. part. alt. fol. 165.*

*Lotus angustifolius minor Maderaspatanus*, filiquis parvis hirsutis.

*Lotus fruticosus Thymi montani* foliis, cauliculis cinereis, è *Maderaspatân. Shevanar-Weembooe Malabarorum. Mannelli H. Malab. part. 9. haud multum dispar.*

*Loto & Colutææ compos*, in costa foliorum, & margine pilosa. *Tsjovanna-Mannelli H. Malab. part. 9. tab. 38.*



Loto affinis fruticosa, foliis perexiguïs, filiquis sursum spectantibus. Ab hac parùm distat Nil, s. Anil sylvestre Cynanchicæ foliis *Bisnagaricum*, in *Phytographia* nostra depictum; *tab. 101. fig. 6.*

Loto affinis altera species sive varietas, foliolis aliquantum latioribus. Bongela-chedde *Malabarorum*, Manneli fortè *H. Malab. part. 9. tab. 37.* est hæc planta; Quam Genistellæ tinctoriæ speciem, facit *Commelin. Not. in locum.*

Loto affinis *Mauritanica*, capillaceis foliis pentaphyllos, floribus luteis, spica florum in aculeum desinente, *vid. inter Genistas.*

**L** Unaria Botryites ramosa, Geranii moschati foliis, *Floridana.*

**L** Upinus angustifolius cæruleus elatior *Raii. Hist. 908.* An Lupinus minor cæruleus *Tingitanus*, *Morison. Hist. Oxon. part. 2. 87.* quæritur à *Turnefortio Inst. 392.* In *Horto du Boisiano*, observavimus.

Lupulus fæmina *Cheusanensis* florens solummodò, & non fructum ferens.

**L** Ychnis coronaria Ocymi folio singulari, floribus dilutè cæruleis; è *Maderaspatân.* Pu-tumba *Hort. Malab. part. 10. tab. 63.*

Lychnis coronaria *Monomotapensis* globulifera, foliis exalbidis Genistæ aculeatæ.

Lychnis

*Lychnis Myrtifolia minor*, ex *Siciliâ*.

*Lychnis nana Caroliniensis incana*, flore albo, calyculis striatis.

*Lychnis ramosior Cheusanensis*, purpureo flore multifido, calyce longo striato.

*Lychnis Sinensis*, angustis foliis multiflora, capsulis rotundis glabris, ex *Insula Crocodilorum*.

*Lychnis polygonoides Floridana*, tenuissimis longioribus foliis, ad radicem coccifera, caule nudo albicante, ad summitatem ramoso, capsulis ferè globosis.

*Lychnidis species*, *Spergulæ marinæ* foliis, *Floridana*. An *Lychnis Virginiana Vermiculatis Kali* longioribus foliis, caule nudo, summo fastigio floribus umbellatis, *Mantiss. 121. pl. 5.*

*Lychnis Cheusanensis fruticosa*, flore albo simplici laciniato. *Saxifraga magna Matthioli*, huic propiùs accedit.

*Lychnis Sinica polyanthos*, angustis foliis glabris, ex *Insula Cheusan*.

*Lychnis minor Cheusanica*, *Holostii minoris* folio, capsula brevi.

*Lychnis minima hispida noctiflora*, *Botan. Monspel. append. pag. 308.*

*Lychnidis*



*Lychnidis æmula* alato caule, summis ramulis perfoliata, ex *Oris Malabareis*. An *Kansjan Cora H. Malab. part. 10. tab. 52.* *Narrecomptee Malabarorum, Mantiss. 43.* Et *Gritillam Ceylonensium, Febrifugam Hermannii, Mss.* Huic congenerem semel putavi, sed mutatâ sententiâ aliud nunc sentio, & pro *Lychnidis æmulâ* pono.

*Lychnidea Asclepiadis folio Floridana*, summo caule floribunda.

*Lycium Myrsinites* facie, majoribus foliis *Maderaspatana*, floribus *Jasmini*, *Clay-cheddy Malabarorum*.

*Lycium Myrsinites Sinarum*, spinis longioribus bijugis, baccâ coronatâ rubente, plerumque gemellâ.

Frutex est spinosus, foliis lanceolatis, lævibus & obscure viridibus, ex adverso binis, absque pediculis, baccâ rubente coronatâ, duo vel tria semina continente, Mense *Novembri* ex *Insula Pu-to* delatus. In *Bonziorum* hortis colitur, & *Sinicè Hū-tsū* dicitur, *D. Cunningham*.

*Lycium Africanum*, angustissimis brevioribus foliis, ad nodos confertis, pro *Sideritide* olim habita, vid. *Almag. Bot. 346. pl. 7. & Phytogr. tab. 315. fig. 5.*

*Lycium Indicum*, folio rhomboidali parvo, flore magno cucullati æmulo, villoso, aculeis grandioribus foliosus. *Cummala Malabarorum*, & aliquando *Coreatty*. Arbuscula *Bisnagarica*, *Aceris* folio parvo aculeato, *Almag. Bot. 45. pl. 2.* est hujus varietas altera.

*Lycium*

*Lycium Maderaspatanum*, subrotundo singulari folio, cum spinis rectis, hirsutiè pubescentibus, costâ foliorum in spinulam abeunte.

*Lycium Maderaspatanum*, subrotundis foliis ex adverso binis, spinis solitariis recurvis, baccâ orbiculari calyculatâ, summo vertice spinulâ instructa. Torelly *Malabarorum*.

*Lycium Maderaspatanum triphyllon*, foliis veluti perforatis, fructu oblongo, ad genicula ex foliorum alis erumpente, spinis brevioribus rectis, uno versu gemellis.

*Lycium Maderaspatanum*, aculeis robustioribus, Frangulæ foliis, floribus villosis. Mara-collar-cheddy *Malabarorum*.

*Lycium majus Maderaspatanum*, Jasmini flore non spinosum, foliis subrotundis lucidis. Peringolary-cheddy *Malabarorum*.

Lycio affinis non spinosa, è *Maderaspatan*, majoribus cordatis foliis, lucidis, subrotundis, fructu calyculato, ad summum verticem, cuspidè tenuissimo longius producto.

*Lycium Prunifolium Africanum*, spinis carens, fructu Guaiaci compresso, binis officulis, Sebestenæ sapore. Huic affinis esse videtur spinosa, Kanden-Kara H. *Malab. part. 5. tab. 56.* viz. *Lycium Malabariensis*, validioribus spinis, foliis magis mucronatis.



*Lycium Indicum* non spinosum, Majoranæ foliis, floribus plurimis ad nodos erumpentibus, cortice cinereo. *Canary-cheddy Malabarorum*.

*Lycii* similis *Frutex Sinensis*, Buxi foliis leviter ferratis, flosculis plurimis amentaceis.

Frutex est flore minimo amentaceo, in muscariis & spicis verticillatim disposito, calyce multifido, foliis subrotundis & lanceolatis, leviter ferratis, plerumque binis, & ramulis alternatim nascentibus, *Octobri* floret, *D. Cunningham*.

**L**ysimachia filiquosa minor, villosis foliis, flore purpureo, ex *Insula Cheusan*. Nostrati fortè sit villosior, alioquin haud differt.

*Lyfimachia rubra* non filiquosa, *C. B. P.* 246. *Lyfimachia purpurea* secunda sive minor *Clusii. Hist.* 2. fol. 52.

*Lyfimachia purpurea* adfinis minor, serrato folio tetraphyllos, è *Maderaspatan*.

*Lyfimachia spicata purpurea* affinis, *Saligneis* foliis è *Maderaspatan*.

*Lyfimachia spicata Ephemerum dicta* similis, *Planta Cheusanica* semper-virens.

*Lyfimachia Floridana* trinervis, folio minore brevi margine piloso.

*Lyfimachia*

*Lyfimachia trinervis Floridana*, angustissimo folio piloso, flore tetrapetalo rubro.

*Lyfimachia Chamænerio dictæ similis Floridana*, foliis nigris punctis notatis, capsulis carinatis in ramulorum cymis. An *Blattariæ* affinis *Virginiana*, foliis nigris punctis notatis, *Banisteri*.

*Lyfimachia Floridana* lutea minor, *Chamænerii* binatis foliis nigris punctis notatis, floribus parvis in spicam dispositis.

*Lyfimachia Floridana* lutea non papposa, *Clinopodii* foliis hirsutis, caule purpureo.

*Lyfimachia corniculata*, s. *Caryophylloides* non papposa, *Balsaminæ* fæminæ foliis, flore majore carneo *Carolinensis*.

*Lyfimachia Indica* *Carambu dicta*, *Saligneis* villosis foliis, fructu majore.

*Lyfimachia lutea corniculata*, *Hyssopifoliis Floridana*.

*Lyfimachia corniculata lutea minor*, *Hyperici* folio, caule rubro *Floridana*.

*Lyfimachia Floridana* non papposa, *Conyzæ Melitensis* retusis foliis facie, sive *Belvidere Italorum*.

*Lyfimachia corniculata lutea Floridana*, caule rubente, strictissimis foliis, floribus amplis umbellatis.

*Lyfimachia*



*Lyfimachia corniculata*, *Centaurii lutei* facie perfoliata.

*Lyfimachia lutea*, punctatis foliis, & floribus quaternis  
Cruciatae modo caulem ambientibus. *Anagallis lutea*  
*quadrifolia* *Almag. Bot. Mantiss.* 12. pl. ult. huic maxime  
accedere videtur, sed omnibus partibus minor est.

## M

M

*MACANDOU Javanensium Bontii*, *Cadapilava* *H. Malab. part.* 1. fig. 52. vid. inter  
*Arbores.*

M

*Alva Africana* frutescens, flore parvo carneo, un-  
guiculis atrorubentibus. *Malva Africana* frutes-  
cens, flore purpureo minore; *Volckamer Flor. Noriberg.*  
273.

*Malva Sicula*, flore minore purpureo, *Hort. du Boissiani.*

*Malva peregrina*, *Vitis folio pingui*, *H. du Boissian.*

*Malva Hispanica* minor incana, floribus cæruleis, apicibus  
petalorum profundè incis. *Malva*

*Malva Cheusanica*, cæruleis floribus, ad caulis intervalla  
semiverticillatim posit. *Malva*

*Malva Orientalis* *Platani occidentæ folio*, flore cæruleo.

Malus

Malus Arantia *utriusque Indiae*, fructu omnium maximo, & suavissimo, *Almag. Bot.* 239. & *Mantiss.* 125. An fortè Malus *Affyria* *Dodon. Latin.* 792. Malus *Adami* *C. B. P.* 437. Item Malus *Punica* fructu maximo, granis aureis *ejusd. C. B. P.* 438. Poma *Adami* *J. B. Hist. Pl. tom. 1. fol. 99.* ubi Icon habetur quâ omnes partes hujus Arboris, satis benè & elegantè expressit pictor : A Limonibus naturâ & viribus non multum differt, foliis Limonii, floribus Citrii, fructu Arantii, sed duplo triplovè majore. Hanc & plerique ad Medicam *Antiquorum* referunt, Pomum vero *Adami* dictum volunt, quod in superficie ceu infixorum dentium vestigia habere videatur, quâsi ab *Adamo* primo homine commorsum fuisset ; quo nomine & ab *Italīs* agnoscitur. An fortè Voutrimon *Flacurtii de Ins. Madagascar.*

Malus Limonia *Lentisci* foliis, nervorum alis in ambitu maximè crenatis, *Caute-vella Malabarorum.*

**M** Anghas *Orientalis*, foliis *Arealu* more cuspidatis. *Mela-mangomaram Malabarorum.*

Mangha sylvestrīs *Maderaspatana*, *Nerii* longioribus foliis, *Polly-manga Malabarorum.*

**M** Arrubium album rotundifolium majus, crispatis foliis *Æthiopicum*. An Pseudo-dictamnus *Africanus*, *Hederæ* terrestris folio *Oldenlandii* ; *Turnefort. Instit.* 188.

Marrubium nigrum *Siculum*, *Galeopsidi Anguillaræ* respondens, *Boccon Mus. part. 2. 151. tab. 114.* Pseudo-dictam-



nus *Hispanicus* amplissimo folio nigricante & villoso,  
*Turnefort. Inst. rei herb.* 188.

*Marrubium aquaticum Sinense*, *Ambrosiæ Mexiocanæ* foliis  
 inodoris.

Planta est verticillata, flore labiato, foliis ferratis oblon-  
 gis *Stachydis*, caule quadrato, *Sinice Tchü-sin* dicta.  
 In Hortis *Bonziorum* colitur. Ex Insulâ *Tow-whay-san*  
*Octobri* collecta est, *D. Cunningham.*

**M**atricaria flore pleno, *Tanaceti* crispi foliis elegan-  
 ter crispatis. *Matricaria* foliis elegantissimè cris-  
 pis, & petalis florum fistulosis, *Turnef. Inst. rei Herbariæ*  
 493.

*Matricaria Japonica* maxima, flore multiplici flavescente.  
*Shamunt y Malabarorum.*

*Matricaria Sinensis* minore flore, petalis & umbone ochro-  
 leucis.

**M**edica parvâ flore luteo *Mauritanica.*

*Medica pratensis* lutea, radice perenni, fructu racemoso  
 nigro (non ingrata sed) pergrata Jumentis, *Almag. Bot.*  
 243. pl. 8. Epithetum enim (non grata Jumentis) ma-  
 gis proprie attribueretur *Medicæ Arabicæ Camerarii* se-  
 quentibus in *Almagesto* enumeratæ; Hæc autem est per-  
 gratum pabulum, & a ruricolis Nostratibus pro fœno  
 sancto genuino habetur, & ab iis **Saint-Foyne** vulgo  
 nominatur, & in agris suis frequentius feritur.

Melampyro

**M**elampyro affinis *Maderaspatana*, *Perficariæ* foliis, spicâ sua squammulis foliaceis, ex viridi & argenteo mixtis conflatâ *Colcoragelly Malabarorum*. Hujus foliola lanceata, imbricatim posita, & veluti squammas efformantia, ex quibus componitur spica, sunt singula membranas latiuscula, argentei coloris & transluceida, elegantèr fimbriata. *Melilotus Sinensis* elatior, *Vulgari* haud absimilis.

*Meliloti* similis *Maderaspatana*, *Naur-velle Malabarorum* ;  
An fortè *Nirpulari H. Malab. part. 9. tab. 36.*

*Meliloto* affinis *Maderaspatana*, folliculis parvis ovatis, *Corry-parappœ Malabarorum*.

*Melissa Romana* hirsutior ; *Almag. Bot. 247.* Hæc est ut suspicatur *Cl. Rajus* quam *Jo. Bauhinus* memorat *Hist. lib. 28. cap. 42.* his verbis. Habemus quandam *Melissam* nigriorem & hirsutiorẽ, à nemine memoratam. Hic *Matthiolus* injustè ut aliàs arguitur à *Botanicis*, quasi ex unâ plantâ (*Meliss. vulgari*) duas faceret.

*Melissophyllum* parvum *Maderaspatanum*, spicâ florum præ-tenui, *Nandoo-cautrosy Malabarorum*.

*Melo* pusilla odorata, fructu pomiformi, cortice variegato, *Perfiâ*. In *Hort. D. Watsii Mercatoris Enfeldiæ* cultam conspeximus.

**M**entastrum niveum Alexiterium, oblongo folio citratum, ex *Provincia Floridana*.  
Mentastrum



*Mentastrum coronatum*, oblongis foliis *Malabaricum*, *Cárim-tumba*, H. *Malab. part. 10. tab. 93.* *Nepeta Malabarica*, folio latiore, flore cæruleo exalbido, *Commelin. Not. in loc.*

*Mentha Saxifraga angustiore folio spicata*, sapore acri fervido, *Mantiss. 129.* An fortè *Mentha sylvestris*, longioribus, nigrioribus, & minùs incanis foliis, C. B. P. *Mentastrum Campense*, & *Xuvolense*, *Lobel.*

*Mentha Cheusanensis* spicata, *Lyfimachia* foliis inodora.

*Mentha Cheusanensis* verticillata, longiore & acuminato folio, camphoram resapiens.

Planta est flore ex albo cærulescente, monopetalo, labiato, cujus labium superius parùm bifidum est; inferius verò profundè tripartitum, sic tamen secantur ambo, ut flos quadripartitus primo aspectu videatur, cum staminibus productioribus, apicibus subnigris rotundis donatis; Semina in capsulâ quæ calyx floris fuit reconduntur, verticillatim disponuntur, flores ad angulos foliorum, quæ nascuntur bina opposita, dentata, in acumen plerumquæ ad basin & summitatem terminantia, gustûs camphoram sapientis, & odoris *Menthæ*. *Septembri* floret. Alia est ejus species, gustûs magis acris, *Sinice* vocatur Pö-hö breviter pronuntiando vocem, ut apparèt ab accentu quo notatur, *D. Cunningham.*

*Menthæ folio* *Planta Sinensis*, suaveolens *Majoranæ* capitulis densioribus, spicâ florum quadrangulari.

*Mentha*

*Menthæ spicatæ* similis *Sinarum*, *Nepetæ* minoris folio, moschum olente, spicâ florum quaterno ordine foliaceâ, monocarpis.

Planta est flore cærulescente, villosa, monopetalo, personato, labio superiori integro, & parùm galeato, inferiori etiam integro & parùm pendulo, quatuor staminibus donato, (quarum duo ex superiori labio breviora, & proximiora, duo vero ex inferiori labio longiora, & distantiora proveniunt) flores in spicâ quadrangulari, unam partem respicientes nascuntur, quatuor plerumque adhærentes duplici seriei foliolorum subrotundorum caudatorum. Ex calyce minimo multifido prodit pistillum, quod abit in unicum semen in capsulâ quæ calyx floris fuit reconditum; Folia plerumque ex adverso bina, minora, & serrata, villosa, & suaveolentia, *Octobri* floret, *D. Cunningham*.

**M***Espilus Mariana*, lanatis foliis minutissimè crenatis, *Mantiss.* 130. In *Horti Regii Parisiens. Catalog.* habetur *Alni* effigie lanato folio minor *Indica*; An sit *Nostra*?

**M***Ercurialis cristatus* minor procumbens, ex *Insula Cheusan.*

*Mercurialis Africanus* dicoccos, folio *Violæ tricoloris*, *Cat. Pl. ad calcem Paradis. Batav.*

*Mercurialis* (fortè) s. *Phyllon marificum*, *Telephii* foliis *Malabaricum.* *Kodatsjori H. Malab. part. 9. tab. 67.* Por-



tulacæ foliis similis Planta, flore albo, galeato, & labiato, semine oblongo rotundo, ruffo, fusco colore. *Commelin.* *Not. in locum.* Hujus folia sunt alternatim posita.

Mercurialis cognata, Cynocrambe (fortè) genus *Malabariense*, Lauri densioribus, & acutioribus foliis. Kilcola Tsjetti H. *Malab. part. 10. tab. 57.*

**M**Espilus *Floridanus* Malicotoneæ foliis, floribus summo ramulo coacervatis.

Mespilus *Maderaspatanus*, subrotundis Pyri foliis, floribus spicatis. Wootta-cheddy *Malabarorum.* Hujus pictura exhibetur in *Phytograph. Tab. 364. Fig. 3.*

**M**Ethonicæ foliis in claviculam desinentibus, Planta *Maderaspatana*, Shevenar Corungo *Malabarorum.* An Panambœ H. *Malab. part. 7. tab. 53.* quæ pro genere Arundinis *Indicæ* volubilis C. B. P. haberi potest ex sententiâ *Commelin.* *Not. in loc. vid. inter Arundines.*

**M**illium *Indicum* hirsuto caule, semine aureo. Kurenpullu H. *Malab. part. 12. tab. 61.*

Milium *Indicum* arundinaceo caule, granis nigris, *Almag. Bot. 250.* An forte Milium illud quod suo tempore ex *Indiâ* in *Italiam* advectam scripsit *Plinius libr. 18. cap. 7.* nigrum colore, amplum grano, harundineum culmo, quodque adolescit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis.

Millefolium

Millefolium Camphoratum aureum, *Monomotapense*. *Mantiss.* 130. Tanacetum *Africanum* fruticans multiflorum, foliis Tanaceti decuplo minoribus, *Hort. Amst. fol.* 199.

Millenaria (fortè) *Sinarum*, s. Herba per mille annos durans. **Herb of a Thousand Years**, *Ogilveii. Chin. tom. 2. fol.* 681.

**M**imosa minor *Ceylanica* quadripennis per terram strata, vid. in *Mantiss.*

Mimosa *Maderaspatana* uliginosis locis nascens, parvis foliis, radice latius repente.

**M**organi *Syrorum* similis, Planta fruticosa, ex *Prom. Bonæ. Spei.*

Idem foliis multò minoribus ex eodem loco.

Morifolia arbor ex *Florida*, spinis brevibus sursum hamatis, ad longitudinem stipitum armatis. An Hura arbor, Baruce fructus è pluribus nucibus ferens, Quautlatlatzin (fortè) s. Arbor crepitans *Hernandez fol.* 88. *Nieremberg. fol.* 339. Hura *Americana* *Abutili Indici* folio, *H. Amst. part. alt.* 131. vid. *Nucicapularis Almag. Bot.* 266.

Morus alba foliis parvis elegantè incis, ex *Insula Bombay*, & *Terra Mariana*. An Morus fructu nigro minori, foliis elegantè laciniatis *Turnefort. Inst.* 589. Morus fæmina,



mina, laciniato folio minori, ac tenuiori tenacius hærente, fructu minore, minùsque sapore, *H. Cathol.*

*Morus nana Caroliniana*, arcuatis & versùs terram ramulis incurvis, fructu minore rubro. In *Horto D. Darby* cultam conspeximus.

**M**Uscus aureus capillaris minor *Malabaricus*, apiculis cernuis. *Puem-peda H. Malab. part. 12. tab. 37.*

*Muscus capillaceus faxatilis niger Nostratium.* S. *Muscus trichomelanos*, filamentis tenuissimis, è rimis faxorum dependentibus.

*Muscus Lichenoides*, capitulis & tubulis membranaceis, pediculo longiore insidentibus, quadripartito divis. *Angliæ nostræ Indigena* est.

*Muscus arboreus vulgari similis Maderaspatanus*, *Marra-pashy Malabarorum.*

*Muscus arboreus supinus marginibus pilosis*, *Raij. Hist. & Synops.*

*Muscus Lichenoides crustæ modo adnascens major cinereus*, ex *Florida.*

*Muscus coralloides montanus*, cum globulis parvis umbellatis nigris, è *Tingitaniâ.*

*Muscus coriaceus quercinus Hibernis Dake-leather* dictus. *Fungus coriaceus quercinus hæmatodes Breyn.* In *Hibernia*

*bernia* in fissuris *Quercuum putridarum* reperitur à D. *Sherard.*

*Musco-fungus pyxidatus muralis major, & rugosior.*

*Musco-fungus pyxidatus gracilior, & lævis, calycibus fer-*  
*ratis.*

*Muscus clavatus repens Floridanus, longioribus & tenuissi-*  
*mis foliis.*

*Muscus clavatus erectus crispatis foliolis, Spongiolæ imi-*  
*tamentum, ex Chinâ. Bellan-patsja H. Malab. part. 12.*  
*tab. 40.*

*Muscus clavatus Æthiopicus arborescens, foliis variè inflexis,*  
*feminibus Lithospermi.*

**M***Yagrûm peregrinum, capsulâ quadrangulari rugosâ,*  
*Hort. du Boissian.*

*Myrobalanus Citrina, Carcai Malabarorum Mantiss. 132.*  
*Pruna rectius appellari censet Garcias aromat. lib. 1. Idem*  
*Joh. Posthias Archiater Palatinus & Poeta egregius de*  
*Murobalanis his Versibus inculeat,*

*Quæ Græcis fuerat Glans unguentaria, monstrant*

*Scripta Dioscoridis ;*

*Sed verum nobis cupiens imponere nomen,*

*Indica Pruna vocet.*



Arbores singularum vulgò cognitarum præterquàm *Chebuleſium*, vidit & deſcripſit *Chryſtophorus Acoſta* lib. *aromat. cap. 20.* ſed & hanc *Cairi* à ſe conſpectam de-  
pingi curavit *Cl. Veſlingius* *Not. in Alp. de plant. Ægypt. 62.* Quas *Andreas Marinus* ſuis in *Ebn-Maſviam* *Ad-  
notationib.* tam *Chebuleſium* quam *Indarum* & *Citrina-  
rum* Arbores depinxit, fictitiæ an genuinæ ſint, non  
abſque cauſâ jam olim *Matthiolus* dubitavit, & Nobil-  
iſſimus quoque *Sebizius* in *Specul. Med. Pr. part. 1. ſect. 1. cap. 4.* ſuſpectas habuit; Nec illa quam *Bitu-  
rigibus* in *Gallia* hoc nomine ſibi oſenſam memoravit  
*Jo. Poſthius* apud *Cluſ. lib. 1. Hiſt. rarior. cap. 29.* aliud  
quam *Pruni* vulgaris genus quoddam erat. His ſex-  
tam ſpeciem hætenùs ignotam, figurâ planè rotundâ,  
nullis ſtriis aut incifuris notatam, nec purgandi facul-  
tate præditam, in *Indiâ* à ſe obſervatam, uſurpatam-  
que, primus addidit *Jacobus Bontius. de Medicin. In-  
dorum*; Quanquàm etiam in *Prodromo Hiſtor. General.  
Plant.* quam olim promiſerant *Jo. Baubinus* & *Jo.  
Henric. Cherlerus* lib. 2. p. 7. nominetur *Myrobalani*  
ſpecies nova, & in ipſâ *Hiſtoriâ* lib. 2. cap. 19. fuſius  
deſcribatur, è *Palæſtina* tamen, non *Sinis* accepta fu-  
it dono *Rauwolfij*; Fungoſa iſta ſubſtantia tuberibus  
ſimilis quæ *Myrobalani* citrinæ flores dicitur, *Carcai-  
po* à *Malabareis* nuncupatur. An *Gallaum* fungo quo-  
dammodo exprimens *J. B. tom. 1. lib. 7. fol. 83.* Hanc  
pingit *Hiſt. Lugd. fol. 9.* ſub nomine *Excrementi fun-  
gum* quodammodo exprimentis, Earundem diverſas  
formas pingit & *Tabernaemontanus. Icon. 1127.* ſub nu-  
meris 9, 10, 11, 12, 13, 14. inter *Gallarum* genera.  
Fortè *Galla umbilicata* *C. B. P. 422.*

*Myrtus Sinica*, latiore & crassiore folio, caule nodoso, ad cymum ramulorum flores emittens.

*Myrti aurantiæ foliis*, facie *Maderaspatana*, floribus ad foliorum ortus baccifera; *Vellacaumangerry-cheddy Malabarorum*.

*Myrtifolia Ind. Or.* fructu folliculaceo gemello, filiquas æmulante, pulpâ absque seminibus repleto: *Laurifoliæ* fructu parvo typhoide, fungoso, non papposo, gemello, *Almag. Botan.* fol. 211. pl. 5. hæud multum dispar.

N

**N** *Apifolia* planta *Mariana*. An *Sonchi* genus *Napifolia*, ex *Terrâ Mariana*.

**N** *Asturtium* *Cardamine* dictum *Pimpinellæ minoris* folio, *Mauritanicum*.

*Nasturtium aquaticum minus Cheusanense*, surrectum.

**N** *Europlatyceros Æthiopicus*, nervosis foliis, cornu cervinum referentibus.

**N** Il. s. *Anil sylvestre*, *Meliloti* facie triphyllos, filiquis (propendentibus,) *Cullara-Marungy Malabarorum*.



**N**inzin s. Ginseng radix genuina, *Ind. Or. Almag. fol.* 264. *Mantiss.* 135. *Phytograph. tab.* 101. Ad lineam 3. *Almag. lege.* Quum Ninzin *Pisonis* ab hac nostrâ plurimum differt. Ista fortè eadem est cum *Tatarica Caroli de Noyelle, &c.* Et post vocem Vescuntur, ad lineam 34. *Mantiss. adde* Ex foliis etiam *Silêstorum* quidam potus conficitur, satis id ex *Velschio* notum est; de *Vena Medinensi.* 189. Et *Tartari* foliorum in aquâ decoctum refrigeratum, vini instâr bibunt, quæ Sphondilio nostrati, s. Pastinacæ sativæ adeo assimilatur, ut in *Japonensi Terrâ* ipsa Pastinaca, magnæ sylvestris Ninzin nomen vulgò obtineat; Huic radici similitudinem quandam habere videtur, Illa quam *Hariot* describit appellatione *Habascon*, radix magnitudine ac figurâ Pastinacæ, quæ cum aliis coquitur. in *Descript. Virgin.* Huic quoque similis Radix ut existimo fuit *Chara*, quâ lacti admistâ *Cæsaris* milites inopiam levasse legimus. Nostra tamen an sit *Scandragora* *Σκλαροδης Rasæi &c.* vid. *Mantiss. ubi suprâ.* Et *fol.* 136. ad *lin.* 6. post *D. Marloë Obs. adde.* Nostra radix sicca, colore in album flavescente, Electri modo nitescat, translucens, duraturque ut cornu videri possit, quæ viva & suo natalis hærens solo, supra terram caput paululum surrigit, & ut quidam ex autopsiâ nobis seriò affirmârunt, priusquam folia profert noctu igneum quendam, & veluti scintillantem splendorem emittit; cujus beneficio à quærentibus posse inveniri, & effodi testatur *Cl. Rumphius* in *epist. ad Mentzelium*, ut monuit nos *Cl. Jo. Philip. Breynius* in *Dissertat. Botanic-Medic.* Adeò ut Vegetantis Naturæ species admiranda Noctiluca videatur, & Phyto-lampyrîda *Anglicè Glow-wort* dici mereatur. An fortè *Aglaophotis*,  
quam

quam inter Magicas herbas à *Democrito* proditas commemorat *Plinius*. Quæ admiratione hominum propter eximium colorem acceperit nomen, in marmoribus *Arabiae* nascentem *Persico* latere; Qua de causâ & *Marmoritin* vocari: Magos utique eâ uti, cum velint Deos evocare *Plin. lib. 24. cap. 17.* Effectu convenit, unde suspicio nobis subiit, fortassè aut *Illi* germanam, aut certè quandam ejus speciem esse. Item *Ælianus Hist. Animal. lib. 14. cap. 27.* de *Aglaophotide* terrestri hæc habet. *Cynospastus* herba, alio nomine *Aglaophotis* dicitur, Hæc per diem inter cæteras herbas (à quibus ne minimum quidem differt) delitescit, nec ullo modo agnoscitur, nocte verò stellæ instar lucens, & igneo splendore coruscans, facile in conspectum venit; Itaque signo ad radices ejus defixo discedunt, absque eo neque colorem ejus interdiu, neque speciem cognituri: Noctè jam exactâ, adventant & herbam ex signo agnoscunt. Sed quod sæpius moneo, suspicio tantum sit hoc, nullum ex tripode responsum. Superstitionem si demas *Nyctegreto* non ab similem plantam æstimarem, quam *Plinius* lucentem, ita (*lib. 21. cap. 11.*) persequitur; *Nyctegretum* inter pauca miratus est *Democritus*; coloris ignei, foliis *Spinæ*, nec à terrâ se attollentem, præcipuam in *Gedrosia* narrat, Erui post *Æoquinoctium Vernalis* radicitus, ficcarique ad *Lunam* triginta diebus, ita lucere noctibus. Magos, *Parthorumque* reges uti hæc herba ad Vota suscipienda, eandem vocari *Chenomychon*, quoniam anseres à primo conspectu ejus expavescant, ab aliis *Nyctilopa*, quoniam è longuiquo noctibus fulgeat. Ego & *Aproxin* vocari quandam stirpem similis effectus *Pythagoræ* notam lego, apud *Plinium. lib. 24. cap. 17.* An à nostrâ sit diversa necne, hæud constat. Ninzin nostra



Radix egregium extat *Aphrodisiacum*, & in libidine excitandâ adeo præstare creditur, ut *quibusdam* ansam præbuit suspicari, eandem esse herbam *Theophrasto* ex *India* allatam, cujus contactu libidinem durare septuagesimo coitu meminerit. Ad Venerem (inquit *Cl. Jo. Philip. Breynius Dissert. de radice Gin-sem*) magis quam ullum aliud Medicamentum, utrumque stimulat sexum. Apud *Joannem Leonem Africanum* admiranda quædam de radicis *Surnag* in *Atlantis* occidentalibus locis provenientis Viribus *Aphrodisiacis* referuntur, lib. 10. cap. ult. Hæc vero An illa sit herba de quâ *Theophrastus* agit, ignoro; cum ipse descriptionem nullam addit; Fit tamen ex dictis verisimile; Et nostram esse Radicem de quâ nunc agimus affirmari certò non potest, cum non rarò dissimiles, ejusdem, aut similis facultatis, stirpes inveniantur. Habent hodieque *Syri* (inquit *Hermolaus Barbarus in Corollar. de Satyrio.*) Herbam simili effectu *Bucheidemque* nominant & a virtute *Satyriasi Indicam* *Satyrium* quidam appellârunt; fortassè cum eâ cujus mentionem *Theophrastum* fecisse diximus eandem, radice candida, & durâ, commendatiore quo crassior & rugosior, & albior, podagris utili; Nec an Eadem sit cum nostrâ *Ninzin* satis constat, etiamsi radix sit ejusdem figuræ, & easdem effectus præstet: Quamobrem hæc ambigendo potius quam decernendo dicta sint; Et omnia relinquimus Veritatis Exquisitoribus diligentius pensitanda.

**N**Uci-prunifera Arbor spinosa, *Alhagi Maurorum* similis, *Moroccana*. *Ergen* arbor foliis *Myrti*, fructu *Pruni cerei*, osse *Amygdali* magnitudine, lineis binis distincto in *Præfat. part. 1. Indiæ Orient. vid. Almag. Bot. 306.* fortè idem cum *Ulmari* arbore *Pisonis. 174.* cujus fructus

fructus Camarinhas appellant *Lusitani*. Hujus fructus officulum est Fructus peregrinus 4. *Clusii exot. lib. 2. cap. 29.* quem ad unguentariæ nucis genus aliquod, referendum esse conſebat.

**N**ux Juglans *Virginiana* major, fructu rotundo, cortice craſſo, ſulcato, tuberculis exaſperato nigro, *Almag. Bot. 264.* Hujus arboris Nux cum exteriori craſſo & fungoſo putamine veſtita, Mali aurantiæ forma & magnitudine haud impar eſt.

Nux Juglans *Virginiana* nigra, nucamentis cremofynis, oblongo fructu, cortice duriore ſcabro, *Almag. Bot. 265.* Hujus Nux cum ſuo calloſo putamine tecta, Limoniam Malum figura æmulari, & magnitudine illam prorfus adæquare videtur.

Nux Juglans *Virginianæ* nigræ foliis, multiplici conjugatione coſtæ innascentibus, ſubrotundis, fructu vulgaris magnitudine pari, exteriori putamine veluti granulis aſperato, ſummo vertice umbilicato. Fructus fert ut plurimum copulatos.

Nux Juglans *Novæ Anglicana*, fructu oblongo parvo, Pruni alicujus Officuli æmulo, ſummis furculis racemofe, exteriori putamine viridi, viſcido, villoſo, & quaſi Baſſamum olente. Hujus Nux putamine obducta Cucumerem Aſininam figurâ & magnitudine æmulatur.

Nux Bengalensis Juglandifolia fructu orbiculari, *Almag. Bot. ibid.* & Nucifera arbor ſempervirens *Indiarum* Erythroxyli genus, *Mantiff. 136.* cujus fructui fortè referatur,



tur, Nux orbicularis penè formæ peregrina secunda *Clusii. lib. 2. cap. 13.* An Lignum quod ex Regina Saba *Salamoni* delatum cujus fit mentio in *Sacris* sub nomine *Almuggim*, aliàs *Algummim*, *Reg. 1. cap. 10. Chronic. 2. cap. 2. & cap. 9.* Hujus magnam quantitatem (ut fertur) secum attulit Magnus ille Dux *Onesicritus*, rediens ex Itinere suo *Insulæ Taprobanae*, sitæ ad mare *Indicum Orientale*, quod multum probavit *Alexander*: Nisi hæc omnia ad lignum rubrum *Sappan* dictum (i. e.) *Acaciam* gloriosam *Zeylanicam* tinctoriam amplioribus foliis spinosam; *Almag. Bot. 5.* potiori jure referenda putamus.

**N**ymphæa *Indica* crenata, flore pleno candido; *Almag. Botan. 267.* Lotus *Nilotica Theophrasti*, lib. 4. cap. 10. Lotus hæc planta est *Ægyptiaca*, è palustrium genere, (admodum diversa ab Arbore illa *Homerica* nimis hospitali) quæ recedentibus *Nili* riguis aquis abundè provenit; è cujus semine Fluvii *Accolæ* panis genus olim *Lotometram* dictum conficere solebant. *Ægyptii* Sirupo è Saccharo & aquâ *Nilotica*, succum filiquarum, & florum Loti admiscent, & exindè potum gratum, & refrigerantem, *Arabice Cherbet Nenuphar* dictum, conficiunt.

*Nymphæa lutea Floridana* mediæ magnitudinis, caule molli & fungoso.

*Nymphæa glandifera India* paludibus gaudens, foliis umbilicatis amplis, pediculis spinosis, flore roseo purpureo, *Almag. Bot. 267.* *Camolachachery Suratenfibus Indis Purches. lib. 4. Peregrinat. cap. 4. Sest. 5. fol. 429.* Hujus radix ab *Indigenis Insulæ Sti. Laurentii* Fontamou nuncupatur, *Flacurtio.* De hujus Flore vid. *Ogilv. Chin. tom.*

2. 570. & 571. Et hanc Nymphæam nostram glandiferam esse veram & genuinam Fabam Ægyptiam, nullus dubito, tam quadrant enim in eam *Theophrasti*, *Dioscoridis*, & *Plinii* descriptiones, ut nullus pictor festivius ac curiosius potuisse acu pingere. Hujus fructus maturus ad cibariorum epulas frequens fuit, indè peculiari nomine Ciborium dicebatur, cujus Etymon *Dioscorides* notat, ab omnibus notus, lib. 2. cap. 128. de Faba Ægyptiâ. quod etiam vasculum, & poculi genus esse, refert apud Antiquos *Athenæus*, lib. 3. cap. 1. & pro ponderis mensurâ ab ipsis Antiquioribus fuit accepta, & descripta ipsa Faba. Fortè idem est cum Nymphæa radice dulci ejusd. *Theophrasti*, lib. 9. cap. 13. quæ nasci in lacustribus solet, ut in *Orchomeniensi* agro & *Marathone* & in *Creta* Insula; *Bæoti Madonam* hanc appellant, fructumque mandunt; Gerit folia suprâ aquam ampla. De qua Nymphæa *Plinius* lib. 25. cap. 7. Laudatissima in *Orchomeno*, & *Marathone*, *Bæoti Madon* vocant, qui & semen edunt.

Idem flore albo, *Almag. ibid.* Hujus radix est *Lazelaze* *Flacurtii* de Insula *Madagascar*.

Nymphæa glandifera *Virginiana*, lactescens, minori umbilicato folio, pediculo leni flore amplo luteo pallescente; *Almag. Botan. ibid.* Tota planta lactescit, subcalida est, & ad gustum amarescit; Idèoque an fortè *Ausid. Avicennæ* lib. 2. tract. 2. cap. 35. Est enim species *Nenupharis Indi* cujus natura ut dixit filius *Mesiriohe*, *Mesue*, vel *Mesirgiue*, est calida & sicca. Et alibi viz. lib. 2. tract. 2. cap. 516. Radix quidem (inquit idem *Avicenna*) *Nenupharis Indi* existit in judicio *Mandragoræ*, & paulò post.



post. Et natura *Indi* (*Nenupharis*) est natura *Mandragoræ*. Hujus radix est *Talifouk* apud *Flacurtium* de *Ins. Madagasc.* de *Floribus* vid. *Ogilv.* ex *Nieubof Chin. tom. 1. fol. 250.* De hac ipsissima planta est (ut suspicamur) quæ *Josselinus* sub titulo *Nymphææ* floribus luteis, scribit in *Nov' Angl. rariorib. pag. 44.* Radices (inquit) *Indi* comedunt, haud facile coctiles, Jecusculum ovillum sapiunt, Feræ vulgò vocatæ ~~Boof-Deer~~ iis avidè vescuntur, quo tempore, illas dum sua capita sub aquis merguntur *Indi* interficiunt.

O



**CIMUM** odoratum vulgari simile, laxiore spicâ *Malabaricum.* *Nala-tirtava H. Malab. part. 10. tab. 85.*

*Ocimum* odoratum, calycibus florum magnis dependentibus *Maderaspatanum.*

*Ocimum* *Melissophyllum Sinicum*, foliis longis pediculis infidentibus, caule & spicâ quadrangulari, foliolis inter flores squaminatim emanantibus.

Planta est flore ex albo-purpurâscente monopetalo, labiato, cujus labium superius parùm surrectum est, subrotundum, vix bifidum, inferius vero tripartitum, medio lobo ampliori, & parùm excavato, puncto luteo notato: Ex calyce quadrifido, surgit pistillum staminibus brevibus stipatum, cui subsunt quatuor semina

femina rotunda fusca ; Flores nascuntur in spicis quadrangularibus, quæ componuntur ex quaterno ordine foliorum squammatim dispositorum, è quorum alis proveniunt flores : Folia adhærent cauli bina & opposita, superius magis, inferius minus villosa, & Urticæ instar serrata. *Octobri* floret, *D. Cunningham*.

*Ocimum Melissophyllum Sinicum*, foliis magis mucronatis, quadrato caule, spicâ laxâ canescente.

Planta est flore albo brevi, tubulato, vix labiato, labio superiore bifido, inferiore trifido, medio parùm latiore & productiore, puncto luteo notato, stamina quatuor apicibus fuscis donantur, extrâ florem prodeuntia : Calyx quinquepartitus profundè incisus, ad basin villosus, in quo quatuor reconduntur femina : Flores in caulium summitatibus, & foliorum alis spicatim nascuntur, & folia per conjugationes lævia, serrata, & Urticæ similia, caules vero quadrati, & parùm villosi, suavem *Menthæ* odorem omnia spirant. *Septembri* floret, *Sinice* *Sfu-tse* vocatur, *D. Cunningham*.

*Ocimum Indicum* odoratum, floribus & calyculis perexiguis, ad unam partem spectantibus.

**O**lea *Africana*, Ligustri firmiore & minore folio.

Olea *Maderaspatana*, pallidioribus foliis *Alaterni*.

Olea



*Olea Tingitana*, folio et fructu minimo pisi magnitudine nigro.

*Olea sylvestris*, s. *Ziziphus Ind. Or.* spinosa, Ilicis suberiferæ folio duro, subtus argenteo et punctato ex *Insula Cheusan*.

*Olea sylvestris* s. *Ziziphus Cheusanensis* non spinosa, folio subtus argenteo molli, fructu rotundo rubente, punctu-  
lis notato.

Frutex est flore argenteo punctato monopetalo infundibuliformi tubulato quadrifido, baccis rubentibus, rotundis, et punctatis, acidiusculis, et esculentis monopyrenis, *Sinenſibus* Paí-by dicta: Foliis subtus argenteis punctatis. Alia est ejus species fructu oblongo, fortè *Olea Bohemica* f. *Baubini*, D. *Cunningham*.

**O** *Nobrychis* major *Viciæ* foliis, spicâ florum ferrugineâ, *Mantiff.* 139. An *Onobrychis* flagellis longissimis, *Bocc. Mus.* 262. tab. 129. fortè etiâ *Onobrychis* foliis *Viciæ*, fructu echinato major caulescens, et ramosa, *Schal. Bot.* 244. *Onobrychis saxotilis*, foliis *Viciæ* angustioribus, et longioribus *Aquisextiensis*; *Instit. rei Herbar. Turnef.* 390.

*Onobrychis* minor monophyllos *Maderaspatana*, *Nummulariæ* folio, filiculis echinatis, ex foliorum alis spicatim erumpentibus.

*Onobrychis Cheusanensis*, *Trifolii bituminosi* foliis, alatis pediculis triphylla, filiquis asperiusculis.

Planta

Planta est triphylla, foliis oblongis acuminatis, filiquis articulatis, undulatis, asperiusculis, compressis et parum incurvis, semine fætis, in singulis articulis, unico oblongo et compresso; *Octobri* fructum perficit, *D. Cunningham.*

*Onobrychis Cheusanica*, floribus spicatis, foliis ternis, subrotundis amplioribus filicula lævi.

*Hedysarum triphyllum*, flore ex albo purpurascente, in spicis laxis ad caulium summitates nascente, filiquâ lævi et compressâ, falcatim unico internodio distincta, et filiculæ cuspide acuta unci instar reflexa. *Septembri* floret *D. Cunningham.*

*Onobrychis Sinica* trifoliata, filiculis hirsutis pubescentibus. *Hedysarum triphyllum* minus, filiculis hirsutis, articulatis, uno latere undulatis, altero rectis, in spicam congestis, feminibus reniformibus, *D. Cunningham.*

*Onobrychis Maderaspatana* frutescens, *Dorychnii* folio triphyllis, filiculis clypeatis lævibus, in spicam congestis. *Chevenar Weambõe Malabarorum.*

*Onobrychis Ind. Or.* triphyllis foliis subrotundis venosis, rigidis, averfâ parte tenui, viridique lanugine tectis, et *Veluti* instar mollibus, ex *Insula Crocodilorum.*

*Onobrychis Indica* triphyllis, foliis amplis mucronatis, filiquis parvis in spicam longam, ex alis inter bina foliola circinata arctè conniventia, reconditis. *Maddy-mal-maddy Malabarorum.*



*Onobrychis Indica* triphyllos spicata, amplissimis foliis, filiquis parvis inter bina foliola acuminata arctè conniventia, occultatis.

*Onobrychis parva* trifoliata ex Oris *Malabaricis*. An fortè Nir-pulari H. *Malab. part. 9. tab. 36.* ubi absque filiquis depingitur.

*Onobrychis Sinica*, Serpylli minimi hirsuti foliis triphylla, filiculis utrinque undulatis.

Planta est trifoliata, flore ex albo-cærulescente papilionaceo, filiquâ compressâ utrinque undulata, seminibus planis & reniformibus foeta. *Septembri* floret, D. *Cunningham.*

*Onobrychis Maderaspatana*, Mimosæ foliis, flore singulari amplissimo. Bolangomaram *Malabarorum.*

*Onobrychis Maderaspatana*, Mimosæ minimis foliis, filiquis ubi sunt semina protuberantibus.

**O**Rchis *Floridana*, flore aureo fimbriato, longis calcaribus donatis.

*Orchis minor Floridana*, floribus parvis in spicâ brevi rariè dispositis.

*Orchis Lilifolius minor.* *Floridanus*, floribus amœnè purpureis amplis.

Orchis

*Orchis bifolia humilis*, radice fibrosâ, ex *Provincia Floridana*. An fortè *Orchis bifoliata humilis* ex *Terra Mariana*, majori folio, & floribus purpureis magnis, *Mantiss.* 141.

*Orchis* s. *Monorchis pumila Floridana*, monophyllos, flosculis perexiguus albis. An *Monorchis Ophioglossoides unifolia Prussiaca Mentzelii. tab.* 5.

**O** *Rnithogalo affinis*, radice tuberosâ, *Cyclaminis* folio, *Capitis Bon. Spei Breyn. Cent.* 93.

*Ornithogalo affinis Africana*, fibrosâ radice, foliis Cæpe succulentis, floribus spicatis aureis.

*Ornithopodium Indicum*, argenteis foliis, flore purpureo, filiquâ singulari. *Colinil. H. Malab. part.* 1. *fol.* 103. Huic haud multum abfimile est. An *Orobus Hyscanensis*, filiquâ depressâ albâ flore obsoletè purpureo. *Falcata Rivini Cat. Pl. ad Append. Parad. Batav.*

**O** *Robanche species Æthiopica*, spicâ longissimâ.

*Orobanche*, s. *Leimodoron Æthiopicum*, ramoso caule, floribus amœnè purpureis.

**O** *Xys* s. *Trifolium acetosum corniculatum surrectum rubrum*, s. *Americanum Almag. Bot.* 274. *Trifolium acetosissimum rubrum*, caule parvo aphylo, foliis crassiss & succulentis *Banist. Cat. Mss.*



Oxys parva *Africana*, flore magno candicante, Lupini foliis argenteo sericeis; pro Geranio per erronem ponitur in *Mantiffa* fol. 90. pl. 2. cujus Icon habetur in *Phytographia* tab. 350.

Oxys *Africana* hirsutis latioribus foliis, flore magno purpureo.

Oxys *Africana* bulbosa, Dorychnii *Monspeliensium* parvis foliis, floribus purpureis amplis.

Oxys *Africana*, foliis tenuissimis flore amplo versicolore.

## P

**P**AI-PAROEÆ *Malabaricæ* similis, Frutex baccifer, Coryli parvis incanis foliis *Maderaspatanus*; Charectry-maram *Malabarorum*.

**P**Alma montana folio plicatili, flabelliformi maximo, *Almag. Bot.* 277. An Palma cum grandibus foliis, quæ preterebrata Vinum copiosum *Hispanico* simile profundit, quod Vinum Palmitem *Hollandi* vocant, *C. B. P.* 507.

*Palma Americana* spinosa Hayri dicta; *Almag. Bot.* 277. De hujus Arbore fuit illa spina, quam inter Exoticos fructus est *Guiana*, sibi allatos, *Garetus* noster ad *Clusum* mittebat, cujus mentionem facit, *Exot. lib.* 2. cap. 6.

Palma *Jamaicensis* non spinosa humilis, Bambu foliis Arundinum ritu incis, *Almag. Bot.* 277. & *Mantiss.* 145. Huic forte accedit Nuci *Indicæ* majori affinis, fructus *Brasilianus*, *C. B. P.* 510. Fructus exoticus quintus binis foraminibus, parte anteriore, *Clus. exot. lib. 2. cap.* 16.

Palma (fortè) cujus fructus Cola dicitur, Nuci pineæ majori similis, pulpâ quadruplici, intus colore rubicundo, Castaneæ formâ continens, *Pigafettæ. descript. regn. Cong. lib. 2. cap. 1. C. B. P.* 507. Idem fortè Arbori filiquosæ *Africanæ*, foliis ferè Pyri, semine fabaceo *ejusd. C. B. P.* 404. Phaseolus quintus peregrinus. s. Phaseolus *Coles Clusij. exot. lib. 3. cap. 7.* Huic filiquæ sunt candidæ Phaseolis longiores & majores, semina albo putamine ablato Minii colorem habent, & siccata in binas partes spontè finduntur. Non est Palma sed Phaseolis adfinis.

**P** Anax Costino simile, grandioribus foliis peregrinum, *Hort. du Boisian.*

**P** Apaver corniculatum acre, lacteo flore, filiquis & caule hirsutie asperatis, Vernymaram *Malabarorum.*

Papaver corniculatum acre, quinquefolium non spinosum, flore aureo *Maderaspatanum.*

Papaver corniculatum acre, diphyllon *Indicum*, angustiore folio, filiquis singularibus non radiatis. Cauca-pundooe *Malabarorum.*



Papaver corniculatum acre, Menthæ sativæ folio angustiore, monophyllon. Tenna-voulla *Malabarorum*.

Papaver corniculatum acre monophyllon, Valerianæ rubræ folio angustiore, ex Insula *Cheusan*.

Papaver corniculatum acre Unifolium, Atriplicis Polygoni foliis facie, *Maderaspatanum*.

**P**arietariæ affinis Chamædryos folio Herba *Sinica*, flosculis confertis circa caulem ex foliorum alis. Quam hoc modo describit D. *Cunningham*. Planta Chamædryos facie, flore apetalò, flores foliorum alis apprimuntur, vel brevibus pediculis insistant. Ante apertionem, flos apparet compressus caseoli instar, aut vasculi feminalis *Malvæ sylvestris*, flos apertus ostendit stamina brevissima, alba, extra calycem multifidum protensa, cui innascitur semen triangulare, *Septembri* floret, & in *Lapidicinis* provenit.

**P**edicularis *Cheusanensis*, Geranii moschati foliis, flore carneo.

Pediculari congener *Malabarica*, foliis oblongo-angustis, crassis ac pilosis, floribus amplis, calyce magno bullato, villis obsito exceptis. An fortè *Corosinam H. Malab. part. 9. tab. 68.*

**P**entaphylloides *Sinarum*, foliis subtus argenteis, flore aureo guttato.

Pericly-

**P**ericlymenum *Cheusanense* surrectum, Salicis folio non ferrato. Jasminum arboreum, foliis integris ex Insula *Cheusan* D. Cunningham.

Periclymenum erectum *Sinense*, Frangulæ foliis.

Periclymeni similis Myrtifolia arbor *Maderaspatensis*, Nir-Notsjil *Hort. Malab. part. 5. tab. 49.* Baccifera *Malabarica* fructu oblongo, tetracocco, calyculato, *Raij. Hist. Pl. 1573.* Changum-goupee *Malabarorum.* Malè dicitur Baccifera.

Periclymenum herbaceum *Cheusanense*, erectum, *Circææ* majoribus foliis, mollibus & incanis.

Periclymenum scandens hirsutum, subrotundis foliis *Sinicum*, flore minore.

Caprifolium flore ex albo flavescente monopetalo, tubulato, intus staminoso, in duo labia dehiscente, quorum superius quadrifidum, inferius linguiforme recurvum, flores prodeunt plerumque bini, ex foliorum alis, & caulium summitatibus, cum duobus foliolis, eorum calycibus adnexis, & brevi pediculo insistentes; Calyci autem vix conspicuo, insidet bacca rotundo semine foeta; Folia nascuntur bina, & opposita, Plantæ facies pilosa; *Septembri* floret. *Kin-in-hóa* (i. e.) Auroargenteus Flos *Sinice* vocatur; vid. *Cleyer Medicin. Sinic. Nov. 115.* D. Cunningham.



*Perficaria Cheusanica*, Lapathi foliis, calyce floris ex rubro purpureo, spica rigidâ, rara, & longiori. Linguâ Sinicâ Loön-King nuncupatur, D. Cunningham.

*Perficaria Cheusanica*, foliis subtus argenteis, spicâ florum elegantiori.

*Perficaria minor multicaulis*, ex Insula *Crocodilorum*.

*Perficaria Sinensis*, longioribus & angustis foliis, ex Insula *Cheusan*.

*Perficaria pusilla Sinarum*, angustissimis foliis, spicâ rara gracili.

**P**Halangium parvum *Maderaspatanum*, flore cœrulescente, Ella-cauny *Malabarorum*.

Phalangium ramosum, flore parvo longo gracili, ex Insula *Crocodilorum*.

Phalangium non ramosum, spicatum luteum, *Prom. Bon. Spei*. foliis magnis Cepæ pulposis. In *Hort. Bot. Societ. Pharmaceut. Londinens.* apud *Chelseiam* floribus superbientem, Observavimus Mense *Mai*o *Ann. Dom.* 1702. Idem est cum *Ornithogalo* affini, in præcedentibus recensitâ.

*Phaseolus Americanus* sesquimestris; *Barbadosibus* nostratibus, **The Six Weeks Pea** nuncupatur.

Phaseolus

*Phaseolus Barbadosis* fruticosus, Septennii durationis, *Almag. Bot.* 291. filiquâ longâ fimbriis quadripinnatis ornata, *Mantiss.* 149. Forte etiam *Phaseolus* amplo flore clypeato, filiquis nigris & angulosis *Plumier. Descript. de Plantes de l'Amerique. tab.* 108.

*Phaseolus Indicus* *Salviæ* foliis, floribus purpureis summo pediculo conglomeratis.

*Phaseolus Jamaicensis*, fabâ grandiori ex rubro-spadiceâ *Cordis D. Thomæ* ad instar ferè orbiculari, lobo velut in loculo intrâ lobum inclusa.

*Phaseolis accedens*, Coral arbor *Floridana* trifoliata, foliis subtus argenteâ lanugine villosis.

*Phaseolus Indicus*, Coral arboris folio, floribus purpureis spicatis, Chemb-paretty *Malabarorum*.

*Phaseolis accedenti* Coral arbori spinosæ trifoliatæ similis, *Maderaspatana*; Mullmorucomaram *Malabarorum*.

*Phaseolus Maderaspatanus*, foliis glabris trilobatis, flore majore flavescente, filiquâ singulari falcatâ. *Coly-Yeveray Malabarorum*.

*Phaseolo affinis Malabariensis* trifoliata, & quinquefoliata, filiquâ latâ membranaceâ brevi, unicum semen continente. *Tsjeria-Cametti H. Malab. part. 8. tab. 46. fol.* 89.



*Phaseolis accedens*, Coral arbor polyphyllos minor. *Collar-Orchy Malabarorum*.

*Phaseoli species Indiana* minor, filiquâ falcata, *Culloe Malabarorum*.

*Phaseolus Canadensis* minimus filiquam Terrâ condens *Almag. Bot.* 29. & *Mantiss.* 149. Voandre Flacurtii de *Ins. Madagasc.* Gabba (fortè) Incolis regni *Lovango Æthiopiæ inferioris apud Ogilv. Afric.* 449. An fortè Habhasis *Arabum*, *Léo. African.* lib. 5. Effoditur & hîc (circâ *Caperi* civitatem) quidam fabæ magnitudinis, qui sapore *Amygdalum* refert, hunc per universum *Tuneti* regnum notissimum, *Arabes* Habhasin appellant.

*Phaseolus minor Ind. Or.* floribus purpureis, spicatis, parvis. *Collar-curry Malabarorum*.

*Phaseolus Cheusanensis*, angustissimis lanceolatis foliis, ad intervalla confertis.

*Phaseolus minor Cheusanensis*, flore amplo luteo gemello.

*Phaseolus minor Caroliniensis*, mucronatis foliis, flore singulari peramœnè purpureo, *H. Compton*.

*Phaseolus minor Indianus*, Trifolii bituminosi faciem quodammodo exprimens, flosculis amœnè purpureis. *Neertuggry Malabarorum*.

*Phaseolus Cheusanensis* Trifolii bituminosi foliis, filiquis *Viciæ* gemellis.

Phaseo-

*Phaseolus minor Maderaspatanus*, Trifolii pratenfis albi folio, filiculis lentiformibus dispermis, *Outra-cheddy Malabarorum*.

*Phaseolus Indicus minor*, *Ciceris triphylli* foliis non crenatis. *Nary-tory Malabarorum*.

*Phaseolus unifolius Ind.* Ori. summo folio sinuato monopermis, foliis variè maculatis.

**P***Hillyrea Myrsinites Sinarum*.

*Phillyrea Hispanica*, *Nerii-foliis Turnefortii*, apud *Sherardinas*.

*Phillyreæ* (fortè) species altera *Myrtifolia*, ex Insulâ *Cheusan*.

*Phillyreæ angustifoliæ* facie, Frutex scandens *Malabaricus*.  
*Pan-Niere-cuddy Malabarorum*.

**P***Inguicula* s. *Viola palustris elatior*, flore magno carneo  
*Carolinienfis*.

*Pinus argentea Mauritanica*, officulo duro fusco, lituris spadicis variegato.

*Pinus Americana* quinis ex uno folliculo fetis, longis, tenuibus triquetris, ad unum angulum, per totam longitudinem minutissimis crenis asperatis. Hanc Arborem ex *Florida*, *Americæ septentrionalis* regione primò advectam esse,



esse, Hortique *Badmingtoniani* ad Arcem Celsissimæ *Ducissæ dotariæ de Beaufort* totius Occidentis *Angliæ* longè amœnissimi, & stirpibus peregrinæ elegantia ditissimi, inquilinam factam audiimus. An *Larix Americana*, foliis quinis ab eodem exortu, *Plumier. Turnefort. Inst.* 586.

**P**iper frutex *Americanum*, spicâ longâ gracili. *Almag. Bot.* Plantula peregrina *Clusij exot. lib. 4. cap. 11.* (sicut in *Almagesto*) ubi dicit, Ad cujus Plantæ genus hanc pusillam referre possem, prorsus ignorabam; Etenim nemo inficias ibit quam difficile sit de Plantis nunquam antea conspectis, eisque mutilis, & corruptis, certi quidpiam statuere.

**P**isum spontaneum maritimum *Anglicum*, *Park. Theatr. Bot.* Item Pisum aliud maritimum *Britanicum*, *eiusd. Park. ibid.* Hæc enim duo summâ ratione non separat *Cl. Rajus Synops.* 186.

Pisum sylvestre perenne, *C. B. P.* 343. Pisum sylvestre, *Clus. Hist. 2. fol. 229.* Pisum sylvestre *Pannonicum*, *Camerarii.*

**P**lanta *Maderaspatana*, longioribus angustis, mucronatis foliis binatis, ab invicem longiùs distantibus, seminibus parvis striatis summo caule in umbellam digestis. Pootumby *Malabarorum.*

Planta peculiaris longioribus foliis, Cépæ *Pancii* capitulis papposis, ex *Inf. Cheusan.*

Planta *Æthiopica*, alato caule fructum capsularem, grani triticei parvi æmulum, in spica longa spadicea proferens. An Euphrasie genus *Africanum*. Fortè Gramen triglochin *Æthiopicum Breynii*.

Planta fruticosa Thymi angustioribus glabris foliis, ad alternos nodos confertissimis. Marum tenuifolium Thymi facie *Hispanicum*, Boccon. *Mus. Tab. 13* quoad picturam, huic nostræ multum assimilatur. Eadem latioribus hirsutis foliis. Utraque ex *Ind. Orientali*.

Planta *Africana* frutescens, Portulacæ foliis, Morgsani *Syrorum* ex brevi pediculo binis, *vid. Morgsani Syrorum* similis.

Eadem minor & angustioribus foliis.

Eadem minima & angustissimis foliis *Prom. Bon. Spei*.

Planta *Maderaspatana*, Halicacabi *Indici J. Bauhino* foliis, capitulis magnis Stæchadis *Arabicæ* paribus, ex sinu foliorum prodeuntibus, *vid. inter Anomalas*.

Planta baccifera Virgæ aureæ latioribus foliis, fructu ad exortum foliorum in spicam racemoso.

Planta perexigua spicata, viridi folio tenui, uno latere profundius dentato. In *Horto Uvedalens.* apud *Enfeldiam* ex seminibus natam invenimus; An de censu Euphrasiatum est, usquedum hæsitamus. Fortè *Valerianella Africana* foliis angustis, flore albo non maculato, *H. Amst. part. alt. fol. 218*.



Planta *Cheusanica* tenerifolia, nudicaulis triphylla, fructum ovatum acrem, nucleo haud abfimilem ferens gemellam, alterum summo caule ad sedem foliorum, alterum propè radicem, ad terræ superficiem cauli appressum. Planta est triphylla unicaulis, spithami plerumque longitudine, fructum fert absque flore unicum, in caulis summitate, ovatum, nucleo similem, membranâ tenui inclusum, acrem radicis Ari gustum referentem, & alterum ejusmodi fructum cauli propè radicem, ad terræ superficiem appressum. Mense *Octobri* 1702. collegit *D. Cunninghamus*.

Planta *Sinensis* convolvulacea, floribus papilionaceis cæruleis, ex *Inf. Crocodilorum*.

Planta capreolata scandens *Sinica*, foliis parvis Vitigineis. An *Vitis* viniferæ species sylvestris.

Planta *Sinica*, umbilicatis subrotundis foliis, scandens cum capreolis.

*Plantago* *Lagopoides* quinquenervia caulescens; *Mantiss.* 152. An *Plantago* angustifolia fruticans, *C. B. P. Clus. Cur. poster. Park. Theatr.* Nascitur ad ripas fluminum in *Hispaniâ*. *Boël.* *Plantago* angustifolia fruticans, cujus spicæ admodum breves, insupèr molles, nascitur ad ripas fluminum in *Hispaniâ*, ubi eam *Gulielmus Boelius* observavit *Cur. posterior.* 34.

*Plantago* nostras latifolia minor incana, trinervis. Invenit *D. Rand.* An *Plantago* trinervia, latifolia, minor, incana, *Hispanica*, *Barrelieri* inter *Icones* apud *Turnesfort. Inst.* 127.  
 Planta-

Plantaginis facie *Ind. Or.* Verbasculi parvo folio, spicâ pediculo squammato Cupressi foliorum æmulo infidente, nunc unicâ, nunc gemellâ. Nella-Carumbee *Malabarorum*.

Plantago aquatica minor, Ranunculi flammei majoris folio, nostras.

Plantago aquatica angustifoliâ, ex *Provincia Floridana*.

Plantago aquatica, amplissimo folio *Floridana*.

**P**olium *Hispanicum*, angustiori folio procumbens, flore albo polyanthos. An Polium montanum supinum alterum, *C. B. P.* 221. Polium sextum albo flore, *Clusij* Hist. 362. Polium candidum tenellum tomentosum, flore albo, *J. B. tom.* 3. 300.

**P**olygala major floribunda, ex *Territorio Maderâspatan*. Colla-rota *Malabarorum*.

Polygala *Tituanensis* aphyllas, Genisto-Spartii æmula, flore amplo cæruleo.

Polygala *Floridana* lutea, floribus in globosum capitulum congestis.

Polygonatum *Floridanum*, non ramosum monanthemum, radice fibrosâ, flore hexapetalo amplo.

**P**olygonum vulgato simile *Maderâspatanum*. Courundera *Malabarorum*.

Polygonum



Polygonum Nostratis longiore folio, ex Insula *Cheusan*.

Polygonum (inquit Præfatus D. *Cunningham*) est calyce multifido, campaniformi, marginibus rubro-purpureis, semine triquetro, foliis oblongis & angustis.

Polygonum erectum *Carolinense* lignosum, foliis binatis vulgatissimi foliorum æmulis.

Polygonum fericeum ramosius *Indicum*, foliolis Gallii instar caulem cingentibus, *Mantiss.* 154. Huic fortè spectat Katu-Mailosina H. *Malab. part.* 10. *tab.* 66. Et Pee-coipa ejusd. H. *Malab. part.* 10. *tab.* 67. proximè præcedenti in *Mantissa*.

**P**ortulacæ affinis *Americana* tricapsularis erecta, flore albo pediculis angulosis *Phytograph. tab.* 105. *fig.* 6. Portulaca *Americana* s. *Curassavica* latifolia erecta, floribus albis P. B. P. Chamæcistus *Americanus* Portulacæ folio, flore albo *Paradis. Bat.* 121. Telephium *Americanum* Portulacæ folio *Turnefort. Inst. Rei herbar.* 248. Ex hujus capsulâ tripartitò divisa, semina per maturitatem impetu diffiliunt, nescio quo casu in *Almagesto* nostro hæc fuit omissa.

Portulaca *Curassavica* procumbens, Capparidis folio, flore muscoso, capsulâ bifurcatâ *Parad. Bat.* 213.

**P**otamodendron Arbor *Ripariensis* s. Amnicola *Barbadosibus River Tree*, nuncupata.

Potamo-

Potamogeiton lucidum, Lapathi foliis longissimis fluviatile nostras. An fortè hoc sit Patamogeiton aquis immersum, folio pellucido, lato oblongo, acuto, *Raij. Synops. 1. 61.*

Potamogeiton alterum nostras, longis & obtusis splendentibus foliis, minutissimè crenatis.

Potamogeiton fluviatile, gramineis foliis longissimis nostras. An Alga fluviatilis graminea, longissimò folio, *Turnefort. Inst. 569.*

Potamogeiton *Maderaspatanum*, Plantaginis aquaticæ folio minore denso. *Cuttee-Calangöe Malabarorum.*

Potamogeiton angustis splendentibus crispatis foliis, è *Maderaspatán.* *Ella-pashu Malabarorum.*

Potamogeiton *Orientale* fluitans, ferratis foliis plurimis ad genicula stellatim ambientibus, summo ramulo densius stipatis; Vellum-pausia *Sinensibus* dictum, & Vellum-palha *Malabareis.*

Potamogeito affinis, Equiseti facie *τριχοφύλλοι.* Equisetum palustre ramosum, aquis immersum, s. Millefolium aquaticum equiseti folium, *Raij. Cat. Cantab.* Millefolium aquaticum cornutum, *J. Baubini ejusd. Raij, Cat. Plant. Angliæ* sed perperam.

Potamogeito affinis, Equiseti facie tricophyllos minor. Hoc *Cl. Rajus* suspicatur idem esse illi à *D. Sherard* observato, Insulæ *Jerseia* in Piscinis *Philippi Carteret Militis*, sub hoc titulo. Equisetum sub aqua repens ad genicula



polypermion *Synops. Stirp. Brit.* 280. Fortè *Millefolium aquaticum cornutum minus*, *C. B. P. Append.* 516.

*Potamogeto* affinis *tricophyllos*, flosculis ad foliorum nodos. *Millefolium aquaticum minus*, *J. B. tom.* 3. 783. *Park. Theatr.* *Millefolium aquaticum*, flosculis ad foliorum nodos, *C. B. P.* *Myriophyllum aquaticum minus*, *Gerard. fol.* 828.

**P**runifera *Elæagni* foliis, Yang-muy *Sinice* dicta, fructu hispido fraga redolente, In Vino destillato toto anno conservant.

Prunifera *Floridana*, *Chamænerii* foliis, subtùs glaucis, fructu Olivari, officulo *Colopodii* formâ striato; **Wild Olive** (i. e.) *Olea sylvestris Nostratibus* dicta.

Prunifera arbor *Sinensis*, cujus fructus *Mugiuli Indigenis* nuncupatur. **Fair-Thomas Plumme**, *Ogilv. Chin. tom.* 2. fol. 681.

*Prunus Cheusanica*, *Atriplicis* folio, floribus urceolatis, ad stipitem aggregatis. An *Prunus Javanica*, *Atriplicis* folio *Commelin.* cujus *Icon* habetur in *Phytograph. nostra. tab.* 218. *fig.* 2.

*Prunus parvus Sinarum*, Officulo foraminulis veluti perforato.

Pruno affinis *Maderaspatana*, *Tiliæ* ferè foliis, fructu racemoso pyriformi, officulo trinucleo. *Tsjem-tani*, *H. Malab. part.* 4. *tab.* 11.

*Pulegium*

**P**ulegium magnum Ocymi folio *Tituanicum*. An Pulegium latifolium maximum *Hispanicum*, *Flor. Bat.* 54.

Pulegii species erecto caule, latifolia, incana, & hirsuta; *Wheeleri* in *Itinerar.*

Pulegii vulgaris specie *Sinarum*, Herba capsularis, pluribus capsulis ad nodos junctis, caule quadrangulari, ad singulos angulos ferris minutissimis asperato. *Toundchedde*, à *Sinis* nominatur.

**P**U-Walli H. *Malab. part.* 7. *tab.* 42. similis Arbor *Maderaspata*, *Ella-cooty-maram Malabarorum*.

**P**Yracanthæ similis *Sinarum*, foliis rotundioribus, subtus leviter tomentosis, ex *Insula Crocodilorum*.

**P**yrola nostrati similis, ferratis foliis, Planta *Sinica* baccata, monopylene. Planta est humilis (ad pedalem altitudinem vix affurgens,) non ramosa, foliis *Cerasi* ferratis, ex adverso binis, fructu rubro, rotundo caudato, semine unico fæta, calyce quintifido, Mense *Novembri* maturescit, *D. Cunningham*.

**P**yrola frutescens *Arbuti* folio, ex *Insula Cheusanensi*.

**P**yrola *Mariana*, subrotundo *Ulmi* folio glabro, *Hort. Uvedal.*

**P**yrola affinis *Malabarica*, foliis subrotundis baccas ferens. *Karinti-Kali H. Malab. part.* 10. *tab.* 21. *Quadri-*



## Q

Q

UADRIFOLIUM amplum *Maderaspatanum*, guttis sanguineis aspersum, Arry *Malabarorum*.

Q

Uercus julo rotundo, echinato calyce, glande minore lævi, D. *Cunningham*, ex *Insula Cheusanensi*.

*Quercus* (fortè) *Cheusanensis*, *Castaneæ* minoris folio, pronâ parte candicante.

*Quercus Cheusanensis*, minoribus, & ferratis, foliis hirsutis.

*Quercus Mariana*, muricatis *Castaneæ* foliis subtùs villosis.

*Quercus Virginiana*, *Salicis* longiore folio, fructu minimo.

## R

R

ANUNCULO adfinis Umbelliferis accedens maxima, è *Maderaspatán*. Vellary *Malabarorum*.

R Apunculus *Floridanus*, *Trixaginis Apulæ* ferè foliis, (quando siccatus) ex omni parte nigricans.

Rapun-

*Rapunculus galeatus* Glaustifolio, floribus exalbidis, *Floridanus*.

*Rapunculus galeatus* ex *Florida*, *Lyfimachia* filiquosæ glabræ angustifoliæ facie, floribus purpureis parvis.

*Rapunculus parvus* *Sinensis*, *Valerianellæ* foliis, ex *Ins. Cheusan*.

*Rapuntii* genus *Malabaricum*, *Lychnidis* latiore folio molli, & incano, flore versicolore. An *Katu-Karivi*, *Hort. Malab. part. 9. tab. 44.*

*Rapuntii* species *Cheusanica*, *Sideritidis* folio, flore cæruleo galeato.

*Rapuntium* minimum *Cheusanense*, *Campanulæ* autumnalis folio & facie.

Planta est flore Lini cæruleo, pentapetaloide, cujus pistillum abit in vasculum tricapsulare Campaniforme, calyci quinquefolio inclusum, foliis angustis Lini similibus. *Septembri* floret, *D. Cunningham*.

*Rapuntii* parvi species altera, *Cheusanensis*.

Planta est flore ex carneo-purpurascente, monopetalo, anomalo, tubulato, & sulcato, in quinque partes linguiformes digitatim diviso, (extremis longioribus & angustioribus) vagina ad basim trifida, excipit & amplectitur pistillum ad summitatem; pistillo subest vasculum feminale teres, seminibus foetum exiguis, &

A a a

rotundis,



roquindis, ex calyce quintifido factum. Folia fert Al-  
fines ferè similia, alternatim posita, & levitè serrata ;  
Septembri floret, D. Cunningham.

**R** Apuntio an Thymelææ adfinis, Galliilutei foliis, flo-  
ribus cæruleis, ex Promontorio Bon. Spei.

**R** Eseda Luteola dicta *Cretensis* ; Luteola *Cretica* C. B. P.  
100. Struthium legitimum Dioscoridis, quæ *χουέρν*  
in tota *Græcia* appellatur, quâ *Fullones* in tingendo se-  
rico luteo utuntur, *Hon. Belli* epist. 2. ad *Clus.* 2. 11

**R** Hamni Cathartici similis, longioribus foliis, fructu ni-  
gro dipyreno, ex Insulâ *Tow-whey-san*.

Frutex est baccâ nigrâ rorundâ, umbone notata, succo  
lutescente (instâr Rhamni Cathartici) prædita, & du-  
obus feminibus callosis, gibbosis, & quasi cylindra-  
ceis fæta ; foliis oblongis & obtusis, levitè ferratis,  
spinis rarioribus, & longioribus donatur, *Octobri* fru-  
ctus maturefcit.

Rhamno nostrati cathartico accedens minor, ex Insulâ  
*Cheusan*.

Rhamnus *Cheusanensis*, cortice albo, Berberidis instâr fru-  
ctum ferens calyculatum.

Frutex est spinosus, flore superius purpureo parùm stri-  
ato, inferius ex viridi & albo purpurascente, hypo-  
crateriformi, multifido, quinquepartito, plerumquè,  
tubo breviori, ex cujus calyce quadrifido, surgunt sta-  
mina

mina alba, cum pistillo, quod abit in fructum mollem, s. baccam rubram ovatam polypyrenam; Fruticis facies Berberi quodammodo assimilatur; *Septembri* floret, *D. Cunningham.*

*Rhamnus Pruni sylvestris folio Cheusanensis*, corticè querno, Validioribus foliatis spinis, baccâ minore nigrâ, unicum intus semen claudente.

*Rhamnus Maderaspatanus*, *Acaciæ Robini* foliis, spinis longis foliosis, corticè candicante.

*Rhamnus Sinenfis*, flore cæruleo, ex *Oris* maritimis *Insulæ Cheusan.*

**R**hus *Canadense*, folio longiori utrinque glabro, *Turnef. Instit. 611.*

*Rhus quinquefolia Sinarum* lactescens, rachi medio alata, foliis molli hirsutie pubescentibus.

*Rhus Floridana* minor, *Clematis Conterrheni* foliis, subtus lanatis.

*Rhus Africanum* trifoliatum, latis *Rosmarini* foliis, subtus argenteis.

*Rhus Africanum*, strictissimis foliis trifoliatum, ex *Prom. Bon. Spei.*

**R**icini fructu parvo, fruticosa *Curassavica*, folio *Phylli*, *Almag. 321.* An *Tithymalus Americanus* incanus *Halimi*



limi folio *Breyn. Prodr.* 2. 99. Hujus pictura exstat in *Phytogr. tab.* 107. *fig.* 6.

**R**icinus *Maderaspatanus*, Marrubii albi foliis, fructu tricoeco inter folia disperso.

*Ricinus Ind. Or.* foliis quinquifidis, subtus lanugine obfistis; *Parety-maram Malabarorum.*

*Ricinus Brasiliensis*, Geranii nodosi folio trifido; inter *Collectaneas D. Dampier.*

*Ricinus Maderaspatanus*, folio trifido, & quinquifido mollioribus spinulis, cum suis globulis coronatis, in ambitu ornato, *Cautamanuck Malabarorum.*

*Ricinus Saniculæ*, s. *Diapensiæ* folio *Sinarum*, ex *Insula Cheusan.*

*Ricophoræ* (fortè) genus *Bryoniæ* nigræ foliis heptaneuros; nervis per longitudinem profundius punctatis, plurimis conspicuis venis in parallelos venustè transcurrentibus: *Payn-cheddy Malabarorum.* An *Kattu-Kelengu*, *H. Malab. part. 7. tab. 37.* *Batataæ* species.

*Ricophora Maderaspatana* triphyllos, oblongo fructu triangulari. Fortè *Tsjagera-Nuren* *H. Malab. part. 7. tab. 31.*

**R**orella parva *Cheusanensis*, Nostrati similis, caule folioso.

Rorella

*Rorella Malabarica*, pennatis angustioribus foliis, folioso caule, floribus pentapetalis carneis. *Araka-puda H. Malab. part. 10. tab. 20.* Alfinè *Myriophylli folio, flore carneo, Commelini. Not. in locum.*

**R**osa sylvestris *Cheusanica*, foliis subtùs incanis, floribus purpureis parvis.

*Rosa alba Cheusanensis*, foliorum marginibus, & rachi medio spinosis.

**R**ubia *Sinica*, fructu majore nigro, foliis partim Gallii stellatis, partim Smilacis asperæ effigie scabris.

*Rubia quadrifolia aspera*, baccis numerosis singularibus, nigris, succulentis, semine unico, rotundo, umbilicato foëtis. *Novembri collecta, D. Cunningham.*

*Rubia tetraphyllos erecta*, minor, aspera, *Virginienfis, Almag. Bot. 324. pl. 3.* An fortè *Rubia Virginea, C. B. P. 334. Chappawer*, radices tenues, quibus ad tincturas untur, in *Descript. Virgin.*

*Rubia diphyllous Americana*, *Molluginis montanæ* similis, floribunda, ex *Provincia Floridanâ.*

*Rubia (forte) bifolia Ind. Or.* Amomi *Plinii Quorundam* facie, caule quadrangulari. *Nella-Veamböe Malabarorum.*

*Rubia spicata*, frequentioribus & longioribus spicis compressis, radice irrepente. An *Rubia spicata repens, Bot.*



*Monsp.* 225. Rubeola supina, spicâ longissimâ, *Turnef.*  
*Inst.* 130.

*Rubus Sinensis*, non spinosus triphyllos, floribus parvis rubro purpureis.

*Rubus parvus spinosus*, foliis subtus canescentibus, *Sinarum*, ex *Insula Emoyaca*.

*Rubus odoratus*, foliis *Spinachia* modo incis, ex *Florida*.

*Rubus odoratus minimus Sinensis*, cauliculis asperis pro-volutis.

S

**S**AGITTARIA *Floridana* magis nervosa, longioribus alis, & foliis multò magis acuminatis.

**S**ALICIS capreae foliis mucronatis, Arbuscula *Cheusanensis*.

*Salicis folliculiferæ tetraphyllos*, *Almag.* similis, Arbor *Cheusanica* polyphyllos.

*Salicis pumilæ* brevi angustoque folio incano similis, Arbuscula baccifera ex *Indiâ Orientali*.

*Salvia incana*, alatis foliis *Mauritanica*.

Sambucus

**S** Ambucus humilior frutescens, foliis elegantè variegatis, *H. Edinburg. Turnef. Inst.* 606.

**S** Anicula s. Cortusa *Floridana*, Tarraconis folio punctato, floribus spicatis rubris.

Sanicula alpina *Africana*, angustiore folio, guttato flore luteo; Sanicula angustifolia autumnalis, flore luteo guttato, foliolis florum magis acuminatis, *Breyn. Cent.* 106. Geum angustifolium autumnale, flore luteo guttato; *Turnefort. Inst.* 252.

**S** Antalum nigrum, Davadarre *Malabarorum*, *Almag. Bot. Mantiff.* 167. Arbor *Indica* Pruni sylvestris folio, Corni maris fructu longiore, cujus lignum Santalum nigrum ab *Indigenis* habetur. Fortè Anonymos quarta *Theophrasti* s. Arbor *Indiæ* Or. cui fructus similis Cornis *Theophr.* lib. 4. cap. 5. Orula fortè *Cingalensium* *Knocci Hist. Zeylan.* fol. 17. Aut fortè Ambelos *Eorundem ejusd.* fol. 14.

**S** Atureia hirsuta, foliolis pronâ parte amœnè purpureis; An Satureiâ hirsuta imis subrotundis Clinopodii *Austriacæ* foliis, subtus purpureis, ex *Sicilia Mantiff.* 167.

**S** Cabiosa dendroides, Sambac *Arabum* foliis ex adverso binis, è *Maderaspatan.*

Scabiosa Fraxinellæ foliis, *Turnefort. Inst. append.* 666.

Scabiosa glabra, foliis rigidis atrovirentibus minùs dissectis, medio rachi candidissimo. Scabiosa glabra, foliis rigidis



rigidis viridibus *J. B. tom. 3. fol. 8.* quam à Scabiosa montanâ *calidarum Regionum* nunc seponere velim, quamvis aliter semel putavimus, vid. *Almag. Bot. 334. pl. 6.*

Scabiosis affinis Planta *Malabarica*, foliis crispis. Pee-tardavel *H. Malab. part. 9. tab. 79.*

Scabiosa montana media, globoso flore, foliis gramineis. Caryophyllus montanus flore globoso medius; *Schol. Bot. 117.* In *Horto Medicinæ Chelseiano* sæpè observavimus, & frequentius flore albo.

Scabiosa graminifolia nudicaulis, capitulis argenteis; five Statice minima elatior *Sinarum*.

Scabiosa graminifolia, s. Statice minima argentea, foliis & cauliculis hirsutis pubescentibus, ex *Provincia Floridanâ*. Huc etiam spectare videtur Tsjeru-Katsjillett-pullu *H. Malab. part. 12. tab. 68.*

**S**Corodoniæ affinis *Sinarum*, floribus ex albo-purpurascens, spicâ florum compactiore.

Planta est flore ex albo purpurascens, monopetalò, labiato, cujus stamina labii superioris locum occupant, labium vero inferius in quinque partes dividitur, mediâ ampliori, & cochlearis ad instar excavatâ, cæteris in floris cervice, e regione positis; in calyce campaniformi quintifido, reconduntur quatuor semina subrotunda, & oblonga, caulis quadratus. *Septembri* floret, *D. Cunningham.*

Scorpioides

Scorpioides monophyllos *Maderaspatana* minor, Nummulariæ foliis rigidioribus, filiquis nodosis, Perimballary *Malabarorum*.

Scorpioides pinguifolium triphyllon, corniculis articulatis intortis, *Almag. Bot.* 337. pl. 6. *Telephium Cæsalpino*, cui & *Herba amoris*, quia Puellæ in amore explorando, foliis hujus utuntur: Si enim folia cum salivâ applicata cutim tantum rubefaciant, Amoris putant indicium; Si pustulas excitant, Odii: Hunc usum *Antiqui Poetæ* *Telephio* tradidêrunt, ut apud *Theocritum* videre est, qui ob id *Philtrum* quoque appellârunt.

Scorpioides minor, *Telephii Imperati* foliis, ex *Insula Chev-san*.

Scorpioides *Maderaspatana*, singulari *Perficariæ* pusillæ folio, filiquis erectis nodosis; *Worrill-tamary Malabarorum*.

Scorpioides *Maderaspatana*, Graminis *Leucanthemi* foliis, filiquis nodosis.

Scorpioidi affinis, angustioribus foliis, flore luteo *Maderaspatana*. *Nir-murri* (forsan) *Hort. Malab. part. 9. tab. 32.*

Scorzonera *Lybica*, Auriculæ *Ursifolia* humilis, flore purpurascente.

**S**Crophularia major, caulibus, foliis, & floribus viridibus; *Raii. Synops.* 161.



*Scrophularia Saxatilis lucida, Laferpitii Massiliensium* foliis, *Boccon. Mus. part. 2. 166. Scrophularia Laferpitii foliis ejusd. Tab. 117.*

*Scrophularia minor Sinica, Betonicæ subrotundis foliis.*

*Scrophularia peregrina, Agrimonix foliorum æmula, Hort. Badmingtonii.*

*Scrophularia palustris non fætida, s. aquatica minor, C. B. P. Betonicæ aquaticæ species minor; Lobel. Observ.*

*Scrophulariæ affinis, Sideritidis folio Malabarica, caule fistuloso striato, floribus parvis, plurimis ad nodos cauli arctè adhærentibus; An Pola-Tsjira, H. Malab. part. 9. tab. 78. Sideriti folio Indica palustris, caule fistuloso, flore pentapetalo subviridi, semine minutissimo, ex albo rufescente Commelin. Not. in locum.*

**S***cutellaria Melissæ retusis foliis, Americana. An Cassida peregrina Melissæ foliis; Turnefort. Instit. append. 675.*

*Scutellaria Melissæ folio maximo, ex Provinciâ Mariana.*

*Scutellaria Americana, Lyfimachix spicatæ cæruleæ foliis, floribus dilutè purpureis.*

*Scutellaria Sinensis, Teucrii crassioribus hirsutis foliis, floribus purpureis.*

*Scutellaria Sinica, Betonicæ folio, floribus albis.*

*Scutellaria*

Scutellaria cærulea, Majoranæ foliis *Americana*, *Almag. Bot.* 338. Cassida *Canadensis* pumila, Origani folio *Saraceni Turnefort. Instit. append.* 675.

Scutellaria *Virginiana*, Hyssopifolio, flore candidissimo.

Scutellaria palustris minor-ramosissima, flore albo *Floridana*.

Scutellariæ accedens *Cheusanensis*, Ocymi folio, flore ex albo purpurascente, semine singulari.

Planta est flore intus purpureo, exterius ex albo purpurascente, monopetalo, infundibuliformi, quadrifido leviter inciso, tubulato, tubo incurvo; Ex calyce brevi multifido, surgit pistillum, quod deinde abit, in semen unicum ovatum, extra calycem prominens. Folia nascuntur bina, oblonga, acuminata, supernè lætè, infernè pallidè viridia, & flores in spicis. *Septembri, & Octobri* floret, *D. Cunningham*.

**S**Ebestenæ foliis Arbor *Africana*, fructibus Guaiaci æmulis, dipyrenis, ad ramulos plurimis simul pronascentibus, ex *Prom. Bon. Spei. vid. inter Lycia fol.* 137.

**S**Ecuridaca Sesban *Ægyptiacæ* similis, sed diversa, ex *Ind. Orient. Chamby-maram Malabarorum*.

**S**Edum *Africanum*, lato & oblongo folio virente, ex inferiore foliorum planitie radículas emittens, *Hort. Comptonian*.

Sedum



*Sedum Anthylloides Capense*, flosculis in spicas graciles, verticillatim positis, *H. Uvedal.*

*Sedum minus*, s. *Vermicularis Moroccana* flore rubescente.

**S**ena spuria arborescens, *Sesban Ægyptiacæ* foliis, sanguineis virgulis ex *Insulâ Cheusân.*

*Sena spuria Sinensis*, *Mimosæ* foliis minimis, floribus parvis magis expansis, ex *Insula Crocodilorum.*

**S**enecio hirsutus, *C. B. P.* 131. *Senecionis* species *Dodonæi*, *Hist. Lugd.* 577. *Erigeron tomentosum*, & *Senecio incana*, *Lobelii Icon.* Hæc autem (nostrâ sententiâ) ad *Hieraciorum* classẽ rectius accenseri meretur.

*Senecio Maderaspatanus*, *Sinapeôs* folio, floribus parvis luteis. *Erratauney-pundöoe Malabarorum.*

*Senecio Maderaspatana*, villosa *Botryos* folio.

**S**erratula *Virginiana* minor, angustifolia mollis, flore purpureo. Eadem (fortè) quæ à *Breynio* exhibetur in *Prodromo.* 2.

**S**esamoides parvum, *Acini* foliis, hirsuto caule *Maderaspatanum*, *Nella-crandy Malabarorum.*

*Sesamoides parvum Serpylli* facie *Maderaspatanum*, *Elacorandee-curry Malabarorum.*

*Seseli pratense* maximum *Floridanum.*

Sideritis

**S**ideritis montana parvo varioque flore; *C. B. Pich. 33.*  
*Sideritis montana, parvo flore nigro purpureo; Fab.*  
*Column. 196. cum fig.*

*Sideritis incano Oleæ folio, flosculis ex incarnato candi-*  
*cantibus, Montis Libani, Volck. Flor. Noriberg. 383. cum*  
*fig. 353.*

*Sideritis Maderaspata, Nepetæ alpinæ minoris folio ma-*  
*gis villoso. An Eadem quæ habetur in Phytograph. no-*  
*strâ. Tab. 315. fig. 2.*

**S**iler Aquilegiæ foliis angustioribus, ex Maris Sinarum  
*unâ de Insulis Crocodilorum.*

**S**inapi luteum querno folio, filiquâ hirsutâ, *Hort. Catho-*  
*lic. Volck. Flor. Noriberg. 385. cum pictura 355.*

**S**isarum *Acadiense angustifolium; Hort. Comptoniani.*

**S**isynrichium *Malabaricum, foliis longissimis striatis, ra-*  
*dice glandulosâ; floribus flavis, maculis rubris ele-*  
*gantèr notatis. Belam-canda-shularmani. H. Malab. part.*  
*11. tab. 37.*

**S**ium minimum umbellatum, *Sinicum.*

Plantâ est flore albo rosaceo, umbellato, ex quinque pe-  
 talis subrotundis, in orbem positis, & totidem stami-  
 nibus



nibus composito, calyci infidentibus, qui deinde abit in fructum, ex duobus seminibus compositum, subrotundis, crassis, hinc gibbis & profundè striatis, inde vero planis: Folia fert breviora & crassa, costæ per conjugationes innascentia, ultimo impari claudente trifido, & pinnis aliquando trifidis: Ex Insula *Pum-si-san*, allata est, ubi Mense *Octobri* floret, D. *Cunningham*.

**S**milax *Floridana*, viticulis spinosis, Judaicæ arboris folio maximo, cordato leni. An Smilax aspera, s. spinosa latifolia retusa, folii peripheria leni, *Hort. Catholic. Turnefort. Inst.* 564.

Smilax viticulis asperis, leni Canellæ folio, ex *Indiâ Orientali*, Kari-Vilandi *Hort. Malab. part. 7. tab. 31.*

Smilacis asperæ s. Zarzæ latis Canellæ foliis, Planta *Orientalis* claviculata, pediculis foliorum vaginatis, Cynorrhodi fructu, profundius striato, Mali punici adinstar, tubulo brevi pergamenò, summâ parte coronato; Ex Insulâ *Crocodilorum*.

**S**olanum bacciferum vulgari simile maxim. *Sirinamense* P. B. P. è seminibus ex *Carolinâ* allatis natum. Vidimus in *Horto Medicinæ Chelseiano*.

Solanum bacciferum *Ind. Or.* non spinosum, Amomi *Plinii* folio, floribus cæruleis ramosiùs expansis, five paniculatis.

Solanum spinosum sinuatis foliis *Floridanum*, Borrâginis flore lacteo, Juripeba mas *Pisonis.* 181.

Solanum

*Solanum quadrifolium Nov'anglicanum*, flore lacteo poly-  
coccon. *Josselin de Nov. Angliæ rarioribus.* pag. 80. ubi  
Icon exhibetur.

*Solanum mordens Sinicum*, *Berberidis* fructu singulari, vi-  
ticulis suis spinis longioribus aculeatum.

*Solanum exoticum* arborescens *Bliti* foliis pallescentibus,  
calathoidæ flore ex luteo pallescente, summis oris in pro-  
fundas lacinias incis, caulibus, & pediculis foliorum  
tomentosis in *Hort. Episc. Fulhamiæ* cultum conspexi-  
mus.

**S**onchus *Floridanus*, *Aceris* majoris folio, in ambitu  
mitioribus spinulis armatus.

*Sonchus* mitior, *Saniculæ* nostratis folio, *Floridanus*.

*Sonchus lævis Floridanus*, *Ari*, vel *Sagittariæ* foliis sinua-  
tis.

*Sonchus Floridanus* triphyllos, *Napi* foliorum æmulis.

*Sonchus Floridanus*, *Sassafras* in modum trilobatis foliis.

*Sonchus Nov'anglicanus*, *Chenopodii* foliis, radice bulbosa,  
sanguineo caule, floribus ramosis candidissimis. Hujus  
*Icones* duæ habentur apud *Rariora Nov'anglican.* à *Jo.*  
*Josselin.* edit. *Idiomate Anglicano.* pag. 76, & 77. *Sonchus*  
*Marianus*, *Atriplicis* folio, *Mantiss. nostræ* 175. Huic  
propiùs accedit.



**S** Orbi sylvestris pinnatis angustioribus, & mucronatis foliis, Arbutula *Cheusanensis*.

Sorbi legitimæ foliis, Arbor *Cheusanica*, medio rachi appendicibus aucto.

Sorbi species *Sinarum*, Cucurbitiferæ *Panaroma* dictæ (*Almag. Bot.*) foliis; aculeato caudice scandens, fructum ferrens in corymbis.

Frutex est spinosus scandens, baccis rubris, rotundis in umbellæ modum dispositis, in pulpâ subrubrâ, succulentâ, gustûs parùm acidî, & adstringentis, latent semina ossea plura, inæqualis figuræ, plerumque verò hinc plana indè convexa, circà axem seu placentam disposita. Folia Polygonati ferè, sed circinata rotunditatis, singulas foliorum & ramorum divaricantium insertiones duo amplectuntur foliola, in cirros plerumque terminantia. *Novembri* fructum perficit, D. *Cunningham*.

**S** Peculum Veneris *Thracicum*, flore amplissimo *Doctõris Covel. Raij. Cat. Stirp. Oriental. pag. 19. vid. Campanula.*

**S** Piræa *Hispanica*, Hyperici folio crenato, *Turnesfort. Inst. 618.*

*Spiræa* altera humilior, floribus expansis, folio subrotundo sinuato *Styriaca*, *Boccon. Mus. Pl. 137. tab. 96.*

*Spiræa*

*Spiræa* durior, folio angustiore tridentato, floribus expansis, (i. e.) *Spiræa* tertia durior angustifolia, floribus albis expansis *Boccon. Mus. Plant.* 137.

*Spirææ* (forte) genus *Africanum*, Serpylli hirsutis foliis fruticosum, floribus albis umbellatis, de hac *Vid. Mantiss.* 171. pl. 2.

**S** *Pongia* globosa, s. *Sphæra* marina Algæ pomum dicta, è clavatis Spongiolis ad centrum terminantibus, coagmentata.

**S** *Tachys* fruticans latifolia tomentosa, flore ferrugineo, *Barrelier. Phlomis Hispanica*, fruticosa candidissima, flore ferrugineo, *Turnefort. Instit.* 178.

*Stachys Indica* Marrubii craffioribus, & villosis foliis. *Pamarreta Malabarorum.*

*Stachys Americana* minor fætida, quernis foliis, sanguineis maculis insignita.

*Stachys Maderaspatana*, ferratis *Salviæ* foliis magis mucronatis, *Etta-Pamuretty Malabarorum.*

*Stachys Lychnitis*, angustissimo *Salviæ* folio crenato, spica longâ gracili, compactiore, è Regione *Maderaspatan.*

*Stachys minor Tituanica*, *Polii Veneti* foliorum æmula.

*Stachys minor Sideritidis* viridibus foliis, longiori pediculo villoso innixis, spicâ florum breviori, è *Maderaspatan.*

E e e

Symphy-



**S**ymphytum minimum Acini foliis bijugis *Maderapanum*, *Almag. Bot.* 358. An *Symphytum petræum* verum *Dioscoridis*, lib. 4. cap. 8. quam eandem esse cum *Sucuto Avicennæ* lib. 2. cap. 642. deprehendit *Mainardus Epistolar.* lib. 6. epist. 6. Hujus *Icon* habetur in *Phytograph.* tab. 227. fig. 7.

*Symphytum* s. *Pulmonaria* non maculosa, foliis glabris *Americana*, flore patulo cæruleo, *Almag. Bot.* 359. cujus *Icon* exhibetur *Phytograph.* tab. 227. fig. 6. An forsitan *Symphytum*, s. *Pulmonaria alpina*, foliis mollibus subrotundis, flore cæruleo, *H. R. P. Schol. Botan.* 107.

**S**yringa baccifera, Myrti subrotundis foliis, floribus albis gemellis, ex *Provincia Floridana*. Idem fortè cum *Syringâ bacciferâ* scandente *Myrtifoliâ*, s. *Pecala Malabarorum*, in *Mantissa nostrâ* recensita, fol. 176. aut certè istius proximè cognata. *Hæc enim se erigere nobis videtur.*

## T

**T**amarindus monococcus minor pruniformis, *Carandas Garcia*, *Mantissæ.* 177. Celebre in *Indiâ & Chinâ* est *Soy* nobile garum, & longè melioris notæ quam *Ceshup* perhibetur: *I. Slede Navarcha* in locis istis diù versatus *Henrico Mundy de Gulæ irritamentis* Cl. Authori retulit se a *Sinensibus & Japonensibus* accepisse, eam excellentiam huic liquamini admistione fructûs cujusdam fabæ similis, nimirum propter saporis acumen conciliari.

*Biocre.*

*Biochrestolog.* 297. Quære An forte horum sit fructuum pulpa farinacea; Idem forte cum *Musteran* & *Ova Eufitana* *Brasiliensium*, quorum meminit *Dampier*, *Kol.* 13. 71. Et licet *Dampier* hos fructus illic non viderit ipse, sed ex *Hiberni* cujusdam apud *Sinum Omnium Sanctorum Brasiliæ* degentis descriptione habuit, Illos tamen in *Achem* urbe *Insulæ Sumatræ*, *Indiæ Orientalis*, se & contempnissse, & comedisse suspicabatur.

*Tamariscus Ericoides*, foliis incanis *Æthiopica*, spicâ florum longâ spadiceâ.

**T**Elephii legitimi quodammodo similis, *Herba Madagascariensis*, galeato & labiato, parvo flore candicante, in foliorum alis. *Kodatsjari* (forte) *H. Malab. part.* 9. *tab.* 67. *Portulacæ* foliis similis planta, flore albo galeato, & labiato, semine oblongo, rotundo, ruffo, fusco colore, *Commelin. Not. in locum.*

**T**erebinthus peregrina, fructu minore & cæruleo eduli, *C. B. P.* 400. *Terebinthus Indica*, fructu parvo ad cæruleum accedente, *J. B. tom.* 1. 278. *Terebinthi* alterum genus *Rauwolfia*, *Clusij Hist. Plant.* 16.

**T**Etraglottis baccifera *Sinarum*, s. *Lingularia arbor Sinenfis*, Gossipii quinquifidi amplioribus foliis, quatuor ligulas foliaceas, longo pedunculo ex alis insidentes, pro floribus ferens, è ligularum margine baccifera. *Ou-tom-chu Sinarum Pere le Compte de China* 161. ubi videsis descriptionem.



*Tetrapteris Frutex Africanus*, Linariæ folio crassiore, fructu quadripinnato, s. quaternis membranaceis extantibus alis, donato. *Tetragonocarpus Africana* fruticans, foliis longis & angustis, *H. Amst. part. alt. fig. 103.*

**T** *Eucrium Cheusanicum*, folio molli, & incano, floribus cæruleis.

Planta est flore cæruleo, monopetalo, labiato, cujus labium superius parum fornicatum est, surrectum, & fimbriatum; inferius vero trifidum: Ex calyce quintifido surgit pistillum, quod deinde abit in quatuor semina, triangularia, fusca, in capsulâ quæ calyx floris fuit recondita. Flores fert in umbellâ quasi dispositos, & folia serrata, subrotunda, & oblonga, mollia & incana. *Novembri* floret; Ex *Insula Pù-tò* delata, *D. Cunningham.*

**T** *Hlaspi allium redolens* *Morîs. Hist. Oxon. part. 2. fol. 297.* *Scorodonthlaspi Ulyssis Aldroandi J. B. tom. 2. fol. 932.*

*Thlaspi montanum luteum, J. B. tom. 2. 928.* *Leucoium (fortè) luteum montanum supinum, Ponæ ejusd. ibid.*

*Thlaspi fruticosum, Leucoii folio latifolium; C. P. prodr. 49.*

*Thlaspi Leucoii folio fruticosum, ex Sicilia.*

*Thlaspi*

*Thlaspi Barbadesium* frutescens, filiquâ hastatâ. An *Thlaspi montanum album*, filiquâ hastatâ, acuto *Globulariæ folio*, *Boccon. Mus. Tab. 64.*

*Thlaspi biscutatum Anchusæ foliis*, *Boccon. Mus. 167.*

*Thlaspi biscutellatum luteum*, *Anchusæ folio*, *ejusd. tab.*

122. *Thlaspidium Anchusæ folio*, *Turnef. Inst. 215.*

*Thlaspi parvum Halimi angusto argenteo folio*, *Boccon. Mus. tab. 39.* *Alyssum minus*, *Halimi argenteo angusto folio*, *Turnef. Inst. 217.*

**T***Hymelæa Africana*, *Ericæ foliis cauli appressis*, fructum aviculæ capitulum cum suo rostello exprimentem, sparsim inter ramulos proferens; Eadem est *Thymelæa illi*, quæ exhibetur in *Phytographia nostra*, *tab. 228. fig. 9.*

*Thymelæa tomentosa*, *foliis Sedi minoris*, *C. B. P. 463.* *Sanamunda tertia*, *Clus. Hist. Erica Alexandrina Lobelio. Tabern. Sesamoides parvum Dalechampii*, *Sanamunda tertia Clusii*, *Jo. Bauh. tom. 1. 595.*

*Thymum capitatum Camphoratæ foliis Mauritanicum.*

*Thymum minus capitatum Fessanum*, *Chamæcyparissi foliis brevibus*, *hirsutie villosâ fimbriatis*, è *Montibus Fossan.*

**T***ithymalus Amygdaloides Floridana*, *foliis brevioribus glabris.*



*Tithymalus*, five *Esula* exigua procumbens, lanceatis foliis, *Floridanus*.

*Tithymalus* parvus, *Coridis* folio *Maderaspatanus*.

*Tithymali* s. *Peplios* species *Ind. Or.* *Paasha-cheddy Malabarorum*.

*Tithymalus* parvus *Indiæ Orientalis*, *Herniariæ* foliis, s. *Chamæsyce Indica* erecta, ramulis & foliolis confertissimis. *Collar-pawly Malabarorum*.

*Tithymalus betryoides* minor erectus, *Ind. Or.* *Culla-pawly Malabarorum*.

*Tithymali betryoides* Planta similis, crispatis foliis tricapsularis, ex *Sinâ*.

*Tithymali* facie Planta *Æthiopica*, brevibus ferratis foliis ad caulem imbricatis, flosculis plurimas in spicas summo ramulo dispositis. *Valerianoides* fortè *Æthiopicum*.

*Tithymalus Sinicus* palustris, fruticosi similis, ex *Insula Cheusân*.

*Tithymalus aizoides* *Ind. Or.* spinosis extuberantiis, *Apo-cyni fritillarici* in modum, sed rariis dentatus. *Collemolian* *Malabarorum*. An fortè *Esula Indica Bontii*, *Hist. Nat. & Med. lib. 6. fol. 153.*

*Tithymalus aizoides Africanus*, simplici squammato caule, *Casp. Commelin. Prælud. Bot. 57. fig. 7.*

*Tithymalus*

*Tithymalus aizoides Africanus*, simplici squammato caule, Chamænerii folio, *ejusd.* 58. *fig.* 8. Neutra harum spinis est imbuta.

**T***Ordylum minus Siculum*, *Hort. du Boissiani.*

**T***riapteris Sinarum* Hederæ folio scandens, fructu minore.

*Triapteris Sinarum* Tiliæ ferè foliis alternis, ad genicula fructum fasciculatim proferens, monospermum, semine triquetro nitente nigro.

Frutex est foliis subrotundis, in acumen desinentibus alternatim positis, vasculo seminali cordiformi ex tribus alis membranaceis, sagittæ extremitatis instar conflato, in medio semen unicum nigrum, lucidum, triquetrum, & carinatum includente, caulis nodosus & fistulosus, semina ad caulium nodos, in fasciculis proveniunt. *Augusto* floret, *D. Cunningham.*

**T***ribulus terrestris Indiæ Orientalis*, foliis Viciæ subrotundis, & villosis, *Turnef. Inst.* 266.

*Tricapularis Africana* Planta peculiaris ; An fortè Gladioli species, fructu, & modo crescendi *Lachrymam Jobi* æmulans.

*Trifolium lagopoides Sinicum*, incanis Bituminosi foliis, summo caule, spicâ brevi interruptâ, cum glomerulis ad foliorum alas sessilibus. *Trifolium Lagopoides majus*  
*Nov'anglicorum*



*Nov'anglicanum* foliis subtus argenteis ; capitulo breviori rigido ; Huic in omnibus ferè quadrat.

*Trifolium Lotoides* non ramosum, angustiore *Bituminosi* folio, flore parvo luteo singulari, *Mantiss.* 184. An *Oxys lutea frutescens, Americana*, *Trifolii bituminosi* facie *Plumier. Instit. rei herbar. Turnefort. pag. 89.*

*Trifolium Sinenſe* frutex *Polemonii* foliis, flosculis parvis coccineis, secundùm caulem ex calycibus spinosis emergentibus.

*Trifolium Africanum* fruticosum, *Dorychnii* facie argenteum, floribus velut in capitulum congestis.

*Trifolium tenuifolium* argenteum, ex Provinciâ *Floridanâ*.

*Trifolium angustifolium* fætidum, foliis longis pedunculis infidentibus, cauliculis albis sericeis, ex *Horto Badingtoniano*.

*Trifolium filiquosum* *Loto* affine *Sinarum*, angustis oblongis foliis, ad foliorum ortum, filiquâ singulari brevi.

*Trifolium surrectum Sinicum*, cordatis foliis glabris, floribus plerumque gemellis.

*Trifolium filiquosum rotundifolium* glabrum. floribus ex albo & purpureo mixtum, *Serra-faulula Malabarorum*. *Trifolium* quod habetur *Phytograph. tab. 231. fig. 4.* huic plantæ ( excepto floris colore ) propiùs accedit, immò quoque

quoque illa procumbere videtur, hæc autem se sursum erigit.

*Trifolium spicatum, Thlaspeôs filiculis Nov'eboracense.*

*Trifolium maritimum monocarpon, filiculis parvis lenticularibus confertim nascentibus ex Insula Tow-whey-san sub Imperio Sinarum.*

Planta est maritima trifolia, flore papilionaceo, filiculis lenticularibus caudatis, unicum semen lentis figurâ continentibus, & in calyce multifido non reconditis. Ex *Insula Tow-whey-san*. delata *Octobri 20. 1702. D. Cunningham.*

*Trifolium monocarpon Meliloti affine, folliculis parvis compressis, Cheusanense.*

*Trifolium fructu racemoso, Boccon. Mus. Plant. 163. Est species Meliloti, ad Hispanicam propius accedens, pericarpio candidiore.*

*Trifolium lupulinum flore purpureo, Cupani. Hort. Catholic.*

**T***Riticum peregrinum, locustis echinatis, Hort. Uvedalens.*

**T***Rochelea Vegetabilis, Cochlydii adinstar spiralis, The Screw-pulley ex India Orientali.*



**T**Sjana-Kua *H. Malab. part. 11. tab. 8.* cujus radix Costus *Arabicus Dioscoridis.* à *Commelino* putata. Costi quoddam genus, *Zinziberi* radici simile, *Clusij. Not. in Garciam.*

**T**ulipifera arbor *Floridana*, *Lauri* longè amplioribus splendentibus, & densioribus foliis, flore majore albo.

*Tulipifera* arbor *Musæ* foliorum ferè magnitudine *Floridana*, fragrantissimo flore immaculato; *Borachera* (fortè) *Hispanorum*, s. Arbor inebrians *Nierembergii. Hist. Nat. lib. 14. cap. 110.* Arbes admirandi floris, excedit *Lilium*, æquat albedine, folia Arboris magna, quorum succus haustus aquâ oppidò inebriat. *ibid.*

**T**urritis *Leucoii* folio *Turnesfort. Inst. 224.* Eruca sylvestris latifolia, folio integro, flore luteo minore, *Morison. Hist. 2.* Myagrum quintum *Lobelio, Tabern. Icon. 866.* Myagro affinis planta, filiquis longis, *J. B. Pin. 2. 894.*

## V

**V**ADÆ-KODI, *H. Malab. part. 9. tab. 42.* similis, *Maderaspatana*, & fortè Idem. *Cara-Nuchel Malabarorum.* *Perficaria Malabarica*, flore galeato & labiato monospermon, *Commelin. Not. in locum.*

**V**aleriana palustris major, profunde laciniata, *C. B. Prodr.* An *Valeriana* quædam annua *Raji. Cat. Stirpium Exterar. 281.* ex *Sicilia.*

Valeria-

Valerianella *Curassavica*, semine aspero viscoso, *Almag. Bot.* 381. Mocaretty, & aliquando Mokretta *Malabarorum*. Taludama *H. Malab. part. 7. tab. 56.* Thalicetro affinis *Indica*, Alni folio semine striato, aspero *Breyn. Prodr. 2.* 99. An Valerianella folio subrotundo, flore purpureo, semine oblongo striato, aspero, *Cat. Jamaic. 91.*

Valerianella *Africana* fruticans, foliis longis & angustissimis, *H. Amst. part. alt. 219. fig. 110.*

Valerianoides *Thymelææ* adfines, Rosmarini foliis minoribus sursum inflexis, flosculis summo caule umbellatis, *Prom. Bon. Spei.*

Valerianoides *Æthiopicum*, *Thymelææ* adfines umbellatum, Pyllyi crebrioribus crenatis foliis, ramosissimum.

**V**erbascum foliis incanis maximum, odoratum *Meridionalium*, floribus luteis arcte cauli adherentibus, & foliis multis angustis inter flores emanantibus *Morif. Hist. 2.*

Verbascum minus laciniatum, flore purpureo è *Maderaspatán.* Neer-roattee *Malabarorum.*

Verbasci similis quadrato caule *Cheusanensis*, minore folio acuminato, subtus molli tomento candicante.

Verbenæ foliis Planta *Æthiopica* quadricapsularis, flore calathoidæ cæruleo; *Mantiss. 186.* An Verbenæ *Peruviana*, quæ *Hispanicæ* similis ex *Monarde*, *Lugdunensis* refert. *C. B. P. 269.*

Verbena



Verbena nodiflora minima *Maderaspatana*.

Veronica *Cheusanensis* Grossulariæ folio, flore amplo purpureo. Alyſſo montano *Dioscoridis Fabio Columnâ* proximè accedit.

**V**iburnum *Americanum* aureum, foliis hirsutis Scabris, *Hort. Reg. Hampton*.

Viburnum *Cheusanense*, Ulmi folio, subtus parum incano.

Frutex est baccifer foliis subrotundis, ad summitatem latioribus, in acumen brevius desinentibus, serratis, & infernè parum incanis, ex adverso binis, baccâ rubrâ, rotundâ, acidâ & astringente, semine unico subrotundo, duro & compresso foeta, racematim congesta, *Octobri* matureſcit fructus, *D. Cunningham*.

Viburni nostratis folio, Arbuscula *Cheusanensis*, *vid. inter Arbores*.

**V**iola alba, folio *Securis Amazoniæ* effigie, *Floridana*.

Viola parva *Cheusanensis*, grumosa radice.

Viola arvensis bicolor *Floridana*, imis foliis parvis, tenellis circinatis. An Viola alpina minima, Nummulariæ folio, *Boccon. Mus. part. 2. 163. tab. 127*.

Viola affurgens candida, Mercurialis hermaphroditicæ venosis foliis, subtus albicantibus; ex *Provincia Floridana*.

Viola

*Viola Tituanica* lignosa, Campanulæ Autumnalis longioribus foliis, floribus parvis candicantibus.

**V**irga aurea *Floridana*, ferratis foliis subtus incanis.

Virga aurea *Tituanica*, oblongo & mucronato folio scabro, per margines obiter crenato, hæud procùl à *Ceuta* quoque invenitur.

Virga aurea foliorum limbis, asperatis, *Cupani*, ex mente D. *Sherard*. Folia quoàd figuram ab Hieracio *Sabaudum* *Lob.* hæud multum abludere videntur, flores tamen multò minores; Ad Sonchorum genus potius, nostra sententiâ accenferi meretur.

Virga aurea minor, spicato flore luteo, ex *Insula Cheusan*.

**V**iscum *Maderaspatanum*, folio lato brevi. Cherry-melcheddy *Malabarorum*, quod est Vocabulum commune, quo Epidendrorum plurimas species significant *Malabarei*.

Viscum *Maderaspatanum* minus, foliis veluti articulatis. Cherry-melcheddy itidem titulo, quantumvis à præcedente alienum *Malabareis* insignitur. An Viscum Opuntioides ramulis compressis, *Catalog. Jamaic.* 168.

Viscum arboreum *Indicum*, crassiori folio, floribus purpureis, longo collo donatis, plurimis simul in Surculis binatim adnascentibus. *Valli-itti-canni H. Malab. part.* 10. *tab.* 4.

H h h

Visc<sub>i</sub>



Visci similis, Frutex *Cheusanicus* Clematitis.

**V**itex *Indica*, Mali *Cotoneæ* angustiori folio singulari, fructu ad foliorum alas; *Ocana-murram Malabarorum*.

*Vitex Sinarum*, subrotundis argenteis foliis bijugis, caule quadrangulari; ex *Insula Crocodilorum*.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia* subrotundis Ulmi foliis, *Americana*.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia Æthiopica*, Alaterni foliis rotundioribus duris, & non crenatis, virgulis angulosis.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia Floridana*, Lauri minoribus foliis, Unedonis floribus, per longitudinem furculorum uno versu racemosis.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia palustris*, Nummulariæ foliis non crenatis, ex *Florida*.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia Maderaspatana*, Buxifolio, floribus parvis purpurascens villosis, sparsim enascentibus.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia Floridana*, spicato fructu folio Phylli.

*Vitis Idæa*, s. *Vaccinia Cheusanensis*, Prunifolia, Urceolato flore, fructu atropurpureo.

Frutex est flore rufescente, campaniformi, globofo, (instar *Ericæ*) ad os parum diviso, ex calyce quintifido surgit

furgit pistillum, quod deindè abit in baccam nigro-  
pur-puream edulem ; foliis serratis subrotundis, &  
acuminatis, *Novembri* floret, D. *Cunningham*.

*Vitis Idæa Cretica* humilior, *Park. Theatr.* 1457. *Chama-*  
*cerasus Idæa Pr. Alpini de Exot.* pag. 4.

*Vitis vinifera*, folio *Ficûs denticulato*, fructu cæruleo.  
*Perro-Volula Malabarorum*.

*Vitis vinifera sylvestris*, ex *Insula Cheusân*.

*Vitis Vulpina* dicta *Virginiana* alba, *Almag. Bot.* 392. An  
*Vitis lanata Carol. Stephani Præd. rust.* 307. Hujus ramu-  
lum ex *Insula Cheusân* in ditione *Sinarum*, D. *Cunning-*  
*ham* ad nos etiam transmisit ; Et circa *Constantinopolim*  
frequens est, ut nos monuit Excellentissimus Vir D. D.  
*Timone* Medicinam feliciter faciens in *Urbè Pera*.

*Vitis agrestis Sinica* minor, **The least Fox Grape**, ex  
*Insula Cheusân*.

**U**lmifolia arbor *Maderaspatana*, fructu bacciformi  
globoso, perianthiis membranaceis incluso ; *Neer-*  
*cheddy Malabarorum*.

*Ulmus nana Cheusanica*, foliis splendentibus glabris.

Frutex est fructu ovato plano membranaceo, ad summi-  
tatem parùm diviso, femine foeto unico, lentiformi,  
in fructûs centro, foliis ferè *Ulm*i serratis & acumi-  
natis ; Fructus prodit ex flore, vel calyce quintifido,  
&



& Novembri maturefcit, Sinicè Kin-tchang-lang nuncupatur, D. *Cunningham*.

**U**M-ki aliàs U-muy ; cujus fructus ad colorem Escarlatinum tingendum infervit, *vid inter Arbores*. Florem fert rofoceum, album hexapetalum.

**U**Rtica racemifera maxima *Sinarum*, foliis subtùs argenteâ lanugine villofis.

Planta fylveftris Mā dicta, undè efficitur filum infar Linī Mā-fien dictum, D. *Cunningham*.

Eadem fativa. Planta fativa Cō dicta, undè efficitur Cō-pou, pro vestibus æftivis, D. *Cunningham*.

Urtica *Floridana* major, feminibus racemofis, non ramofis.

Urtica minor *Floridana*, feminibus cauli arctè adhærentibus.

**U**Va crispa s. Groffularia, Oxyacanthæ foliis amplioribus, ex *Sinu Hudfonio*. ex *Horto*, D. *Reynardsoni*.

**U**Vifera litorea Obe vulgò *Almag. Bot.* Guajabarana *Charibearum* *Henr. Mundy Biochrest.* 168. In *Antillis* etiam ad fluviorum ripas paffim crefcunt hujus Arbufculæ tortæ, nodofæ, folio rotundo amplo, quam charta firmiori, primùm viridi, poftèa rufefcente ; Earum fructus  
sunt

sunt roseæ Uvæ, paucæ carnis, ob ossa magna, quæ mediis acinis insunt, saporem prunorum habent; Xagua fortè arbor *Perùana* apud *Ogilv. Americ. 405.* quæ fructum Uvæ passæ similem profert; Cujus officulorum nuclei benè exsiccati, & moliti, optimam farinam præbent ad panem conficiendum. An Xagua *Oviedi.* De hac Arbore *Petr. Martyr.* cum ait, Gignit ex duobus Arborum generibus picem *Insula Hispaniola,* ex Pinu puta, & Arbore dicta *Copei,* ex quâ pix non aliter quam ex Pinu legitur, licet dicant plerique stillicidio colligi comburendo ejus lignum. Fructus autem ejus parvus est, vel prunum, esui satis aptus. Cujus Officulorum nuclei sunt farinacei.

X

X

ANTHIUM, s. Lappa minor *Chenopodii foliis, Cheusanense.*

X

Eranthemum *Sesamoides* flore albo, *Ericæ* foliis cauli tomentoso adstrictis, ad radicem verò *Stæchadis citrinæ* longioribus, & solutis, ex *Insulâ Crocodilorum.*

Xeranthemum *Africanum,* imis *Gnaphalii* foliis, supernis vero *Cupressinis teretifoliis,* flore maximo *Perficæ* colore, Variat & flore candidissimo.



## Z

**Z**ANTHOXYLUM aculeatum, Fraxini finuosis, & punctatis foliis *Americanum*, *Almag. Bot.* 396.

Qui hujus ramulo in *Phytographiâ* nostrâ, tab. 239. fig. 4. adpicti sunt fructus; Arbori ejusdem cognominis proximè subsequenti in *Almagesto* pertinent, cujus *Icon* habetur, tab. 328. fig. 6. ejusd. *Phytogr.* & huic per errorem adpositi.

**Z**Inziberis angustiori folio facie, cujus radix *Cassumuniar* nuncupatur è *Maderaspatân*.

F I N I S.

# AMALTHEI BOTANICI.

## Appendix.

### A

**A**RBUSCULA baccifera *Brasiliana*, Canellæ folio trinervi, subtus argentea lanugine villosa. *Mus-tree* dicta. Amicissimus & eruditus Vir D. D. *Johannes Woodward*, D. M. & Medicinæ Prælector apud *Greshamenses*, nec non Societ. Reg. & Medic. *Londinens.* socius dignissimus hanc Arbusculam peramœnam, cum multis aliis in hac *Appendice* recensitis, quæ ex *Hollandia Nova*, atque *Brasilia* a D. *Dampier* sibi allatæ, necnon ex *Insula Cheusan* a laudatissimo viro Domino *Jacobo Cunningham* sunt transmissæ; Nobis ad Exsculpendum candide impertivit.

Arbuscula *Laurifolia Brasiliana*, *Laurustini* floribus corymbosa.

Arundo *Sinica* ramosa, plurimis squammulis ad culmum donata.

### C

**C**Alamintha montana *Sinica* *Betonicæ* folio, floribus cæruleiscentibus.

*Chamælex Arabum* folio, fructu ex alis foliorum pediculis brevibus glomerato, ex *Hollandia Nova*.

*Chrysanthemum exiguum Nov'hollandicum*, *Coronopi* foliis, flosculis fistulosis.

*Chrysanthemum Granadillæ* fere foliis *Brasilianum*, flore summo caule singulari.

*Chrysanthemum longifolium minus Brasilianum*, flore unico in fastigio caulis.

*Colutæ* argenteæ alternis foliis, filiqua incana compressa, per medium planitie secundu longitudinem sese aperiente.

*Convolvulus Virginianus* elegans, incanis foliis tripartito divisis, flore amœne purpureo.

### E

**E**Rica *Nov'hollandica* quaterno ordine foliata, folio subrotundo brevi.

*Eriocaulon Nov'eboracens.* capitulo albo globoso, s. *Globularia Americ.* *Statice* haud ab- similis, cauliculis lana atronitente refertis

*Eupatorium Cheusanense* *Urticæ* foliis, pediculis alatis, & auriculatis, floribus summo caule conglomeratis.

### F

**F**Rutex *Brasilianus* fructus ferens siccos baccas mentientes, ex alis foliorum uno versu in racemos.

Frutex *Cheusanensis*, foliis rugosis *Jasmini* flore tetrapetaloidæ.

Frutex



## A P P E N D I X.

*Frutex Nov'eboracensis*, *Elæagni* foliis brevioribus minutissime crenatis, fructu parvo quinquecapsulari.

*Frutex Sinenfis* alatis foliis filiquosus, torosis filiquis, villis aureis densius obductis.

*Frutex Sinenfis* *Senæ sylvestris* folio angustiori, nodosa filiqua rostro longiore donata.

*Fruticulus Nov'eboracensis*, hirsutis *Myrti* minoribus foliis, capsulis parvis tricarpis.

*Fruticulus verticillatus* *Prunifolio* longiore *Brasilianus*. Eundem etiam habuimus e *Terra Mariana*.

*Fucus* ramulis compressiusculis crusta aurea sanguineis guttis duplici utrinque ordine insignita obfuit, ex *Guinea*. *Corallina lutea* punctorum rubentium duplici utrinque phalange insignita, *Doctoris Woodward*.

### G

**G** *Ramen parvum Cheusanense* spicatum, granulis compressis cordiformibus.

*Gramen Cheusanicum* foliis brevibus aculeatis globuliferum, globulos aureos *Chamæmeli* nudi similes inter folia proferens.

### J

**J** *Asminum Brasilianum* *Lauri* folium, floribus longo tubulo donatis.

### L

**L** *Aserpitium Apii* paludosi folio *Marilandicum*.

*Leucoium maritimum Nov'hollandicum*, folio parvo incano, flore amplo cæruleo.

*Lotoides Ethiopicum* *Saxifragæ pratensis* folio, multifariam in quinque partes diviso.

### M

**M** *Alva Brasiliana*, angustis lanuginosis, & ferratis foliis, flore aureo parvo.

*Melissa Brasilica*, subrotundis parvis foliis inodora.

*Mespilus Oxyacantha* dictus *Cheusanensis* oblongis, mucronatis, & ferratis foliis, fructu longiore, summis ramulis innascente.

*Mespilus Oxyacantha* dictus *Nov'eboracensis*, *Rosæ sativæ* foliis, fructu parvo rotundo, inter folia sparso.

*Muscus denticulatus* major, ex *Ceram*, *Insula Amboinæ* adjacente.

*Muscus denticulatus* minor, ex *Insula Cheusan*.

### N

**N** *Nummularia* (forte) crenatis foliis. An *Veronica pratensis* *Nummulariæ* foliis, *Planta repens Brasiliana*?

### P

**P** *Ericariæ* folio *planta Cheusanica*, fructu parvo rotundiore, summo caule in spicam disposito.

### R

**R** *Hus trifoliatum Brasilianum*, foliis glabris.

*Ricinus Nov'hollandicus* triphyllus, capsulis eleganter bullatis.

### S

**S** *Solanum Brasilianum*, folio integro, mucronato, glabro, *Papas Americani* floribus in summitate caulis.

### V

**V** *Iola surrecta Virginiana*, *Xyloftii* foliis, flosculorum petalis eleganter crenatis.

**U** *Mbelliferis* adfinis, *Ranunculi* folio, *planta pusilla*, *Hollandiæ Novæ*.

## I N D E X.

# I N D E X.

<b>A.</b>			
<b>A</b>	Bavo,	68.	Alyssum minus, 201.
	Abies,	1.	Amaranthioides, 13, 60.
	Abrotanum,	1, 2.	Amaranthus, 12.
	Abſinthium,	2, 3.	Ambelos <i>Cingaleſ.</i> 21, 187.
	Acacia,	3, 4.	Ambroſiæ ſimilis, 13.
			Amear-Blundeo, 64.
	Acanthium,	50.	Aminicola <i>Barbadeſ.</i> 176.
	Acarna,	51.	Amygdalo ſimilis, 13.
	Acer,	4.	Amygdalus, <i>ibid.</i>
	Acetoſa,	<i>ibid.</i>	Anagallis lutea, 140.
	Achæmenides <i>Indor.</i>	131.	Anaſias ſylveſtris, 13.
	Acino Similis,	4.	Anantaly-Maravara, 74.
	Acinos effigie,	<i>ibid.</i>	Ana-parna, 97.
	Acmella,	57.	Anchuſa, 14.
	Aconitum.	5.	Anchuſæ folio, <i>ibid.</i>
	Aculeoſa,	<i>ibid.</i>	Anethum, <i>ibid.</i>
	Addemogule,	12.	Anethifolia, <i>ibid.</i>
	Adjoumaram,	24.	Anguria, <i>ibid.</i>
	Aglaophotis,	152, 153.	Anguriæ folio, <i>ibid.</i>
	Alaternoides,	5.	Anomala, 15.
	Albahaca,	61.	Anonis, <i>ibid.</i>
	Alcea,	6, 7, 8.	Anonymos, 15, 16, 17, 21,
	Alga Huviatilis,	177.	127, 187.
	Alifanus,	8.	Anthyllis, 17.
	Alisma racemoſum,	115.	Anthyllis altera, 85.
	Allamaram,	87.	Antirrhinum, 17.
	Allium,	8.	Antirrhino adfinis, <i>ibid.</i>
	Alloco-paſhy,	63.	Apioſcorodi facie, <i>ibid.</i>
	Almuggim alias Algummim.	156.	Apium <i>Macedonicum,</i> <i>ibid.</i>
			Apocynum, 17, 18, 19.
	Alnus & Alnifolia,	8.	Aproxyn, 153.
	Alni effigie,	145.	Aquiſolium, 19.
	Aloe,	8, 9, 10.	Aquilegiæ corniculis, <i>ibid.</i>
	Aloe falſo dicta,	40.	Araka-puda, 185.
	Alopecuros vera <i>Plinii,</i>	110.	Arbor fruſtu Ananes, 13.
	Alſine,	10, 185.	Arbor inebrians, 206.
	Althæa,	7, 11.	Arbor Sebacea, 25, 76.
	Alycurry,	23.	Arbor filiquifera, 4.
			Arbor ſine foliis, 14.
			Arbores alia, 19, 20, 21, 22,
			23, 24, 25, 26, 27.
			Arbuſculæ, 27, 28, 29, 30.
			31, 32, 33, 34, 35, 36.
			& in <i>Append.</i>
			Ardana-polla, 37.
			Arenau-polla, <i>ibid.</i>
			Ariſtolochia, 36, 37.
			Arrevenar-pundoe, 85.
			Arry <i>Malabarorum,</i> 180.
			Artemiſia, 37.
			Arum, 37, 38, 39.
			Arundo, 39, 101, 146, & in
			<i>Append.</i>
			Ary-Elle, 95.
			Arymaram, 62.
			Aſarinæ foliis, 40.
			Aſparagus, <i>ibid.</i>
			Aſphodelus, <i>ibid.</i>
			Aſphodelo affinis, <i>ibid.</i>
			Aſter, 40, 41, 42, 43, 57,
			130.
			Aſtragalus, 43.
			Atragene, 60.
			Atteemaram, 87.
			Atti-alu, <i>ibid.</i>
			Auriculæ Urſi affinis, 43.
			Auſid Avicennæ, 157.
			<b>B.</b>
			<b>B</b> Alauſtii foliis, 44.
			Balaſamina lutea, <i>ibid.</i>
			Baobab, 68.
			Barba Jovis, 44.
			Baruce fruſtus, 147.
			Baſaala-poulon-Maravara, 115.
			Batata ſpecies, 184.
			Batta-valli, 62.
			Beera-kaida, 112.
			Belam-canda-Shularmani, 193.
			Bela-pola, 106.
			K k k
			Beli-



# I N D E X.

Beli-caraga,	109.	Cassida peregrina,	190, 191.	Circææ foliis,	59.
Bellan-patsja,	149.	Cassine,	52.	Cirsum,	50.
Belli,	44, 45.	Castanea,	53.	Cisti genus,	28, 30.
Belutta-adeca-manjeu,	12.	Cassumuniar radix,	214.	Cistus,	59.
Belutta-Tsjori-valli,	114.	Catalonga,	68.	Cistoides,	7, 99.
Blattariæ affinis,	139.	Catanance adfinis,	130.	Clay-cheddy,	136.
Blitum,	45.	Cattu-valli,	62.	Clematis,	60.
Bolangomaram,	162.	Cauca-pundooe,	165.	Clematitis,	ibid.
Bongela-chedde,	134.	Caul-cadde,	61.	Clinopodium,	60, 61.
Borachera forte,	206.	Cauta-manuck,	184.	Co <i>Sinenfibus</i> dicta,	212.
Botrys fruticosa,	45.	Caute-vella,	141.	Coambatty-Leckary,	12.
<b>The Sucking-Bottle,</b>	8.	Cauto-moolle,	20.	Coapoiba,	19.
Brassica sylvestris,	45.	Cauton-anna,	54.	Cocculi <i>Indi</i> ,	61, 62.
Brunella,	ibid.	Cautonar-mully,	84.	Codeir-podela,	115.
Bryonia,	45, 46.	Cautoo-canna,	119.	Codry-pilloe,	108.
Bryopteris,	93.	Cautoo molamaram,	22.	Coida-humbee,	46.
Bucanephyllon,	46.	Cauto-tullashy,	48.	Cola fructus,	165.
Bucheides <i>Syrorum</i> ,	154.	Cautwallee,	4.	Colcora-gelly,	143.
Buglossum,	46, 47.	Cedreleta,	100.	Colerawy,	106.
Buglossa simile,	46.	Centaurium medium,	53.	<b>Coles,</b>	62.
Buh-hu,	107.	Centaurium minus,	ibid.	Coletty-Maano,	22.
Bulbocastano similis,	47.	Ceræsus,	54.	Colinil,	163.
Bupleurum,	ibid.	Ceratia,	ibid.	Collar-cutty,	170.
		Cerinthe,	ibid.	Collar-Moosh-moshica,	68.
		Chamæcerasus <i>Idæa</i> ,	210.	Collar-nuchee,	20.
		Chamæcistus,	59, 176.	Collar-orchis,	170.
		Chamædrys,	54.	Colla-rotta,	175.
		Chamælea,	ibid.	Collar-pawly,	202.
		Chamæleæ <i>Arabum</i> folio, in		Collar-poe,	12.
		Append.		Collar-tuty,	6.
		Chamæmelum,	54.	Collar-wallowy,	126.
		Chamæpitys maritima,	45.	Colle-Molian,	202.
		Chamæsyce <i>Indica</i> ,	202.	Collycaucana,	63.
		Chambymaram,	191.	Colutea, 62. & in Append.	
		Changum-goupee,	167.	Coly-Yeveray,	169.
		Chappawer,	185.	Coma aurea,	2.
		Chara,	152.	Condam-guttree,	30.
		Charestryamaram,	164.	Condan-guttry,	20.
		Chaunacurry,	61.	Conserva,	63.
		Cheendil curry,	46.	Connemaram,	97.
		Chemb-Paretty,	169.	Conneta-poondoe,	129.
		Chendoe-curry-pille,	113.	Contra yerva,	15, 127.
		Chenomychon,	153.	Convolvulus, 63. & in App.	
		Cheravar-cuddee,	37.	Conyza arbor.	64.
		Cherragoon-buty,	68.	Coory-tugree,	30.
		Cherry-mel-chedde,	73.	Copei arbor,	213.
		Cherry-mel-cheddy,	209.	Co-pou <i>Sinarum</i> ,	212.
		Cheru-kera,	45.	Cora-chinacone,	56.
		Cherymaram,	3.	<b>The feather'd fine Coral-</b>	
		Chevaruttee,	80, 81.	line,	64.
		Chevenar-Weamboe,	161.	Corallina,	ibid.
		Chittee-Mootee,	11.	Corallium,	ibid.
		Choona-attee,	3.	Coral-pundoo,	126.
		Chorellee,	10.	Coranny-poe,	84.
		Christophoriana,	54.	Coreatty,	136.
		Chrysanthemum, 54, 55, 56,		Corenda-chedde,	66.
		57, 58, & in Append.			
		Cichoreo affinis,	58.		

The

# I N D E X.

**The Coriander - Comfit :**  
**Tree,** 65.  
 Coriogrammatodendros, *ibid.*  
 Corni similis, 65, 66.  
 Cornus mas, 66.  
 Corosinam, 166.  
 Coru & Coru genus, 31, 66.  
 Cory-cotan, 23.  
 Cory-tuty, 11.  
 Cory-parappoe, 143.  
 Costus *Arabicus*, 206.  
 Courundera, 175.  
 Crocus, 66.  
 Crotalaria, 66, 67.  
 Crucjata, 68.  
 Cucumis, *ibid.*  
 Cucurbitifera, *ibid.*  
 Culla-Almaram, 88.  
 Cullæ-pawfhy, 202.  
 Cullam-mully, 83.  
 Cullara-Marungy, 151.  
 Cullooe *Malabaror.* 170.  
 Cuminum, 47, 120.  
 Cummala, 136.  
 Cupi, 69.  
 Cupressus, *ibid.*  
 Curigi-taly, 31.  
 Curkay, 108.  
 Cuscuta, 69.  
 Cutchal-curry, 23.  
 Cuttee-calangoe, 177.  
 Cyanus arborefcens, 81.  
 Cyanus major, 69.  
 Cynoglossum, 70.  
 Cynofpafus, 153.  
 Cyperi genus, 70.  
 Cytifus & Cytifi facie, *ibid.*

## D.

**D** Ammāra, 99.  
 Davadarre, 187.  
 Dens Leonis, 71.  
 Digitalis, *ibid.*  
 Doronicum, *ibid.*  
 Donnekai-gaukah, 14.  
 Dracocephalo affinis, 103.  
 Dracunculus major, 37.

## E.

**E** Chium, 72.  
 Elacorandee-curry, 192.  
 Elatines folio, 72.  
 Elichryfum, 72, 73.

Ellacauny, 168.  
 Ellacooty-maram, 179.  
 Ella-pafhu, 177.  
 Elleborine botryoides, 115.  
 Elly-pundoe, 67.  
 Elowaymaram, 22.  
 Embymaum, 20.  
 Entada, 32.  
 Ephemerum Phalangoid. 73.  
 Epidendron, *ibid.*  
 Equisetum, 74, 177.  
 Eramamine, 23.  
 Ergen arbor, 154.  
 Erica *Alexandr. Lob.* 201.  
 Erica, 74. & in *Append.*  
 Erigeron, 192.  
 Eriocarpus, 74.  
 Eriocaulon in *Append.*  
 Eriophoros, 74.  
 Erra-Achuncheddy, 102.  
 Erra-tauney-pundooe, 192.  
 Eruca, 75.  
 Eryma-tundooe, 12.  
 Eryngii species, 75.  
 Erythroxyton, 155.  
 Esula *Indica Bonti,* 202.  
 Etta-pamuretty, 197.  
 Euonymo adfinis, 76, 77, 78, 79.  
 Euonymo fimilis, 75.  
 Euonymus, *ibid.*  
 Eupatoria, 80, 81, 82, 83,  
 & in *Append.*  
 Euphrasia, 83, 84, 85, 173.  
 Euphrasie adfinis, 85.

## F.

**F** Aba 86.  
 Fagaræ majores, 76.  
 Fagaræ minores, 79.  
 Fagotriticum, 86.  
 Fagotritico fimilis, 87.  
 Fagus *Americanus,* *ibid.*  
 Falcata *Rivini,* 163.  
**The Meafle-Moon = Fern,** 94.  
 Festuca altera, 108.  
 Ficoides, 88, 89, 90, 91.  
 Ficus, 87, 88.  
 Filix, 91, 92, 93, 94, 95.  
 Flabia *Marci Aurelii,* 116.  
 Flammula, 60.  
 Foenum-græcum, 96.  
 Fontamou, 156.  
 Saint-Foyne, 142.  
 Fruticulus in *Append.*

Fructus *Ethiopicus,* 69.  
 Frutex, 96, 97, 98, 99, 100.  
 101, 102, & in *Append.*  
 Fucus 102, & in *Append.*  
 Fumaria, 102.  
 Fungus, *ibid.*

## G.

**G** Abba, 170.  
 Galactoxylon, 103.  
 Galeata, *ibid.*  
 Galega, *ibid.*  
 Galeopsis, *ibid.*  
 Gallium, 104.  
 Genista, 104, 105.  
 Geniftella, 105.  
 Gentiana, *ibid.*  
 Gentianella, 106.  
 Geranium, *ibid.*  
 Geum, 187.  
 Gladiolus, 106.  
 Glaftum, 54.  
 Glauci exiguae fimilis, 106.  
 Glow-wort, 152.  
 Gnaphalium, 72, 107.  
 Goffampinocarpon, 107.  
 Goffampinophyllon, *ibid.*  
 Goffipium, *ibid.*  
 Gramen, 107, 108, 109, 110.  
 111, 112, 113, 114, 173.  
 & in *Append.*

## The least Fore-Grape,

211.  
 Gratiolæ affinis, 114.  
 Gritilla *Ceylonenf.* 136.  
 Guajabarana, 212.  
 Guanabanus, 69.

## H.

**H** Abafcon, 152.  
 Habhafis *Arabum,* 170.  
 Hayri, 64.  
 Hedera arborea, 114, 115.  
 Hedera terrestris, 115.  
 Hedyfarum triphyllum, 161.  
 Helianthemum, 59.  
 Heliotropium, 115.  
 Helleborine, *ibid.*  
 Hemionitis, 94.  
 Herb of a 1000 Years, 147.  
 Herbs



# INDEX.

Herba ad Renum morbos,	128.	Kari-welli-panna-Maravara,	92.	Loon-King,	168.
Herba amoris,	189.	Katon-Kaida-Maravara,	74.	Lotooides <i>Æthiopicum</i> , in <i>Ap-</i>	
Herba Byssini aurei.	128.	Katou-Mailosina,	176.	pend. & in <i>Manrissa</i>	120.
Herba Yu,	<i>ibid.</i>	Katsjula-Kelengu,	15, 127.	Loto affinis,	134.
Herbæ aliæ,	116, 117.	Kattu-Kelengu,	184.	Lotus,	133.
Herculis arbor,	77.	Katu-Karivi,	181.	Lotus Nilotica,	156.
Hermannia,	7.	Katu-Tsjurel,	40.	Lunaria,	132.
Hesperis,	117, 132.	Katu-Vistna-clandi,	67.	Lunaria Botrylites,	134.
Hesperidi affinis,	117.	Kauki similis,	128.	Lun-gyen,	25.
Hexapetalos,	<i>ibid.</i>	Ketmiæ species,	6.	Lupinus,	134.
Hieracium,	117, 118.	Kieu-yeu,	25, 26.	Lupulus fœm.	<i>ibid.</i>
Hi-him-tlaw,	58.	Ki-heang,	34.	Lychnis,	134, 135.
Hippophobada,	131.	Kilcola-Tsjetti,	28, 140.	Lychnidis amula,	136.
Hippopothos,	<i>ibid.</i>	Killepymaram,	31.	Lychnidea,	<i>ibid.</i>
Hoa-tchaw,	78.	Kim-Kaw-ia,	28.	Lycium,	136, 137, 138.
Holostii similis,	119.	Kin-in-hoa,	167.	Lyfimachia,	138, 139, 140.
Horminum,	<i>ibid.</i>	Kinsu,	128.		
Hura arbor,	147.	Kin-tchang-lang,	211.		
Hu-tsu,	136.	Kiu-tze,	26.		
Hyacinthus,	119.	Kodatsjari,	145, 199.		
Hypocoum,	120.	Kol-pullu,	112.		
Hypericum,	<i>ibid.</i>	Kondam-pallu,	117.		
Hyssopus,	<i>ibid.</i>	Kudici-Valli,	8.		
		Kuren-pullu,	146.		
		Kurka,	129.		
					</



# I N D E X.

Millenaria, 147.  
Mimosa, 62, 147.  
Minangani, 15.  
Miremanicum, 11.  
Mocaretty & Mokaretta, 207.  
Mok-teu-tsaw, 57.  
Mollugo, 104.  
Monorchis, 163.  
Morgsani similis, 147, 173.  
Morifolia, 147.  
Morus, 147, 148.  
Motta-pullu, 124.  
Mottenga, 111.  
Movenam-cumboo, 29.  
Mouli-Ila, 78.  
Mugiuli *Sinarum*, 178.  
Mulen-pullu, 111.  
Mullmorucomaram, 22, 169.  
Munda-valli, 63.  
Musco-fungus, 149.  
Muscus, 148, 149. & in *Append.*  
*Musteran d' Ova*, 199.  
*Mustree*, in *Append.*  
Myagrurn, 149, 206.  
Myriophyllum aquat, 178.  
Myrobalanus, 149.  
Myrtillus grandis, 27.  
Myrtifolia, 29, 151.  
Myrtus, 151.

## N.

**N** Aga mu-valli, 60.  
Naga-pu, 8.  
Nain-Canna, 39.  
Nala-tirtava, 158.  
Namurramaram, 22.  
Nandoo-cautrosy, 143.  
Nanja-roopa, 30.  
Nannary-chedde, 19.  
Napifolia, 151.  
Narre-Comptee, 53, 136.  
Narry-cum-batty, 53.  
Narry-vangaygam, 132.  
Nary-tory, 171.  
Nastartium, 151.  
Natsjatam, 61.  
Naur-velle, 143.  
Nechetty, 100.  
Neen-neringy, 97.  
Neera-dymaram, 123.  
Neer-covy, 36, 68.  
Neer-crandy, 64.  
Neer-culla, 114.  
Neer-pod, 119.

Neer-roattee, 207.  
Neer-tuggry, 107.  
Neer-tuty, 130.  
Neer-Valle, 12.  
Neittoraii, 18.  
Nelampala, 17.  
Neli-pu, 73.  
Nella-carumbee, 175.  
Nella-crandee, 67.  
Nella-crandy, 192.  
Nella-Mulle, 40, 85.  
Nella-panna-Maravara, 94.  
Nella-Veamboe, 185.  
Nelle-pondoe, 75.  
Nepeta, 144.  
Nerry-coraccoi, 24.  
Neru-teala, 119.  
Nevalli-pondoe, 67.  
Neuroplatyceros, 151.  
Nil. s. Anil. 134, 151.  
Ninzin s. Ginseng. 152.  
Nir-murri, 189.  
Nir-Notsjil, 167.  
Nir-pulari, 143, 162.  
Nir-pullu, 73.  
Nirvala, 29.  
Niuren, 6.  
Nuciprunifera, 154.  
Nummularia, in *Append.*  
*Nux Bengalenfis*, 155.  
*Nux Juglans*, *ibid.*  
*Nyctegretum*, 153.  
*Nyctilopa*, *ibid.*  
Nymphæa, 156, 157, 158.

## O.

**O** ak-Leather, 148.  
Obe vulgo, 212.  
Ocymum, 158, 159, 178.  
Ocymo affinis, 61.  
Oculus Draconis, 25.  
Olea, 159, 160.  
Wild-Olive, 178.  
Onobrychis, 160, 161, 162.  
Oopun-caragoe, 111.  
Orchis, 162, 163.  
Ornithogalo affinis, 163, 168.  
Ornithopodium, 163.  
Orobanche, *ibid.*  
*Orobus Hyscanensis*, *ibid.*  
*Orula Cingalensis*, 21, 187.  
Osmunda, 91.  
Ou-tom-chu *Sinarum*, 199.  
Outra-cheddy, 171.  
Oxalis, 4.

Oxys, 163, 164.  
Oxys lutea frutescens, 204.

## P.

**P** Aasha-cheddy, 202.  
Pai-by, 160.  
Pai-paroeæ similis, 164.  
Palam-chedde, 30.  
Palma, 164, 165.  
Palmæ affinis, 13.  
Palmitas Ananæ foliis, 14.  
Pamarreta *Malab.* 197.  
Panamboe, 101, 146.  
Panambu Valli, 101.  
Panax, 165.  
Pan-Niere-cuddy, 171.  
Papaver corniculat-acre, 165, 166.  
Para-panna-Maravara, 92.  
Paretty, 64.  
Paretty, 107.  
Paretty-maram, 184.  
Parietariæ affinis, 166.  
Payn-cheddy, 184.  
*The six Weeks Pea*, 168.  
Peatietty, 11.  
Peatty, 30.  
Pecala *Malabarorum*, 198.  
Pedicularis, 166.  
Pediculari congener, *ibid.*  
Pee-Cajenneam, 56.  
Pee-Coipa, 176.  
Pee-Mottenga, 113.  
Pee-tardavel, 188.  
Pee-tsjang-puspan, 83.  
Pehindoe, 127.  
Pelandy-cheddy, 100.  
Pelledymaram, 24.  
Pentaphylloides, 166.  
Pepitas *del Peru*, 13.  
Peralu, 87.  
Peramutty, 11.  
Pera-woolera, 20.  
Peree-woondel, 23.  
Periclymenum, 167.  
Periclymeni similis, *ibid.*  
Perimballary, 189.  
Pering-cory-pillee, 70.  
Peringolary-cheddy, 137.  
Peringorunde-cheddy, 31, 66.  
Peringotan, 19.  
Perravolula *Malab.* 111.  
Perrun-curry, 61.  
Persicaria, 86, 87, 168, 206.  
Persicariæ folio in *App.*



# I N D E X.

Perumboo,	39.	Pulegium,	ibid.	Sappan lignum,	156.
Phalangium,	168.	Pull-colly,	83.	Saracena <i>Canadens</i> ,	46.
Phaseolus, 168, 169, 170.		<b>The Screw-Pulley,</b>	205.	Sassafras,	66.
171.		Pulmonaria non maculos,	198.	Satureia,	187.
Phaseolus <i>Coles Glus</i> ,	165.	Pupal-Valli,	130.	Saxifraga magna,	135.
Phillyrea,	171.	Purra-summaram,	100.	Scabiosa,	187. 188.
Philtrum,	189.	Pu-tumba,	134.	Scabiosis adfinis,	188.
Phlomis <i>Hispanica</i> ,	197.	Pu-Walli,	179.	Scandragora,	152.
Phytolampyrida,	152.	Pyracanthæ similis,	ibid.	Scorodoniæ affinis,	188.
Pilandy,	12.	Pyrola,	ibid.	Scorodonthlaspi,	200.
Pille-curca,	109.	Pyrolæ adfinis,	ibid.	Scorpioides,	189.
Pille-rushy,	110.	Pyrolæ nostrati similis,	ibid.	Scorzoneræ,	ibid.
Pindaiba <i>Pisonis</i> ,	76.			Scrophularia,	189, 190.
Pinguicula,	171.			Scrutellaria,	191.
Pinus,	ibid.			Sebestanæ foliis,	191.
Pi-pa,	26.			Securidaca,	ibid.
Pi-pa altera,	27.			Sedum <i>Africanum</i> ,	191, 192.
Piperella,	29.			Sena spuria,	192.
Piperifera arbor,	78.			Senecio,	ibid.
Piper frutex,	172.			Serrafaulula,	204.
Pisum,	ibid.			Serratula <i>Virginienf.</i> ,	192.
Planta aquatica,	73.			Sesamoides parvum,	192.
Planta bifoliata,	15.			201	
<b>The Humming-Bird :</b>				Seseli pratense,	192.
<b>Plant,</b>	44.			Severoo-Molingu,	118.
Planta Sideritis folio,	6.			Seu-kiu-hoa,	122.
Plantæ aliæ, 172, 173, 174.				Shamunty,	142.
Plantula peregrina <i>Clus</i> ,	172.			Sha-sin,	75, 127.
Plantago,	174, 175.			Shegapu-Corea,	111.
<b>Fair Womans Plumme,</b>	178.			Sherry-pasha,	69.
				Shevenar,	101.
Po-ho,	144.			Shevenar-Corungo,	146.
Pola-Tsjira,	190.			Shevenar-Weembooe,	133.
Polium,	175.			Sideritis,	193.
Polly-manga,	144.			Sideriti folio,	15, 190.
Polygala,	175.			Siler,	193.
Polygonatum,	ibid.			Sinapi,	ibid.
Polygonum,	175, 176.			Singloo,	22.
Ponanga-chedde,	25.			Sisarum,	193.
Poopilloe,	109.			Sisynrichium,	ibid.
Pootumby,	172.			Sium minimum,	ibid.
Populus alba,	8.			Smilax,	194.
Portulacæ folio similis,	199.			Smilacis asperæ fol.	ibid.
Portulaca,	176.			Solanum baccif. 194, 195, &	
Portulacæ affinis,	ibid.			in <i>Append.</i>	
Potamodendron,	ibid.			Sonchi genus,	151, 209.
Potamogeiton,	177.			Sonchus,	195.
Potamogeito affinis, 177,	178.			Sorbi Sylv. Arbuscula,	196.
Potta-pulla,	113.			Sorbi legitim. foliis,	ibid.
Prayamaram,	23.			Sorbus <i>Sinarum</i> ,	ibid.
Prunifera,	178.			Soy nobile garum,	198.
Pruno affinis,	178.			Spartium <i>African.</i>	104.
Prunus,	ibid.			Speculum Veneris,	49, 196.
Pseudo dictamnus,	141.			Spiræa,	196, 197.
Pua-Tsjetti,	79.			Spongia globosa,	197.
Puem-peda,	148.			Sfu-tic <i>Sinarum</i> ,	158.
Pulegii specie capsularis, 179.				Stachys,	197.
				Statice,	188.
				Struthium	

# I N D E X.

Struthium legitim.	182.	Tsjana-Kua <i>H. Mal.</i>	206.	Vitex <i>Indica</i> ,	<i>ibid.</i>
Surnag radix <i>Atlant.</i>	154.	Tsjanga-puspam,	106.	Vitex <i>Sinarum</i> ,	<i>ibid.</i>
Swa-tea,	21, 79.	Tsjem-tani,	178.	Vitis <i>Idæa</i> s. <i>Vaccinia</i> ,	210,
Symphytum,	198.	Tsjera-belluttæ-adeca - manjen,	12.	211.	
Syringa baccifera,	<i>ibid.</i>	Tsjera-valli-panna,	95.	Vitis vinifera,	211,
<b>T.</b>					
T Ali fouk,	158.	Tsjeria-Cametti,	169.	Ukui-fan,	53.
Tali-pullu,	73.	Tsjeru-Katsjilletti-pullu,	188.	Ulmi folia arbor,	211.
Talu-dama <i>H. Mal.</i>	207.	Tsjeru-valli - panna-Waropoly,	95.	Ulmus nana.	<i>ibid.</i>
Tamarindus monocot,	198.	Tsjolap-pullu,	112.	Umari arbor,	154.
Tamariscus <i>Æthiopic.</i>	75.	Tsjovanna-Manneli,	133.	Umbelliferis adfinis, in <i>Append.</i>	
Tamariscus <i>Ericoides</i> ,	199.	Tsou-u,	5.	Umki alias U-muy,	29, 212.
Tatarica,	152.	Tulipifera arbor,	206.	Unangoree,	123.
Tatha Cotanmaram,	114.	Turritis,	<i>ibid.</i>	Voandra <i>Flacurtii</i> ,	170.
Tau-Cudda-murram,	28	<b>V.</b>			
Tchu-fan,	142.	V Adæ-Kodi <i>H. Mal.</i>	206.	Votta-clegepa,	67.
Tchu-whei,	7.	Valeriana palustr.	<i>ibid.</i>	Voutrimon,	141.
Telephium,	59, 176, 189.	Valerianella,	173, 207.	Urtica racemifera,	212.
Telephii legitim. similis,	199.	Valerianoides,	202, 207.	Uva crispa s. <i>Grossularia</i> ,	<i>ibid.</i>
Tenna-Voulla,	166.	Vallia-manga-nari,	56.	Uvifera litorea,	<i>ibid.</i>
Terebinthus peregrina,	199.	Valli-panna,	95.	<b>W.</b>	
Tereta-pullu,	111.	Valli-itti-canni,	209.	V Ara-pullu,	112.
Tetraglottis baccifera,	199.	Vandel,	23.	Warra - congee,	11.
Tatragonocarpus,	200.	Vandymaram,	22.	Wastana-poo,	81.
Tetrapteris frutex,	<i>ibid.</i>	Varrigo-tawly,	110.	Wellia-codiveli,	130.
Teucrium <i>Cheusanis</i> .	<i>ibid.</i>	Vaucou-pundooe,	49.	Wha-tchaw,	33.
Thaliætro affinis,	207.	Vella-cau - mangerry - chedde,	151.	Woodgamaram,	31.
Thex similis,	79.	Vellanagum yoy,	130.	Wootta-cheddy,	146.
Thlaspi,	200, 201.	Vellari <i>Malabaror.</i>	180.	Worril tamary,	189.
Thlaspidium,	201.	Vella-tillapa,	24.	<b>X.</b>	
Thory-dum-booty,	29.	Vellawaramelle.	13.	X Agna arbor,	213.
Thymelæa,	101, 201.	Velle-congee,	28, 31.	Xanthium,	<i>ibid.</i>
Thymelææ adfinis,	182.	Vellum-pashia,	177.	Xeranthemum,	<i>ibid.</i>
Thymum capitat.	201.	Vellum-pausia,	<i>ibid.</i>	<b>Y.</b>	
Tithymali facie,	65.	Venangomaram,	20.	Y Ang-may <i>Sinarum</i> ,	178.
Tithymalus, 183,	201, 202,	Vera-marram,	31.	Ya-tien-tching,	86.
203.		Verbasci similis,	207.	Yellow-Succory,	118.
Tlaloceloxochitl,	43.	Verbasum,	<i>ibid.</i>	<b>Z.</b>	
Toiyan,	12.	Verbenæ foliis,	<i>ibid.</i>	Z Anthoxylum, 76, 77, 78,	
Toraii,	10.	Verbena nodiflora,	208.	79 & 214.	
Tordylium minus,	203.	Veronica <i>Cheusanens.</i>	<i>ibid.</i>	Zinziberis fol. & facie,	214.
Torelly,	137.	Veruymaram,	165.	Ziziphus,	160.
Tounde-chedde,	179.	Viburni folio,	208.	<b>E R R A T A.</b>	
Triapteris <i>Sinarum</i> ,	203.	Viburnum,	<i>ibid.</i>		
Tribulus terrestris,	<i>ibid.</i>	Victorialis longa,	8.		
Tricapsularis <i>African.</i>	<i>ibid.</i>	Viola, 208, 209, & in <i>Append.</i>			
Trifolium,	203, 204, 205.	Virga aurea,	118, 209		
Triticum peregrin.	205.	Viscum arboreum,	209.		
Trochlea Vegetabilis,	<i>ibid.</i>	Visci similis,	210.		
Tsjagera-Nuren,	184.				
Tsjama-pullu,	107, 109.				



# ERRATA sic Corrigitur.

Fol.	Line.	Lege.
10	15	<b>C</b> Aulium.
11	12	<b>C</b> oromandel.
13	5	alati caulis.
13	13	Amygdalus.
14	10	Virginiana.
17	15	pellicula.
18	14	Monspeliaca.
24	2	adversa.
24	9	æmulantibus.
26	4	Separantur.
26	9	ad basim.
29	23	Pistachiæ Virgin. fol. triphyllos.
30	17	Guaiavæ.
33	22	triphylla & quinq. fol.
38	8	Cœsus.
39	1	Rarioribus.
39	17	triphyllon.
41	15	flavescentibus.
43	9	acuminato.
52	12	Fistula.
54	15	baccis.
55	7	Sulphureo.
62	7	Exot.
69	23	Malabarorum.
72	9	Gnaphaloides.
74	2	cyaneis.
74	5	exot.
75	14	Virescente.
80	16	purpurascete.
81	15	Cheva-ruttee.
83	5	radice Scorpioide.
83	19	Parietariæ.
84	3	folia.
84	22	foetam.

Fol.	Line.	Lege.
88	1	Adrachnes.
88	9	triquetro.
93	8	lineolarum.
94	27	Æthiopica.
95	8	Spermophoros.
99	20	Mezerei.
101	14	pubescentibus.
102	12	laciniatis.
103	10	Venenum.
107	19	folia.
111	1	distachyophoron.
114	17	Quinquefolia Canadensis.
118	18	Cheusanicum.
129	15	recensita.
149	17	Posibius.
149	18	Myrobalanis.
149	18	inculcat.
150	2	Christophorus.
150	4	Veslingius.
150	25	Galla-fungum.
152	22	natali.
155	4	censebat.
160	19	Schol. item satatilis.
162	18	donato.
164	2	errorem.
164	20	ex Guiana.
165	16	Phaseolis.
167	24	No. 115.
178	12	Calopodii.
189	22	Ursæ folio.
193	10	angustioribus.
195	16	æmulus.
198	1	Maderaspatanum.



M. Vander Gucht scul.





---

*Viri* tam Stemmata, quàm Literarum fulgore *Illustrissimi*, Quorum singuli ad hujus operis sublevanda impendia, pro singulis Exemplaribus quinque aureorum *Guinea's* vocatorum liberalitèr subscripsère, sunt infra-scripti.

Reverendissimus admodùm D. D. *TENNISON*,  
Archiepiscopus *Cantuariensis*.

**I**llust. D. *Spencer*, Comes *Sunderlandiæ*.

Illust. D. *Bentinck*, Comes *Portlandiæ*.

Revd. D. D. *Compton*, Episcopus *Londinensis*.

Revd. D. D. *Moore*, Episcopus *Norvicensis*.

Honor. D. *Wharton*, Baro de *Wharton*.

Honor. D. *Paget*, Baro de *Beaufort*.

Honor. D. *Somers*, Baro de *Eveningham*.

Honor. D. *Montague*, Baro de *Halifax*.

Honor. D. *Hare*, Baro de *Colrane Regni Hibern.*

Honor. D. *Boyle*, Cancellarius *Scaccarii*.

---



The first of these is the fact that the  
the first of these is the fact that the



Fig. 1.

Fol. 1. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 1. Pl. 2.  
Amalth.




Fig. 3.

Fol. 3. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 3. Pl. ult.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 2. Pl. 1.  
Amalth. R. Spofforth Sculp.







Fol. 1. Pl. 3.  
Mantib.

Fig. 1.



Fig. 2.

Fol. 3. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 7. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 2. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 6. Pl. 3.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 1. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 37. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 3. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 1. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 3. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 1. Pl. 5.  
Amalth.

M.V. Gucht Sculp







Fig. 1.

Fol. 4. Pl. 7.  
Amalth.

Fig. 2.

Fol. 4. Pl. ult.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 5. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 5. Pl. 1.  
Mantiß.

Fig. 5.

Fol. 3. Pl. 4.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. II. Pl. 1.  
Amalth.

Fig. 2.

Fol. 7. Pl. 1  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. II. Pl. 5.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. II. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 5.

Fol. 6. Pl. 4.  
Amalth.

M. J. Gucht. Sculp.














Fig. 1. Fol. 17. Pl. 2. Amalth.



Fig. 2.

Fol. 12. Pl. 1. Amalth.



Fig. 3.

Fol. 12. Pl. 3. Amalth.



Fig. 4.

Fol. 13. Pl. 3. Amalth.



Fig. 5.

Fol. 17. Pl. 1. Amalth.



Fig. 6.

Fol. 13. Pl. 2. Amalth.







Fig. 1. Fol. 17. Pl. 4. Amalth.



Fig. 2. Fol. 18. Pl. 9 Amalth.



Fig. 3. Fol. 17. Pl. 5. Amalth.



Fol. 17. Pl. 6. Amalth.

Fig. 4.



Fol. 18. Pl. 1. Amalth.

Fig. 5.

M. F. G. Gucke. Sculp.







Fig. 1. Fol. 18. Pl. ult. Amalth.



Fig. 2. Fol. 17. Pl. 7. Mantiss.



Fig. 3. Fol. 18. Pl. 3. Amalth.




Fig. 5. Fol. 18. Pl. 5. Amalth.



Fig. 6. Fol. 10. Pl. 1. Amalth.



Fig. 4. Fol. 18. Pl. 6. Amalth.







Fig. 1

Fol. 31. Pl. 3.  
Almag.



Fig. 2

Fol. 16. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3

Fol. 19. Pl. 4  
Amalth.



Fig. 4

Fol. 23. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 5

Fol. 35. Pl. 4.  
Amalth.

M. J. & Gucht. sculp.














Fig. 1.

Fol. 33. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 27. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 35. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 34. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 31. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 21. Pl. 6.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 29. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 20. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 22. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 28. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 22. Pl. 5.  
Amalth.







Fig. 1.  
Fol. 20. Pl. 3  
Mantiß.



Fig. 1.  
Fol. 20. Pl. 2.  
Mantiß.




Fig. 3.  
Fol. 146. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.  
Fol. 46. Pl. 1.  
Almag.



Fig. 5.  
Fol. 25. Pl. 3  
Mantiß.



Fig. 6.  
Fol. 21. Pl. 2.  
Mantiß.







Fig. 1.

Fol. 34. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 28. Pl. 4  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 31. Pl. 5.  
Item 66. Pl. 4  
Amalth.




Fig. 4.

Fol. 32. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 28. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 25. Pl. 6.  
Amalth.









Fig. 1.  
Fol. 35. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 54. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 32. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 4.  
Fol. 23. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 5.  
Fol. 23. Pl. 8.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 68. Pl. 1.  
Mantiss.



Fig. 2.

Fol. 19. Pl. 2.  
Mantiss.



Fig. 3.

Fol. 10. Pl. 3.  
Mantiss.




Fig. 4.

Fol. 137. Pl. 1.  
Mantiss.



Fig. 5.

Fol. 19. Pl. 1.  
Mantiss.









Fig. 1.  
Fol. 35. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 32. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 25. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 4.  
Fol. 25. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 5.  
Fol. 25. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.  
Fol. 35. Pl. 3.  
Amalth.









Fig. 1.  
Fol. 34. Pl. 8  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 34. Pl. 3  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 32. Pl. 5  
Amalth.



Fig. 4.  
Fol. 20. Pl. 4  
Amalth.




Fig. 5.  
Fol. 22. Pl. 2  
Amalth.









Fig. 1.  
Fol. 24. Pl. 7  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 25. Pl. 7  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 35. Pl. 1  
Amalth.




Fig. 4.  
Fol. 29. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 5.  
Fol. 20. Pl. 3.  
Amalth.









Fig. 1.



Fig. 2.  
Fol. 26. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Idem cum Fig. 6.  
folys mucronatis.

Fol. 34. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 54. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 20. Pl. 7.  
Amalth.




Fig. 6.

Fol. 28. Pl. 5.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 25. Pl. 7.  
Amalth.




Fig. 2.

Fol. 34. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 40. Pl. 7.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 43. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 42. Pl. 7  
Amalth







Fig. 1.

Fol. 42. Pl. 8  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 40. Pl. 3. Item  
Fol. 85. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 41. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 42. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 43. Pl. 2. } mucrone elongato  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 43. Pl. 3.  
Amalth.







Fig. 1.  
Fol. 40. Pl. 10.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 42. Pl. 3.  
Amalth.




Fig. 2.  
Fol. 42. Pl. 2  
Amalth.



Fig. 4.  
Fol. 40. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.  
Fol. 42. Pl. 1.  
Amalth.





















Fig. 1.

Fol. 48. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 399. Pl. 3.  
Almag. append.



Fig. 3.

Fol. 54. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 52. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 50. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 48. Pl. 3.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 52. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 55. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 51. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 57. Pl. 2.  
Mantiß.



Fig. 5.

Fol. 55. Pl. 1. } Varietas.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 55. Pl. 1. } Varietas triphylla  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 50. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 59. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

*Carduus Iaceoid. crassiore folio  
pingui, capitulo olivari.*



Fig. 4.

Fol. 51. Pl. 1.  
Mantiss.



Fig. 5.

Fol. 51. Pl. 2.  
Mantiss.



Fig. 6.

Fol. 49. Pl. 7.  
Mantiss.









Fig. 1.

Fol. 56. Pl. 5  
Amalth.

Fig. 2.

Fol. 58. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 53. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 63. Pl. 4.  
Amalth.

Fig. 5.

Fol. 59. Pl. 1.  
Amalth.

Fig. 6.

Fol. 65. Pl. 2.  
Mantiß.

G. v. Casel Sculp.

Fig. 5. *Thymus leptocarpus* L.

















Fig. 1.

Fol. 56. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 47. Pl. 7.  
Mantifß.



Fig. 3.

Fol. 51. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 55. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 48. Pl. 2.  
Mantifß.



Fig. 6.

Fol. 56. Pl. 1.  
Amalth.























Fig. 1.

Fol. 66. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 63. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 63. Pl. 7  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 58. Pl. 3.  
Mantib.



Fig. 5.

Fol. 66. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 66. Pl. 8.  
Amalth.







Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fol. 70. Pl. 5.  
Amalth.

Fol. 67. Pl. 5.  
Amalth.

Fol. 69. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 68. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 5.

Fol. 70. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 6.

Fol. 54. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 7.

Fol. 67. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 8.

Fol. 63. Pl. 5.  
Mantiss.









Fig. 1.

Fol. 66. Pl. 5.  
Amalth.

Fig. 2.

Fol. 66. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 66. Pl. 4.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 65. Pl. 5.  
Mantß.

Fig. 5.

Fol. 65. Pl. 6.  
Mantß.

Fig. 6.

Fol. 70. Pl. 8.  
Amalth.

P. v. Somer Scul.







Fig. 1.

Fol. 65. Pl. 1.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 60. Pl. 3.  
Mantib.



Fig. 3.

Fol. 63. Pl. 6.  
Mantib.



Fig. 4.

Fol. 76. Pl. 2  
Mantib.



Fig. 5.

Fol. 72. Pl. 3  
Amalch.



Fig. 6.

Fol. 66. Pl. 2.  
Mantib.







Fig. 1.

Fol. 75. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 75. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 64. Pl. 9.  
Mantifß.



Fig. 4.

Fol. 72. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 72. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 72. Pl. 4.  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 25. Pl. 8.  
Item.  
Fol. 76. Pl. 5.  
Amalth.

Fol. 76. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fol. 76. Pl. 5.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 76. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 5.

Fol. 76. Pl. 4.  
Amalth.

Fig. 6.

Fol. 75. Pl. 5.  
Amalth.

















Fig. 1.

Fol. 76. Pl. 7.  
*Amalth.*



Fig. 2.

Fol. 82. Pl. 2.  
*Amalth.*




Fig. 3.  
Fol. 76. Pl. 3.  
*Amalth.*



Fig. 4.

Fol. 83. Pl. 8  
*Amalth.*



Fig. 5.

Fol. 87. Pl. 7.  
*Amalth.*









Fig. 1.  
Fol. 84. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 78. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 83. Pl. 3.  
Amalth. radice Scorpioide



Fig. 4.  
Fol. 81. Pl. 4.  
Amalth.




Fig. 5.  
Fol. 80. Pl. 6.  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 85. Pl. 1.  
Amalth.




Fig. 2.

Fol. 84. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 80. Pl. 2.  
Amalth.




Fig. 4.

Fol. 71. Pl. 3.  
Mantib.



Fig. 5.

Eupator. Ind. Or.  
Agerati folys argenteum.



Fig. 6.

Eupatorium integro Jacobaea  
folio violaceum. ex Ind. Or.









Fig. 1.

*Eupatorium Americanum*  
*Scrophulariaceae folys aureum*



Fig. 2.

Fol. 71. Pl. 2 } Item. 81. Pl. 8  
Mantiss } Amalth



Fig. 3.

Fol. 82. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 81. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 5.  
Fol. 71. Pl. 8.  
Mantiss.



Fig. 6.  
Fol. 83. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 80. Pl. 8.  
Amalth.

H. Hulstbergh Sculp.








Fig. 1.

Fol. 75. Pl. 3.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 337. Pl. 5.  
Almaest



Fig. 2.

Fol. 88. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 84. Pl. 3  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 80. Pl. 8  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 82. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 73. Pl. 5.  
Mantiß.















Fig. 1.  
Fol. 87. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 87. Pl. 2.  
Amalth.



Fol. 86. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 86. Pl. 2.  
Amalth.



Filix Sinica Smyrny Cretici  
facie perelegans

Fig. 4. H. Hulstbergh Sculp. Fig. 5. Fol. 74. Pl. 2. Mantz.

Fig. 6







Fig: 1.

*Filix Floridae prelongis & angustis pinnulis ad eras seminibus fibratis. pediculo Splendente nigro.*



Fig: 2.

*Filicula Indiana Filipendulæ folys.*



Fig: 3.

*Fol. 93. Pl. 3. Amalth.*



Fig: 4.

*H. Hulstberg Sculp.*



Fig: 5.

*Fol. 78. Pl. 6. Mantiß.*

*Filix ramosa Insul. Ioanna' pinnulis Subrotund. planis & rostratis.*









Fig: 1.  
Fol. 78. Pl. 4.  
Mantib.



Fig: 2.  
Fol. 80. Pl. 6.  
Mantib.



Fig: 3  
Fol. 93. Pl. 6.  
Amalth.








Fig: 1.  
Fol. 83. Pl. 3.  
Mantibz.





Fig: 2. Fol. 92. Pl. 8.  
Amalth.



Fol. 83. Pl. 1.  
Mantibz.

Fig: 4



Fig: 3.  
Fol. 93. Pl. 5.  
Amalth.



Fol. 95. Pl. 7.  
Amalth.

Fig: 5

H. Hulstbergh Sculp.










Fig. 3.

pediculo pinnae  
formes transditi  
e, ex Insula  
Helena.



Fig. 3.

Fol. 25. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 83. Pl. 2.  
Mantib.



Fig. 4.

Fol. 82. Pl. 6.  
Mantib.









Fig. 1.  
Fol. 78. Pl. 5.  
Mantiss.  
Item. 93. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 91. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 3

Fol. 80. Pl. 1.  
Mantiss.

H. Hulstbergh Sculp.



Fig. 4.

Fol. 79. Pl. 3.  
Mantiss.



Fig. 5

*Adiantum perelegans*  
ex Insula Ioannae.  
Pediculo atrorubente.







Fig: 1.  
Fol. 93. Pl. 9.  
Amalth.

Fig: 2  
Fol. 80. Pl. 5.  
Mantiß.

Fig: 3. Fol. 85. Pl. 3.  
Amalth.

Fol. 94. Pl. 5.  
Amalth.

Fig: 4.

Fig: 5.  
Fol. 94. Pl. 2.  
Amalth Item  
Fol. 82. Pl. 1.  
Mantiß.









Fig. 1.

Fol. 93. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 3.

Fruticis Thea Species altera Sinarum.

P. v. Somer. Sculp.



Fig. 2.

Fol. 81. Pl. 5.  
Mantiss. Item.  
Fol. 94. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 93. Pl. 8  
Amalth.









Fig. 2.

Fol. 98. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 80. Pl. 9.  
Mantiss.

Fig. 1.

Fol. 82. Pl. 4.  
Mantiss.

Fig. 4.

Fol. 92. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 5.

Fol. 95. Pl. 3.  
Amalth.

Fig. 6.

Fol. 534. Pl. 8.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 97. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 94. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 111. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 98. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 97. Pl. 1.  
Mantiß.




Fig. 6.

Fol. 112. Pl. 7  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 101. Pl. 7.  
Amalth.




Fig. 3.

Fol. 100. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 182. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 182. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 84. Pl. 3.  
Mantiß.









Fig. 1.

Fol. 96. Pl. 6.  
Amalth.

Fig. 2.

Fol. 98. Pl. 2.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 96. Pl. 4.  
Amalth.

Fig. 4.

Fol. 103. Pl. 5.  
Amalth.

Fig. 5.

*Eriocaulon Nor'boracens.*  
Amalth. app. Pl. 72.








Fig. 1.

Fol. 107. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 2.

Frutex *Ethiopicus cineraceus*,  
folijs. *Vernae aculeatis*, flosculis  
albis coronatis.



Fig. 3.

Fol. 43. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 100. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 103. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 119. Pl. 4.  
129. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 106. Pl. 4.  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 96. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 97. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 97. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 97. Pl. 4.  
Amalth.




Fig. 5.

Fol. 96. Pl. 7.  
Amalth.








Fig. 1.

Fol. 99. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 85. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 100. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 88. Pl. 5.  
Mantiß.




Fig. 5.

Fol. 87. Pl. 2.  
Mantiß.



Fig. 6.

Fol. 87. Pl. 5.  
Mantiß.









Fig. 1.

Fol. 88. Pl. 6.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 88. Pl. 10.  
Mantib.



Fig. 3.

Fol. 104. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 4.

Genista Africana angustis.  
folijs propendentibus.



Fig. 5.

Genista Rosmarini folio  
triphyllis Prom. Bon. Spei.



Fig. 6.

Fol. 88. Pl. 3.  
Mantib.



Fig. 7.

Fol. 88. Pl. 5.  
Mantib.
















Fig. 1. Fol. 90. Pl. 1. Mantiss.



Fig. 2.

Fol. 92. Pl. 6. Mantiss.



Fig. 3.

Fol. 90. Pl. 3. Mantiss.



Fig. 4.

Cyperi genus.  
panicula speciosa  
propendentibus atris

Indianum  
Spiculis.

P. v. Somer Sculp.



Fig. 5.

Fol. 114. Pl. 4. Amalth.



Fig. 6.

Fol. 89. Pl. 6. Mantiss.








Fig. 1.

Fol. 113. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 106. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 101. Pl. 6.  
Item 115. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 170. Pl. 11.  
Almagest.



Fig. 5.

Fol. 114. Pl. 5  
Amalth.




Fig. 6.

Fol. 97. Pl. 8.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 98. Pl. 4.  
Mantiß.



Fig. 8.

Fol. 97. Pl. 2.  
Mantiß.



Fig. 9.

Fol. 101. Pl. 9.  
Mantiß.

G. v. Casseel Sculp.







Fig. 1.

Fol. 111. Pl. 2.  
Amalth et forte  
Fol. 95. Pl. 3.  
Mantiß.




Fig. 2.

Fol. 97. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 97. Pl. 7.  
Mantiß.



Fig. 4.

Fol. 62. Pl. 3.  
Mantiß.




Fig. 5.



Fig. 6.

Fol. 98. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 110. Pl. 9.  
Amalth.




Fig. 8.

Gram. Cyperoid. capillaceis  
folijs pusillum ex Inf. Cheusan.

Gram. Cyperoid. elegans.  
Vasumboo Curry Malabaror.







Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fol. 115. Pl. 5.  
Amalth. Item.  
Fol. 101. Pl. 3.  
Mantiß.

Fol. 101. Pl. 7.  
Mantiß.

Fol. 101. Pl. 4.  
Mantiß.







Fig. 1.

Fol. 96. Pl. 14.  
Mantiss. Idem forte  
cum proxime preceden-  
ti.




Fig. 2.

Fol. 112. Pl. 9.  
Amalth.

Fig. 3.

Fol. 62. Pl. 2.  
Mantiss.



Fig. 4.

Fol. 70. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

*Hypericum Floridanum*  
*Ascyrum ramosum*  
*frutescens flore*  
*tetrapetal.*  
G. v. Cassel. Sculp.



Fig. 6.

Fol. 104. Pl. 5.  
Mantiss.



Fig. 7.

Fol. 190. Pl. 10.  
Almagest.







Fig. 1.

Fol. 119. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 102. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 102. Pl. 4.  
Mantiß.



Fig. 4.

Fol. 120. Pl. 2  
Amalth.



Fig. 5.

*Iacea Cyanoides latiori folio*  
ex Orii Coremandel.



Fig. 6.

Fol. 104. Pl. 6.  
Mantiß.







Fig. 1.

*Jacobaea violae Martiae*  
folio ex Florida.



Fig. 2.

Fol. 107. Pl. 1.  
Mantib.



Fig. 3.

Fol. 120. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 106. Pl. 9.  
Mantib.



Fig. 5.

Fol. 107. Pl. 7.  
Mantib.



Fig. 6.

Fol. 111. Pl. 5.  
Mantib.



Fig. 7.

Fol. 125. Pl. 9.  
Amalth.













Fig. 1.

Fol. 123. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 173. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 105. Pl. 1.  
Mantiß.




Fig. 4.

Fol. 123. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 114. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 123. Pl. 4.  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 114. Pl. 5.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 123. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 65. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 65. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 5.

Laurifolia pomifera  
e regione Sinarum.



Fig. 6.

Fol. 190. Pl. 11.  
Mantib.



Fig. 7.

Fol. 106. Pl. 10.  
Mantib.




Fig. 8.

Fol. 124. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 9.

Fol. 65. Pl. 4.  
Amalth.

H. Hulstbergh Sculp.







Fig. 1.

Fol. 119. Pl. 4.  
Mantiß.



Fig. 2.

Fol. 120. Pl. 2.  
Mantiß. Item in Apper d.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 130. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 119. Pl. 7.  
Mantiß.

Fig. 4.

Fol. 138. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 122. Pl. 1.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 119. Pl. 6.  
Mantiß.







Fol. 138. Pl. 2.  
Amalth.




Fig. 2.

Fol. 133. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 136. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 97. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 132. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 139. Pl. 10.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 99. Pl. 1.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 137. Pl. 7.  
Amalth.  
Item 191. Pl. 5.



Fig. 2.

Fol. 121. Pl. 11.  
Mantiß.

Fig. 3.

Fol. 135. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 183. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 134. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 135. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 120. Pl. 8.  
Mantiß.



Fig. 8.

Fol. 120. Pl. 7.  
Mantiß.







Fig. 1.

Fol. 123. Pl. 3.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 139. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 140. Pl. 2.  
Amalth. et  
Fol. 163. Pl. 6.  
Mantib.



Fig. 4.

Fol. 139. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 139. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 139. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 7.

*Lysimachia a. Siliquosa* et *Similis*  
*Pedicularis lutea* folio villosa ex  
Prom. Bon. Spei.



Fig. 8.

Fol. 134. Pl. 3.  
Mantib.







Fig. 1.

Fol. 148. Pl. 1.  
Mantiss.



Fig. 2.

Fol. 151. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 138. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 147. Pl. 5.  
Amalth. Et Fol. 173. Pl. 3.



Fig. 5.

Fol. 180. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 147. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 159. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 8.

Fol. 158. Pl. 3.  
Amalth.







Fig. 2.

Fol. 145. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 128. Pl. 1.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 142. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 147. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 144. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.

Molluginis Specie Frutex  
Floridanus. An Fol. 185. Pl. 7  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 130. Pl. 7.  
Mantiß. &  
Fol. 147. Pl. 1.  
Amalth.
















Fig. 1.

Fol. 59. Pl. 3.  
Amalth.




Fig. 2.

Fol. 35. Pl. 8.  
Alantif.



Fig. 3.

Fol. 40. Pl. 8.  
Mantif.



Fig. 4.

Fol. 41. Pl. 6.  
Mantif.  
Item Fol. 63. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 40. Pl. 7.  
Mantif.



Fig. 7.

Fol. 62. Pl. 5.  
Amalth.





















Fig. 1.

Fol. 167. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 135. Pl. 6.  
Mantiß



Fig. 3.

Fol. 52. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 167. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 166. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 135. Pl. 2. & 3.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 135. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 8.

Fol. 99. Pl. 7.  
Amalth.













Fig. 1.

Fol. 297. Pl. 8.  
Almagest.



Fig. 2.

Fol. 119. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 147. Pl. 3.  
Mantiß.



Fig. 4.

Fol. 153. Pl. 9.  
Mantiß.



Fig. 5.

Fol. 15. Pl. 2. Item.  
173. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 160. Pl. 9.  
Mantiß.







Fig. 1.

Fol. 175. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 166. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 167. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 153. Pl. 5.  
Mantiß.



Fig. 4.

Fol. 153. Pl. 10  
Mantiß.



Fig. 6.

Fol. 175. Pl. 8  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 194. Pl. 3.  
Amalth.








Fig. 1.

Fol. 153. Pl. 7.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 179. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 173. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 4.

Perficaria Similis  
Spicata. Herba  
Mariana.



Fig. 5.

Fol. 175. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 85. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 7.

Fol. 166. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 8.

Fol. 177. Pl. 6.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 181. Pl. 5.  
Mantib.



Fig. 2.

Fol. 164. Pl. 1.  
Mantib.




Fig. 3.

Fol. 181. Pl. 6.  
Mantib.



Fig. 4.

Fol. 163. Pl. 2.  
Mantib.



Fig. 5.

Fol. 160. Pl. 8.  
Mantib.



Fig. 6.

Fol. 153. Pl. 8.  
Mantib.



Fig. 7.

Fol. 163. Pl. 3.  
Mantib.







Fig. 1.

Fol. 190. Pl. 10.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 188. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 4.



Fol. 190. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 185. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.

Amaran. thioides parvum  
Polygoni montani nivei  
facie Nov hollandicum.




Fig. 6.

Fol. 338. Pl. 13.  
Almagest.



Fig. 7.

Fol. 180. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 8.

Fol. 338. Pl. 15.  
Almagest.  
Item 191. Pl. 1.  
Amalth.









Fig. 1.

Fol. 187. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 190. Pl. 7.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 21. Pl. 4. Item  
187. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 168. Pl. 6.  
Mantib.



Fig. 5.

Fol. 195. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 190. Pl. 8.  
Amalth.







Fig. 1.  
Fol. 36. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 2.  
Fol. 35. Pl. 2.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 39. Pl. 4.  
Amalth.




Fig. 4.  
Fol. 38. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 5.  
Fol. 38. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 6.  
Fol. 35. Pl. 4.  
Amalth.







Fig. 1.

Fol. 192. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 198. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 196. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 199. Pl. 4.  
Amalth.




Fig. 5.

Fol. 203. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 180. Pl. 7.  
Mantiß.

H. Hulßbergh, Sculp.







Fig. 1.

Fol. 72. Pl. 8. et  
Fol. 74. Pl. 9.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 590. Pl. 1.  
Amalth.  
et Fol. 578. Pl. 1.  
Mantiß.



Fig. 3.

Fol. 73. Pl. 1.  
Amalth.  
Item Fol. 577. Pl. 3.



Fig. 4.

Fol. 577. Pl. 2.  
Mantiß.



Fig. 5.

Fol. 579. Pl. 6.  
Mantiß.



Fig. 6.

Fol. 580. Pl. 10.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 207. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 8.

Fol. 580. Pl. 8.  
Mantiß.

H. Hulßbergh Sculp.








Fig. 1.

Fol. 205. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 202. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 3.

Fol. 382. Pl. 5.  
Mantiß.




Fig. 4.

Fol. 202. Pl. 7.  
Amalth.




Fig. 5.

Fol. 202. Pl. 4.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 383. Pl. 7.  
Mantiß.



Fig. 7.

Fol. 65. Pl. 3.  
Item 135. Pl. 3.  
Amalth.



Fig. 8.

Fol. 205. Pl. 2.  
Amalth.







Fig. 1.  
Fol. 384. Pl. 8.  
Mantib.



Fig. 2.  
Fol. 397. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 3.  
Fol. 277. Pl. 6.  
Amalth.



Fig. 4.  
Trifolium letrius  
rubello fructu parvo  
foliorum lon-  
go pedunculo  
insidente.



Fig. 6



Fig. 5  
Fol. 385. Pl. 4.  
Mantib.

Muscus parvus  
Crispatis foliolis  
nostras.



Fig. 7.  
Fol. 384. Pl. 4.  
Mantib. et  
Fol. 204. Pl. 5.  
Amalth.

G. v. CaBeel Sculp.




Fig. 8.  
Fol. 68. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 9.  
Fol. 208. Pl. 6.  
Amalth. Item Fol. 387.  
Pl. 2. Mantib.








Fig. 1.

Fol. 250. Pl. 8.  
Amalth.



Fig. 2.

Fol. 207. Pl. 7.  
Amalth.




Fig. 3.

Fol. 250. Pl. 5.  
Amalth.



Fig. 5.

Fol. 208. Pl. 9.  
Amalth.



Fig. 4.

Fol. 29. Pl. 2.  
Item 252. Pl. 1.  
Amalth.



Fig. 6.

Fol. 588. Pl. 5.  
Mankiß.





Fig. 7.

Fol. 387. Pl. 57.  
Almagest.






































Fig. 1.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 31.*



Fig. 2.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 37.*



Fig. 3.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 38.*



Fig. 4.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 35.*



Fig. 5.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 36.*



Fig. 6.

*Fol. 384. Pl. 3.*  
*Amalth.*



Fig. 7.

*Amalth. App.*  
*Pl. 34.*



Fig. 8.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 32.*



Fig. 9.

*Amalth. Append.*  
*Pl. 33.*





